

АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ БОҒУ ТОКПАРВАРӢ ВА САБЗАВОТКОРӢ

*Ба ҳукуқи дастнавис*



ВБД: 632.52:634.451/.453

**РАҲМАТОВ СУЛАЙМОН ҲАСАНОВИЧ**

**ХУСУСИЯТҲОИ АГРОБИОЛОГӢ ВА СЕЛЕКСИОНИИ  
НАВҲОИ ХУРМОИ ШАРҚӢ ДАР ШАРОИТИ ВОДИҲОИ  
ҲИСОРУ ВАХШ**

**АВТОРЕФЕРАТИ**  
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои кишоварзӣ

аз рӯйи иҳтисоси 06.01.05 - Селексия ва тухмипарварии  
растаниҳои кишоварзӣ

ДУШАНБЕ - 2025

Тадқиқотҳо дар шуъбаи мевапарварӣ ва буттамевагиҳои Институти боғу токпарварӣ ва сабзвавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон иҷро шудааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Қамолов Нурмаҳмад** – номзади илмҳои кишоварзӣ, ходими пешбари илмии Институти боғу токпарварӣ ва сабзвавоткории АИКТ.

**Муқарризони расмӣ:**

**Бобозода Илҳомҷон Абдушукур** – доктори илмҳои биологӣ, мудири кафедраи ботаникаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ.

**Шомамадова Зубайда Дустмамадовна** – номзади илмҳои кишоварзӣ, дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва табиириёзии ДБССТ.

**Муассисаи пешбар:**

Донишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи  
Моёншо Назаршоев

Ҳимояи диссертатсия санаи «3» марта соли 2025, соати 14<sup>00</sup> дар маҷлиси шурои диссертатсионии **6Д.КОА-096** назди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, бо нишонии: 734025 шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21<sup>а</sup> баргузор мегардад.

E-mail: aikt91@mail.ru

Бо диссертатсия дар китобхонаи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон шинос шудан мумкин аст.  
<http://www/taas.tj>.

Автореферат «\_\_\_\_\_» соли 2025 фиристода шудааст.

**Котиби илмии**  
**Шурои диссертатсионӣ**  
**номзади илмҳои кишоварзӣ**

*Гулзар*

Пулатова Ш.С.

## Муқаддима

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Дар амал татбиқ намудани ду ҳадафи стратегии мамлакат - таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноаткунонии босуръати кишвар бе рушди соҳаи кишоварзӣ аз он чумла баҳши боғу токпарварӣ масъалаи мубрами рӯз аст. Солҳои охир талабот ба меваю ангур ки дорои хусусияти шифои ва ғизои бой мебошанд зиёд мешавад.

Яке аз роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, ин ба вучуд овардани навъҳои нави серҳосилу ба талаботи бозор ҷавобгӯ ва мукамалгардонии технологияи бунёди боғҳо бо тарзи замонавӣ мебошад. Аҳамияти ғизои шифои ва иқтисодии хурмои шарқӣро, ки як қисмати минтақаҳои боғдории Ҷумҳурӣ барои парвариши ин мева мувоғиқ аст, ба назар гирифта мавзӯи тадқиқотиро таҳрези намуда, ичро кардем.

**Дараҷаи коркарди илмии масъалаи мавриди омӯзиш.** Дар рафти корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, аз дастоварҳо ва натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии олимони варзидаи соҳаи боғпарварӣ ва селексионерони дохиливу ҳориҷӣ аз чумла: А.М. Кормилицин [67, с. 76], Н.М. Мурри [94, с. 63], Б.С. Розанов [141, с. 32-34], Н.Г. Ширяева [171 с. 12-13], С.М. Животинская [46, с. 88], О.П. Кульков [70, с. 26], Ф.А. Кулиев [68, с.45-47], В.И. Запрягаева [52, с. 16-18], Б.Л. Массовер [87, с. 3-20], У.Э. Эшонқулов [173, с. 106], И.А. Загребельный [49, с. 18-21], С. М Гулов.[29, С. 13-15], D. A. Neuwald, A. A. Saquet, I. Sestari and C. K. Sautter [192, с. 51-56], X.Ф. Сафаралиев [149, с. 27], Р.В. Кулъян [72, с. 71-74], А.Х. Мухамедов [99, с. 276], E. Badaл [179, с. 154-160], М.Д. Омаров [108, с.26-27], А.В. Рындин [143, с. 24-30], X.Н. Назиров [102, с. 14-18], Н. Камолов [102, с. 14-18], Н.Камолов, С.Х. Раҳматов [147, с. 28-31.], [148, с. 21-24.] ва дигарон, ки корҳои илмии тадқиқотии худро ба парвариш ва селексияи дараҳтони мевадиҳанда, субтропиква ситруси баҳшидаанд, инчунин қонунҳо ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,ки оид ба беҳтар намудан ва рушди соҳаи боғу токпарварӣ нигаронида шудааст, истифода гардидаанд.

Илова бар ин, дар рафти гузаронидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ маълумотҳои Агентии давлати омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати қишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии обуҳавосанции назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тавсияҳои муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ бевосита истифода гардидаанд.

**Робитаи тадқиқот бо барномаҳо, (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ.** Мавзуи диссертатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самтҳои афзалиятноки таҳқиқотӣ – илмӣ алоқамандии зич дошта, бо як қатор барномаҳои давлатӣ аз ҷумла:

1. Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020, №424 аз 3 июля соли 2014, ки мувофиқи он бунёди 20 000га. боғи дараҳтони мевадиҳанда нақшабанди шуда буд.

2. Барномаи давлатии рушди Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, № 483 аз 20.10.2016.

3. Мувофиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 27-уми марта соли 2018, №165, дар барои ворид намудани тағйирот ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №793, аз 30-юми декабри соли 2015 оид ба “Барномаи навбатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои солҳои 2016-2020”.

Инчунин тадқиқотҳо мутобиқ ба лоиҳаҳои фармоишии корҳои илмӣ- тадқиқоти шуъбаи мевапарварӣ ва бутамевагиҳо барои солҳои 2016-2020 дар мавзуи “Офариданӣ навъҳои ба шароити экологӣ устувори дараҳтони мевадиҳанда, ҷормағзизо, ситрусизо буттамевагиҳо, такмилдииҳи технологияи парвариши ниҳол ва бунёди боғҳои интенсивӣ“РКД 0116 TJ00625

### **Тавсифи умумии тадқиқот**

**Мақсади таҳқиқот.** Дар шароти водии Ҳисору Вахш, дар коллексияҳои ҳурмои шарқӣ, омӯҳтани ҳусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии навъҳои ҳурмои шарқӣ, таъсири тагпайвандҳо ба рушду нумӯи навъҳо, чудо намудани навъҳои дурнамо барои пешниҳод кардан ба Комиссияи давлатии озмоиший навъи зироатҳои қишоварзӣ ва муҳофизати навъҳои Вазорати Қишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз рӯи

аломатҳои мусбӣ чудо намудани навъҳо, барои корҳои селексионӣ.

### **Вазифаҳои тадқиқот:**

-Омӯзиши тагпайвандҳои навъҳои хурмои шарқӣ вобаста ба шароити маҳал

-Омӯзиши хусусиятҳои биологӣ ва давраҳои фенологии навъҳои хурмои шарқӣ

-Муайян намудани ҳосилнокӣ ва таркиби биохимиявии навъҳои хурмои шарқӣ.

-Муайян намудани навъҳои дурнамои селексионии маҳаллӣ ба истеҳсолот.

-Самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисору Вахш

**Объекти тадқиқот.** Ба сифати объекти тадқиқот навъу намунаҳои хурмои шарқӣ, аз қабили навъҳои Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат, Вахш, Тоҷикӣ ва Ҳисорӣ ки маҳсули селексияи Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткорӣ мебошанд ва тагпайвандҳои хурмои Кавказӣ (*Diospyros lotus*), хурмои Виргинӣ (*Diospyros virginiana*) истифода шудаанд. Ба сифати навъи назоратӣ навъҳои ноҳиябандишудаи Ҳиакуме ва Зенджи-мару интихоб гардиданд.

**Мавзуи (предмет) тадқиқот.** Хусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисор Вахш

**Навгонии илмии тадқиқот.** Бо мақсади гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ ва чудо намудани навъҳои ояндадор барои дар истеҳсолот ҷорӣ намудан коллексияҳои навъҳои хурмои шарқӣ аз нав барқарор карда шуд. Дар натиҷаи омӯзиши маҷмӯи хусусиятҳои агробиологию ҳочагӣ, ба сармо тобоварӣ, сифати мева, нигоҳдорӣ, интиқол додан ва хушконидан дар минтақаҳои водигии Ҷумҳурӣ, алалхусус водиҳои Ҳисору Вахш дар баландиҳои аз сатҳи баҳр аз 350 то 1300 м, бори нахуст дар шароити Ҳисору Вахш омӯзиши 15 навъу намунаҳо гузаронида шуда, дар натиҷа аз байни онҳо 3- навъи дорои хусусиятҳои хоси ҳочагию- биологӣ дошта, аз он ҷумла 1 навъ барои истеҳсоли хушкмева интихоб карда, ба Комиссияи

давлатии озмоишии навъҳои зироатҳои кишоварзӣ ва муҳофизати навъи Вазорати Кишоварзӣ супорида шуд.

**Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии тадқиқот.** Аҳамияти тадқиқотҳои илмӣ дар он аст, ки дар натиҷаи гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ ба истеҳсолот пешниҳод намудани навъҳои ояндадори дорои ҳосили баланд, меваҳои хушсифат, қобиляти баланди нигоҳдорӣ, интиқолдӣӣ ва ба хушконидан мувоғиқ, дар оянда барои бунёди боғҳои хурмо пешниҳод карда мешавад, ки ба ҳалли масъалаҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурӣ, амнияти озуқаворӣ ва таъмини саноати хуроквориро ба ашёи хом мусоидат мекунад. Инчунин навъҳое, ки дорои аломатҳои ҳочагию биологӣ дошта барои корҳои селексионӣ истифода бурда мешавад. Натиҷаҳои илмии таҷрибаҳои саҳроӣ ва санчиши истеҳсолии онҳо дар омӯзиши хусусиятҳои агробиологӣ, ҳочагидорӣ ва селексионии навъу намунаҳои хурмои шарқӣ дар масоҳати 21 гектар дар ҳочагии таҷрибавии Сунбула, 10 гектар дар ҳочагии ҶДММ “Боғи 15-солагии” Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистони шаҳри Ҳисор татбиқ гардида аз тарафи раёсати кишоварзии шаҳри Ҳисор, санади татбиқ имзо ва муҳр карда шудааст.

### **Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда.**

1. Дар шароити водиҳои Ҳисору Вахш омӯзиши хусусиятҳои биологӣ, марҳилаҳои фенологӣ ва тагпайвандҳо барои навъҳои хурмои шарқӣ.
2. Нишондодҳои маҳсулотнокӣ, ҳосилнокӣ ва таркиби биохимиявии сифати меваҳои тару тозаи меваи навъҳои хурмои шарқӣ.
3. Самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои селексияи маҳаллии хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисору Вахш.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо.** Натиҷаҳои корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар шароити озмоишгоҳ ва саҳрои тибқи методикаи дар бодори қабулшуда «Барнома ва усулҳои омӯзиши навъҳои дараҳтони мевадиҳанда буттамевагиҳо ва ҷормағзиҳо» Орёл [127, с. 310] гузаронида, ҳассосияти экологиии навъу дурагаҳо аз рӯи модели пешниҳод кардаи И.А. Драговцева [42, С.46] ва таркиби химиявии мева дар шароити лабаратории –модаҳои ҳӯшк, пектин ва дигарҳо мувоғиқи методикаҳои дар китоби А.И. Ермаков, [44, с.127] «Усулҳои

тадқиқотии бихимиявии растаниҳо» овардашуда, таҳлили дисперсионӣ тибқи “Усулҳои гузаронидани таҷрибаҳои саҳроӣ”, Б. А. Доспехов [36, С. 351] ва барномаи компьютерӣ Microsoft 2010 муайян карда шуд.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи тадқиқот)..** Мавзӯи диссертатсионӣ, “Хусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисору Ваҳш”, буда, мазмуни диссертатсия ва тадҳиқотҳои иҷрошуда ба шиносномаи ихтисосӣ 06. 01.05.- Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ мебошад ва ба бандҳои соҳаҳои зерин мутобиқат мекунад;

**Банди 1, қисми 2.** Ба вучуд овардани маводҳои нави ибтидой барои селексия, такмилдиҳии усул, тарзҳои мавҷудбуда дар корҳои селексионӣ ва тухмипарварӣ.

**Банди 2.** Барои селексия муҳайё намудани намудҳои растаниҳо бо аломат нав ва хусусиятҳои пурқимати хоҷагӣ бо ёрии омӯзиши усулҳои гуногун ва асосноккунии навъҳои нав ва гибридҳо, коркарди усулҳои нав, такмилдиҳии усул, тарзҳои мавҷудбуда дар корҳои селексионӣ ва тухмипарварӣ.

**Банди 3.** Захираҳои растаниҳои ҳамчун маводи ибтидой барои селексия

**Банди 4.** Методика, усул, тартиби равиҷҳои селексионӣ, тухмипарварӣ, (пайвандкунӣ, тарзҳои интиҳоби селексионӣ ва тухмипарварӣ, баҳодиҳи ва сақаткунӣ).

**Банди 5.** Усул ва тарзҳои ошкор кардани хусусиятҳои пурқимати хоҷагии маводҳои селексионӣ ва тухмӣ (кӯҷатҳо). Коркарди шартҳои минтақабандии навъҳо (гибридҳо) ва ҷобаҷугузории минтақавии тухмиҳои зироатҳо ва хоҷагиҳои тухмипарварӣ, агротехникаи маводҳои селексионии киштшавандагӣ бо назардошти хусусиятҳои минтақавии экологӣ-ҷуғрофӣ.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар тадқиқот.**

Саҳми шаҳсии муаллиф дар омода намудан, интиҳоби дурустӣ мавзуи тадқиқотӣ аз ҷумла асосноккунии назарявӣ, амалии самти интиҳобшуда ва усулҳои тадқиқот, инчунин ташкилу гузаронидани таҷрибаҳои саҳроӣ, озмоишгоҳӣ, апробатсия ва татбиқи натиҷаҳои тадқиқот, таҳлилу коркарди

оморӣ ва татбиқи натиҷаҳои ба даст омада иборат мебошад. Ҷамъбасти натиҷаҳои тадқиқот ва нашри мақолаҳо аз ҷониби муаллиф дар якҷояги бо роҳбари илмӣ анҷом дода шуда, инчунин таҳияи умумии диссертатсия ва автореферати он аслияти матни диссертатсияро инъикос мекунад. Иштироки бевоситаи муаллиф ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳои илмӣ 86,3% баробар мебошад.

Тасвив ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия (гузориши нуқтаҳои асосии диссертатсия дар конференсияҳо, маҷлисҳо, семинарҳо ҳангоми ҳондани маърӯзаҳо дар муассисаҳои таълимӣ). Тадқиқотҳо тайи солҳои 2016-2018 гузаронида шудаанд. Муарифии натиҷаҳои тадқиқотҳои гузаронидашуда ҳамасола дар ҷаласаи Шурои олимони Интигути боғу токпарварӣ ва сабзвоткории Академияи илмҳои кишварзии Тоҷикистон муҳокима карда мешуданд. Ҳар сол (2016-2018) дар ҷаласаҳои шуъбаи илм, таълим ва тайёр кардани кадрҳои илмии Академияи илмҳои кишварзии Тоҷикистон баромад ва ҳисбот дода мешуданд. Муқаррароти илмӣ, ҳулосаҳо ва пешниҳодҳо оид ба истеҳсолот асоснок карда шуда, ба маълумоти таҳлилӣ ва таҷрибавӣ асос ёфтаанд, ки дараҷаи эътиомднокии онҳо бо коркарди оморӣ бо истифода аз барномаи компьютерии Microsoft Excel сабит шудааст. Ҳулоса ва пешниҳодҳо ба тадқиқотҳои илмӣ асос ёфтаанд, ки бо усулҳои мусоир таҳлил гардидаанд. Инчунин натиҷаи корҳои илмӣ тадқиқоти дар конференсияҳои илми амалӣ ҷумҳурияйӣ ва рӯзномаву маҷалаҳои тақризшавандааз ҷумла:

Конференсияи илмию амалии ҷумҳурияйӣ “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишварзӣ” Бахшида ба 30- солагии Истиқлолити давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маорф” Душанбе 2021, АИКТ, Маводи конференсия илмии ҷумҳурияйӣ «Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишварзӣ» Бахшида ба даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор 2018-2028» Душанбе -2022, Маводҳои конференсияи илмии назариявии байналмиллалии дар мавзуути «Истифодабарии усулҳои инноватсионӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии дараҳтони

мевадиҳанда, ангур, зироатҳои сабзавотиу картошкагӣ. Душанбе- 2022 ва ғайраҳо барасӣ ва муҳокима шудаанд. Маводи конференсия илмии ҷумҳурияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Нақши олимони ҷавон дар рушди илм инноватсия ва технологияи кишоварзӣ» Бахшида ба солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзи дар соҳаи илму маориф» ва даҳсолаи байналмилалии амал «об барои рушди устувор» 2018-2028 Душанбе 2024 ва ғайраҳо барасӣ ва муҳокима шудаанд.

**Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия** Натиҷаҳои тадқиқот дар 13 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 8 мақола дар мачаллаҳои тақризшаванди КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 мақола дар маводҳои конференсияҳои ҷумҳурияи илмиву назарияи АИҚТ ва 1 мақола дар конференсияи байналмилалӣ ба чоп расидаанд, ки мазмуну мундариҷа ва муҳтавои асосии тадқиқоти мазкурро дар бар мегиранд.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Кори диссертатсионӣ дар ҳаҷми 161 саҳифаи матни компьютерӣ дарҷ гардида, аз муқаддима, 5 боб, хулоса, тавсия ба истифодай амалии натиҷаҳо, замима ва рӯйхати адабиётҳои истифодагардида иборат аст. Дар диссертатсия 29 ҷадвал, 23 расм ва 10 диаграмма оварда шудааст. Рӯйхати адабиёти истифодагардида 195 аз ҷумла 19 адабиёти ҳориҷи кишварро ба забони англисӣ дар бар мегирад.

### **Тавсифи умумии тадқиқот**

**Мавод ва методҳои тадқиқот.** Тадқиқотҳои илмӣ оид ба омӯзиши ҳусусиятҳои агробиологӣ, ҳоҷагидорӣ ва селексионии навъу намунаҳои ҳурмои шарқӣ дар ҳоҷагии таҷрибии Сунбулаи шаҳри Ҳисор дар баландии 700м -800м аз сатҳи баҳр ва стансияи таҷрибии зироатҳои субтропикӣ ва ситрусӣ дар баландии аз сатҳи баҳр 300-350м дар ноҳияи Ҷ. Балхии Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИҚТ-ии гузаронида шудааст. Ин минтақаҳо барои парвариши ҳурмои шарқӣ ҳело мувоғиқ аст. «Захираҳои агроқлимии Тоҷикистон», [1, с. 216], Дар солҳои таҳқиқот зимистони 2016-2017, ки ҳарорати ҳаво шабона манғии -12-13 дараҷаи

кӯтоҳмудатро ташкил дод дар қитъаҳои тачрибавӣ дар дараҳтони ҷавон ва шоҳаҳои 3-5 солаи дараҳтони ҳосилдиҳанда аз сармо осеб диданд.

Хоки ин минтақаҳо асосан хокҳои хокистарранг ва қаҳваранги карбонати (хокистарранги муқарарӣ) буда, дар баландиҳои аз сатҳи баҳр 600-900 м ба назар мерасад, В.Я. Кутеминский, Н.В. Леонтьева, [60, с. 60-65],

Дар таркиби онҳо тақрибан 2-3% гумус мавҷуд буда, намии онҳо 23-25 %, вазни ҳосашон  $1,12-1,30 \text{ г/см}^3$  аст. (ташхиси хок дар Институти хокшиносӣ ва агрохимия гузаронида шудааст)

Водии Ваҳш бо иқлими гарми худ ба минтақаи субтропикаи хушк доҳил мешавад. Ин води дар баландиҳои 329 м (панҷи поён) ва 751 м (Ганҷинаи н. Ҳурросон) м аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда, миқдори боришоти солона 150-300мм -ро ташкил медиҳад.

Хоки хокистарранги равшан-дар ҳамвориҳои доманакӯҳи ва нишебии адирҳои паст дар баландиҳои аз сатҳи баҳр 300-500 м дучор шуда, гумусношиш 1,0-1,5 % ташкил медиҳад. Миқдори карбонатҳо 20% -ро ташкил медиҳад.


### Қисмҳои асосии тадқиқот

Натиҷаҳои тадқиқот нишон дод, ки дар парвариши дараҳтони ҳурмои шарқӣ низ тагпайванд нақши асосиро мебозад. Ба сифати тагпайванд ниҳолҳои ҳурмои Кавказӣ—*Diospyros Iotus* I ва ниҳолҳои ҳурмои Виргиниро *Diospyros Virginiana* I истифода бурда шуд. Интиҳоби дурустӣ тагпайвандҳо ба мо имкон медиҳад, ки дар маҳалли тадқиқот дараҷаи ба сармо ва хушкӣ тобоварӣ, часпиши зиёди пайвандҳо, тез ба ҳосилдароӣ, гирифтани ҳосили баланд ва давомнокии зиёди ҳосилдиҳии дараҳтонро таъмин карда тавонем. Аз натиҷаҳои татқиқотӣ гузаронидашуда аниқ шуд, ки навъҳои ояндадор Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳш ва Ваҳдат сабзиши муғчаҳои пайванди дар тагпайванди ҳурмои кавказӣ бартари доранд назар ба тагпайванди ҳурмои Виргинӣ. (чадвали 1).

Чадвали 1. - Сабзиши мугчаҳои пайвандии навъҳои хурмои шарқӣ дар тагпайванҷои хурмои кавказӣ ва виргинӣ, миёнаи (2016-2018)

Навъҳо	Тагпайванди хурмои кавказӣ		Тагпайванди хурмои виргинӣ	
	мугчаҳои пайвандӣ, шумора	мугчаҳои сабзида, шумора	мугчаҳои пайвандӣ, шумора	мугчаҳои сабзида, шумора
Хиакуме (наз.)	10	8	10	5
Зенджи-мару (наз.)	10	9	10	6
Шарқӣ	10	10	10	7
Шохона	10	10	10	7
Ваҳдат	10	9	10	6
Ваҳш	10	9	10	6
Тоҷикӣ	10	6	10	4
Ҳисорӣ	10	7	10	4

Аз нишондодҳои ҷадвали 1 бар меояд, ки, навъҳои хурмои шарқии дар омӯзиш қарордошта дар мукоиса бо навъҳои назоратӣ дар тагпайванди хурмои кавказӣ қобилияти часпиш ва сабзиши мугчаҳои пайвандӣ зиёд аст. Аз ҳар як навъ 10-тогӣ ҷашмак пайванд гузаронида, дар натиҷа сабзиши мугчаҳои пайвандӣ дар тагпайванди хурмои кавказӣ дар навъҳои омӯзишӣ 90-100 дар навъҳои назоратӣ 80-90% дар тагпайванди хурмои виргинӣ 60-70, мутаносибан 50-60%-ро ташкил медиҳад. (диаграммаи 1).



## Диаграмаи 1- Сабзиши муғчаҳои пайвандкардашуда дар тагпайвандҳои гуногуни навъҳои хурмои шарқӣ, (%)

Сабзиш ва часпиши муғчаҳои пайванди дар тагпайванди хурмои кавказӣ бештар дар навъҳои Шарқӣ, Шоҳона 100 %, ва Зенджи- мару Ваҳдат ва Ваҳш 90% ҳамин нишондиҳанда дар тагпайвандӣ хурмои виргинӣ дар навъҳои Шарқӣ, Шоҳона 70 %, Зенджи- мару ва Ваҳдат 60 % нишон дода шуд.


Дар умум навъу намунаҳо часпиши ҷашмакҳо дар тагпайванди хурмои кавказӣ 85% дар тагпайванди хурмои виргинӣ 56,2 %-ро ташкил дод. Аз ин бар меояд, ки навъҳои омӯзиши ба тагпайванди хурмои кавказӣ мувоғиқ мебошанд. Интиҳоби ин тагпайванд махсус барои минтақаҳои водигиҳои Ҳисор ва Ваҳш тавсия дода мешавад (ҷадвали 2).

## Ҷадвали 2.- Муқоисаи ҳосили дараҳтони 3-5 сола навъҳои хурмои шарқӣ вобаста аз тагпайванд, (2016-2018)

Навъҳо	Муқоисаи ҳосили ниҳолҳо	
	тагпайванди хурмои кавказӣ, кг/дараҳт	тагпайванди хурмои виргинӣ, кг/дараҳт
Хиакуме (наз.)	10,0	7,0
Зенджи мару (наз.)	11,5	7,5
Шарқӣ	15,2	10,2
Ваҳш	12,3	9,0
Ваҳдат	14,0	10,0
Шоҳона	13,4	8,0
Тоҷикӣ	9,0	6,0
Ҳисорӣ	8,5	6,0
<b>Ба ҳисоби миёна</b>	<b>11,7</b>	<b>7,9</b>

Аз ҷадвали 2 мушоҳида мешавад, ки навъҳои омӯзиши вобаста аз тагпайванд дар тагпайвандҳои кавказӣ ва виргинӣ ҳосили онҳо низ тағйир меёбад; тагпайванди кавказӣ дар навъҳои Шарқӣ- 15,2, Ваҳдат-14,0 ва Шоҳона 13,4 кг, навъҳои номбурда дар тагпайванди виргинӣ -10,2 -10,0, ва 8,0 кг-ро ташкил дод.

Хосилнокӣ дар тагпайванди хурмои кавказӣ нисбати тагпайванди виргинӣ (диаграммаи 2).



Диаграммаи 2. - Фарқи байни ҳосилнокӣ вобаста аз тагпайванҷо кг +, -

Аз диаграммаи 2 аён аст ҳосилнокӣ дар тагпайванди хурмои кавказӣ дар навъҳои омӯзиши аз 3,3 кг дар навъи Вахш то 5,4 кг/ дараҳт дар навъи Шарқӣ мебошад Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки дар тагпайванди хурмои кавказӣ назар ба тагпайванди хурмои виргинӣ ҳосилнокӣ аз ҳар дараҳт ба ҳисоби миёна дар соли таҷриба 3,8 кг. ё 48% зиёд ба қайд гирифта шуд. Ин аз бартарии тагпайванди хурмои кавказӣ дар парвариши навъҳои хурмои шарқии дар омӯзиш қарордошта далолат медиҳад.

Вобаста аз баландшавии ҳарорати солона, давраи аз ороми баромадани хурмои шарқӣ солҳои 2016-2018 назар ба солҳои пешин 1999- 2001 нишондодашуда, ба ҳисоби миёна 8 рӯз барвақтар фаро мерасад.

Чадвали 3. Муконсай-мушохидахой-фенологий дар-волижон-Хисор-ва-Вахш-дар-солхон-таджикот, 2016-2018-й солар

Даррахтон-6-8-сола-миёнаи (солхон: 2016-2018)-й

Навъҳоҳ	Минтақа	Варамкунни мӯғча	Кушодашавии		Гулшукӯфӣ	Пухтарасӣ	Хазонрезӣ
			аввали	оҳирӣ			
Ҳиакуме (наз.)	Вахш	15.03.¤	30.03.¤	09.04.¤	04.05.¤	16.05.¤	20.10.¤
	Ҳисор	25.03.¤	11.04.¤	20.04.¤	14.05.¤	26.05.¤	05.11.¤
Зенджи-марӯ	Вахш	06.03.¤	16.03.¤	25.03.¤	23.04.¤	06.05.¤	02.10.¤
(наз.)	Ҳисор	17.03.¤	26.03.¤	05.04.¤	03.05.¤	26.05.¤	12.10.¤
Шарқӣ	Вахш	14.03.¤	27.03.¤	6.04.¤	01.05.¤	13.05.¤	15.10.¤
	Ҳисор	25.03.¤	08.04.¤	16.04.¤	11.05.¤	23.05.¤	26.10.¤
Ваҳдат	Вахш	08.03.¤	21.03.¤	29.03.¤	27.04.¤	10.05.¤	08.10.¤
	Ҳисор	18.03.¤	01.04.¤	09.04.¤	07.05.¤	20.05.¤	18.10.¤
Шоҳона	Вахш	07.03.¤	18.03.¤	24.03.¤	25.04.¤	08.05.¤	30.09.¤
	Ҳисор	18.03.¤	29.03.¤	08.04.¤	05.05.¤	18.05.¤	10.10.¤
Вахш	Вахш	11.03.¤	24.03.¤	03.04.¤	29.04.¤	11.05.¤	11.10.¤
	Ҳисор	21.03.¤	05.04.¤	14.04.¤	10.05.¤	21.05.¤	22.10.¤
Тоҷики	Вахш	02.03¤	17.04.¤	26.03.¤	25.04.¤	06.05¤	16.10.¤
	Ҳисор	12.03¤	28.04.¤	07.04¤	05.05¤	16.05¤	24.10¤
Ҳисори	Вахш	03.03.¤	16.04.¤	25.03¤	23.04.¤	05.05.¤	14.10¤
	Ҳисор	11.03¤	26.04.¤	05.04.¤	04.05.¤	14.05.¤	23.10.¤

¶

Тадқиқотхой мо нишон доданд, ки рушду нумӯи дарахтон вобаста аз хоку иқлими миңтақа гуногун мебошанд.

Гузариши давраҳои фенологӣ дар дарахтони 6-8 солаи навъу намунаҳои хурмои шарқӣвобаста ба миңтақа водиҳои Вахш ва Ҳисор дар ҷадвали 3.

Аз нишондодҳои давраҳои тақвимии нишондоддашудаи навъҳои гуногуни хурмои шарқӣ бар меояд, ки рушду нумуи онҳо дар водии Вахш назар ба водии Ҳисор дид 10-11 рӯз барвақтар оғоз мейбад. Давраҳои нашъунамо аз давраи вароқунии мугча то ҳазонрез, дар водии Вахш ба ҳисоби миёна 265рӯз ва дар водии Ҳисор 245 рӯзро ташкил медиҳад.

### **Дараҷаи ба сарди тобоварии ниҳолҳои хурмои шарқӣ вобаста аз речай об**


Дар миңтақаҳои хушк дорои иқлими континенталӣ ва хушксолии тобистон, хурмо ба об эҳтиёчи зиёд дорад. Ба сармо тобовар будани хурмои шарқӣ гайр аз хусусиятҳои биологӣ, инҷунин ба ҷорабиниҳои агротехникиӣ, аз ҷумла, таъмин намудани намии хок вобаста аст. Ин омил дар парвариши навъҳои ба сарди тобовар ва дурагаи дарахтони мевадиҳанда аҳамияти қалон дорад (ҷадвали 4).

### **Ҷадвали 4. - Меъёр, миқдори обёйӣ, устуворияти ниҳолҳои навъҳои хурмо шарқӣ ба сардиҳо, миёнаи (2016-2018)**

Навъҳо	Варианти 1, 500-600 м <sup>3</sup> /га		Варианти 2, 500-600 м <sup>3</sup> /га	
	шумораи обмонӣ	миёна, хол	шумораи обмонӣ	Миёна хол
Хиакуме (наз.)	12	1,7	4	3,3
Зенджи мару	12	1,5	4	3,0
Шарқӣ	12	0,25	4	2,0
Шоҳона	12	1,25	4	2,5
Вахш	12	0,4	4	2,15
Ваҳдат	12	0,5	4	2,25
Тоҷикӣ	12	1,7	4	3,6
Ҳисор	12	0,4	4	3,8
<b>дар вариантҳо</b>	<b>12</b>	<b>0,9</b>	<b>4</b>	<b>2,8</b>

Аз ҷадвали 5 ва бармеояд, ки устуворияти навъҳо ба сармо низ аз речай обмонӣ вобастагии қалон дорад, дар варианти 1-ум, дар давраи афзоиш намнокии хок мӯътадил (18-25 %), яъне 12- маротиба обёри гузаронида шуда, буд дар фасли зимистон

бо сармои 10-11°C, дарацаи зарари ин вариант 0,9 хол, дар варианти 2-юм, ки 4- маротиба обёйт шуда, буд намнокии хок паст (9-12%) дарацаи зарар 2,8 хол-ро ташкил дод. Дарацаи зарари навъҳои хурмои шарқӣ ба ҳисоби миёна дар диаграммаи 4.



Диаграммаи 3- Дарацаи осеббинии навъҳои хурмои шарқӣ аз сармо(2016-2018)


Аз диаграммаи 3. бар меояд, ки осеби камтар аз сармо дар умум аз навъҳо дар ҳар ду вариант навъҳои Шарқӣ-1,1, Ваҳш -1,2 ва Ваҳдат -1,3 навъҳои Ҳиакуме-2,5, Зенджи мару - 2,2 хол баҳогузорӣ гардид, ки ин ба сармо тобоварии навъҳои омӯзиширо исбот менамояд. Тадқиқот дар тӯли се сол (зимистони солҳои 2016-2018) дар ҳоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисор ва стансияи зироатҳои субтропикӣ ва ситрусии н. Балхӣ водии Ваҳш дар ниҳолҳои 3-5 сола гузаронида шуд

Вобаста ба баландшавии ҳарорати солона дар минтақаҳои иқлимашон хушк ҳосили дараҳтон кам ва сифати мева паст мешавад. Соли 2018 ҳосилнокӣ ҳам аз дараҳт ва ҳам аз гектар зиёд гардид. Дар навъни назоратӣ аз як дараҳт навъни Ҳиакуме 32 дар водии Ваҳш ва 87,0 кг дар водии Ҳисор, дар навъҳои омӯзиши бошад ин нишондод мутаносибан ба 38,4 ва 100,9 кг расид (ҷадвали 5).

**Чадвали 5. -Муқоисай ҳосилнокии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисору Вахш, дараҳтони 6-8 сола, миёнаи (2016-2018)**

Навъҳо	Минтақа	Ҳосилнокӣ аз 1 дараҳт, кг			Ҳосилнокӣ аз 1 га, тоннна		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Хиакуме (назоратӣ)	Вахш	28,5	19,3	32,3	9,5	6,42	10,75
	Ҳисор	48,0	29,0	87,0	15,9	9,65	28,9
Зенджи-мару (назоратӣ)	Вахш	27,6	12,3	30,8	9,2	4,11	10,2
	Ҳисор	35,8	29,4	52,9	11,9	9,7	17,6
Шарқӣ	Вахш	37,1	7,3	38,4	12,3	2,43	12,7
	Ҳисор	65,0	38,0	113,0	21,6	12,6	37,3
Шоҳона	Вахш	27,7	11,3	30,9	9,2	3,7	10,2
	Ҳисор	43,0	24,0	75,0	14,3	7,9	24,9
Ваҳдат	Вахш	24,69	14,06	30,5	8,2	4,6	10,1
	Ҳисор	55,0	33,0	85,5	18,3	10,9	28,4
Вахш	Вахш	30,1	24,8	38,0	10,0	8,25	12,6
	Ҳисор	53,5	50,6	62,2	17,8	16,8	20,7
Тоҷикӣ	Вахш	29,1	9,6	29,6	9,6	3,12	9,8
	Ҳисор	34,2	20,7	33,7	11,3	6,9	11,2
Ҳисорӣ	Вахш	24,5	10,7	31,9	8,1	3,5	10,6
	Ҳисор	30,8	23,6	38,3	10,2	7,8	12,7
КФМ05	Вахш	1,5	2,1	1,1	0,5	0,7	0,3
КФМ05	Ҳисор	4,2	3,7	9,3	1,5	1,2	3,2


Тибқи нишондод дар ҷадвали 4 дар солҳои тадқиқот соли 2017- дар ҳамаи навъҳо ҳосили дараҳтони хурмои шарқӣ пасттар назар ба солҳои 2016 ва 2018 дар навъҳои назорати аз як дараҳт дар водии Вахш навъи Хиакуме 19,3 кг дар водии Ҳисор 29,0 кг дар навъи омӯзиши Шарқӣ дар водии Вахш 7,3 ва водии Ҳисор 38,0 кг-ро ташкил дод. Ҳосилнокии навъҳои хурмои шарқӣ вобаста ба навъу наунаҳо ва минтақа тафийр мейёбад (диаграммаи 4).



**Диаграммаи 4. Ҳосилнокии навъҳои хурмои шарқӣ аз як дараҳт, кг**

Чуноне ки дар диаграммаи 5 нишон дода шудааст дараҳтони 6-8 сола вобаста ба минтақа, дар водии Ваҳш назар ба водии Ҳисор ҳосилнокӣ нисбатан кам аст. Дар водии Ваҳш аз як дараҳт дар навъҳои Ваҳш-30,9, Шарқӣ -27,6, ва Хиакуме 26,7 кг /дараҳт. Дар водии Ҳисор мутаносибан навъҳои Шарқӣ- 79,0 Ваҳдат-64,0 ва Ваҳш-55,5 кг аз як дараҳт. Ҳосилнокии нисбатан кам аз як дараҳт дар водии Ваҳш дар навъҳои Ҳисорӣ-22,3, Тоҷикӣ- 22,8 кг ва дар водии Ҳисор навъҳои номбурда 30,3 ва 29,6 кг ҳосил ҳисоб карда шуд. Ҳосилнокӣ аз як гектар ба ҳисоби миёна дар солҳои тадқиқот 2016-2018 дар диаграммаи 4 оварда шудааст.

Аз натиҷаҳои мушоҳидаҳои дар диаграммаи 5 оварда шуда, дар водии Ваҳш аз гектар ба ҳисоби миёна ҳосилнокии баланд дар навъҳои Ваҳш-10,28, Шарқӣ -9,19, ва Хиакуме -8,87 /га дар водии Ҳисор бошад навъҳои Шарқӣ- 20,1, Ваҳдат- 19,2 ва Ваҳш-18,4 т/га, нисбатан кам дар водии Ваҳш навъҳои Тоҷикӣ - 7,5 ва Ҳисорӣ -7,4 т/га ва дар водии Ҳисор навъҳои номбурда, 9,8 ва 10,2 тонна аз як гектар ҳосилнокиро ташкил дод. Ҳосилнокӣ навъҳои хурмои шарқӣ бартари зиёд дар ҳар ду минтақа дар навъҳои омӯзиши Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат ва Ваҳш ба ҳисоб гирифта шуд.



Диаграмаи 4. Ҳосилнокии навъҳои хурмои шарқӣ аз як га/т

Сифати меваи дарахтони мевадиҳанда аз он ҷумла хурмои шарқӣ бо усули ҷошнигири баҳогузорӣ карда мешавад, ки бо ин усул мо метавонем сифати зоҳири ва таъму лаззати меваҳоро муайян кунем (чадвали 7).

Баҳои нисбатан баланд аз рӯи хол (0-5) ба навъҳои Шарқӣ 4,4, Шохона 4,4, Вахдат 4,3, Вахш 4,2 ва баҳои паст ба навъҳои Тоҷикӣ-3,7 Ҳисорӣ- 3,5 гузошта шуд. Баҳогузорӣ аз рӯи таъми онҳо, ки дар баъзе навъҳо моддаҳои дабоғи аз он ҷумла танин, ки сабаби тумчии мева мегардад низ ҳисоб карда шуд. Баҳои умуми аз рӯи ҳусусиятҳои хоси ҳочагию биологии навъҳо ва органолептиқӣ, ҳаҷм, сифат, таъм, соҳти зоҳири, итиқолдиҳӣ ва нигоҳдорӣ гузошта шуд.

#### Истеҳсоли меваи хушк ва усулҳои хушккунӣ

Хушккунӣ дар иморати тирезаҳояш қушода, дар даҳаи сеюми моҳи октябр дар ду вариант гузаронида шуд, дар ин маврид ҳарорати ҳаво аз 15 то 25 дараҷа гармиро ташкил медод ва муҳлати хушккунӣ 40 рӯз идома ёфт. Барои хушккунӣ меваҳои пухта ва саҳт аз навъҳои гуногун интиҳоб карда, дар варианти 1-ум бо шакли доира бурида, дар варианти 2-юм меваҳои бутун дар маҳлули дар 1л 50 г шакар илова намуда, маҳлулро ҷушонида, меваҳои бурида ва бутунро ба маҳлул ба мудати 10-15 соня тар карда гирифта, дар риштаҳо кашида, овезон карда мешавад.

Чадвали 6. Баходихий чошнитгирин (дегустация) меваахи хурмын шаркй ба хисоби миёна дар  
солхон талдикот (2016-2018)

Навьхо	Нийтийн хорхийн мера, тохио мера	Хорхийн хорхийн мера, тохио мера						
Хиакуме (наз.)	4,3	3,5	3,7	3,5	4,0	3,8	4,2	3,8
Зөнлүү -мару (наз.)	4,2	3,5	3,8	3,5	3,7	4,5	4,5	3,9
Шаркй	4,8	4,5	4,0	3,5	4,6	4,8	4,8	4,4
Шохона	4,6	4,5	4,2	3,5	4,8	4,8	4,8	4,4
Вахдат	4,5	4,5	4,0	3,5	4,0	4,8	5,0г	4,3
Вахш	4,5	4,0	4,5	3,5	4,0	4,0	5,0г	4,2
Точикл	3,7	3,7	3,0	3,0	3,8	4,0	3,5	3,5
Хисори	3,8	3,2	3,0	3,0	3,6	3,8	4,0	3,4

Дар таҳқиқот аз 8 навъу намунаҳо барои хушккунӣ намунаҳо гирифта шуд (чадвали 8.)

**Чадвали 7. Баҳодиҳӣ ба сифати меваи хушкҳои хурмои шарқӣ, миёнаи (2016-2018)**

Навъҳо	Варианти 1		Варианти 2	
	Моддай хушк %	Баҳои ҷошнгирӣ	Моддай хушк %	Баҳои ҷошнгирӣ
Хиакуме (наз.)	19,3	2,8	21,3	3,5
Зенджи-мару (наз.)	<b>21,5</b>	3,0	<b>23,5</b>	3,6
Шарқӣ	22,3	3,8	24,5	4,8
Шохона	21,0	3,5	24,0	4,5
Ваҳдат	20,4	4,0	23,4	5,0
Ваҳш	23,0	3,8	26,3	4,6
Тоҷикӣ	19,5	2,8	21,5	3,5
Ҳисорӣ	18,8	2,8	20,5	3,6

Аз чадвали 7 бар меояд, моддаи хушк дар ҳар ду варианти бештар дар навъҳои Ваҳш- 23,0 -26,3, Шарқӣ-22,3-24,5% нисбатан кам навъҳои Ҳисорӣ 18,8x20,6 ва Тоҷикӣ 19,5x 21,5% баромад. Дар ҷошнгирӣ баҳои баланд дар ҳар ду варианти навъҳои Ваҳдат 4,0-5,0 хол, Шарқӣ 3,8-4,8 хол, нисбатан баҳои паст дар навъҳои Тоҷикӣ-2,8-3,5 хол ва Ҳисорӣ- 2,8-3,6 хол баҳогузорӣ карда шуд.

**Таркиби биокимиёвии меваи навъҳои хурмои шарқӣ**

Дар таркиби меваи тару тозаи хурмо 77,6-85,9 % об, 14,1-22,4 % моддаҳои хушк, 0,54-1,22 фоиз ҷавҳар, 13,1-20,5 % қанд, 0,02-2,35 фоиз полифенолҳо, 6,4-43,5мг/% витамини С, 0,104-0,386 мг/% қаротин мавҷуд аст. Меваи хурмо ҳамчунин дорои витаминҳои А, Р макро ва микро элементҳо мебошад, [Гулов С.М.,1998].

Интиҳоби навъҳои ояндадор дар қатори ҳосилнокӣ, сифати мева, инҷунун таркиби кимёвии меваи пухтаи хурмо, қандноки, сафедаҳои онҳо, кам будани кислота (турши), моддаҳои ҳалшавандай дабогӣ дар меваи хурмои шарқӣ аҳамияти муҳим дорад. (чадвали 8)

**Чадвали 8. Таркиби биокимиёвии меваҳои навъҳои хурмои шарқӣ, миёнаи (2016- 2018)**

Навъҳо	Моддаи хушк, %	Қанд, %	Моддаҳо и дабогӣ, г %	Ҷавҳар, г %	Витамин
Ҳиакуме	18,5	14,3	0,48	0,14	42,2
Зенҷжи- мару	23,5	18,5	0,45	0,13	25,3
Шарқӣ	25,0	20,0	0,39	0,12	23,0
Шоҳона	26,3	21,6	0,33	0,14	22,2
Ваҳдат	27,5	22,0	0,25	0,13	19,8
Ваҳш	25,3	21,5	0,31	0,14	20,3
Тоҷикӣ	18,4	13,4	0,60	0,14	41,6
Ҳисорӣ	21,0	16,0	0,58	0,13	24,4

Чуноне ки аз ҷадвали 8 бар меояд, моддаҳои хушк дар навъҳои Ваҳдат 27% Шоҳона -26 % Шарқӣ- 25%, Ваҳдат -24% ва нисбатан кам дар навъи Тоҷикӣ-18,4 қанднокӣ дар навъҳои Ваҳдат- 22%, Ваҳш-21% ва Шарқӣ-20%, ва нисбатан кам дар навъи Тоҷикӣ 13,4%-ро ташкил медиҳад, ки нисбати навъҳои назорати зиёд мебошад. Ташхиси таркиби химиявии меваҳо дар корхонаи воҳиди давлатии экспертиза ва озмоиши маҳсулоти фармасевтӣ ва тибии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҷамъоварӣ гузаронида шудааст.


Яке аз самтҳои тадқиқотии мо омӯзиши самаранокии иқтисоди ва истеҳсолии хурмои шарқӣ дар ду минтақаи аз ҷиҳати хоку иқлим гуногун мебошад. Маҳсулотнокии навъу намунаҳои хурмои шарқиро дар давоми се сол ба ҳисоб гирифта, самаранокии иқтисодии онҳо муайян карда шуда, дар ҷадвали 9 оварда шудааст.

**Чадвали 9. - Самараноқин иктисолию истехсолини хурмои шарқии дараҳтони 6-8 сола дар шароити водиҳон Ҳисору Вахш, миёнаи (2016-2018).**

Навъҳо	Минтақа	Ҳосилнокӣ сент./га.	Нарҳи фурӯши 1/сент. мева сомонӣ	Арзиши аслии мева аз 1/сентнер сомонӣ	Даромади умумӣ аз 1 га. ҳаз. сомонӣ	Хароҷоти умумӣ дар 1 га. ҳаз. сомонӣ	Даромади соғ 1/га. ҳаз. сом.
Ҳлакуме (назоратӣ)	Вахш	88,8	250	194,8	194,8	17,3	5,0
	Ҳисор	183,1	250	106,4	106,4	19,5	26,2
Зенҷи- мару (назоратӣ)	Вахш	78,3	220	204,3	204,3	16,0	1,2
	Ҳисор	130	220	133	133	17,3	11,3
Шарқӣ	Вахш	91,9	360	188,2	188,2	17,3	15,7
	Ҳисор	201,9	360	111,4	111,4	22,5	50,1
Шоҳона	Вахш	77,5	320	223	223	17,3	7,5
	Ҳисор	156,0	320	118,5	118,5	18,5	31,4
Ваҳдат	Вахш	76,9	300	208,0	208,0	16,0	7,0
	Ҳисор	192,5	300	109,0	109,0	21,0	36,7
Вахш	Вахш	102,8	320	168,2	168,2	17,3	15,5
	Ҳисор	184,8	320	105,5	105,5	19,5	39,6
Тоҷикӣ	Вахш	75,3	250	225,7	225,7	17,0	1,8
	Ҳисор	98,5	250	175,6	175,6	17,3	7,3
Ҳисорӣ	Вахш	74,5	220	218,7	218,7	15,5	0,8
	Ҳисор	102,8	220	168,2	168,2	17,3	5,3

Тибқи нишондодҳои ҷадвали 9 ҳароҷоти нисбатан кам барои истехсоли меваи хурмои шарқӣ дар ду минтақаи аз ҷиҳати хоқу иқлим гуногун, яъне аз 16 то 22,5 ҳазор сомонӣ ва сарфи маблағи арзиши аслии меваҳо барои як сентнер дар водии Вахш аз 168 сом. (навъи Вахш) то 208 сом. (навъи Ваҳдат). ва дар водии Ҳисор аз 105,5 сом. (навъи Вахш) то 133 сом. (навъи Зенҷи-мару), даромади тоза дар водии Вахш 16,2 ҳаз. сом. (навъи Ваҳдат) то 28,9 ҳаз. сом (навъи Вахш) дар водии Ҳисор 22,7 ҳаз. (Зенҷи-мару) то 78,4 ҳаз. (н. Шарқӣ) ҳисоб карда шуд.

Дарацаи даромаднокии хурмои шарқӣ аз сифат, ҳароҷоти кам ва маҳали парвариш низ баҳо дода мешавад (диаграммаи 6).



Диаграммаи 6. Дарацаи даромаднокии навъҳои хурмои шарқӣ дар водии Ҳисор ва Вахш, %

Аз диаграммаи 6. аён аст, ки дарацаи даромаднокии навъҳои омӯзиши дар минтақаи водии Ҳисор аз 169,7 (навъи Шоҳона), то 222,6 % (навъи Шарқӣ) нисбати навъҳои назоратӣ Занджи мару 65,3 то 134,3 % навъи Хиакуме дар минтақаи водии Вахш бошад дар навъҳои номбурда мутаносибан аз 43 то 90,7% дар навъҳои назоратӣ аз 7,5 то 28,3% зиёд мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки самаранокии навъҳои омӯзиши Шарқӣ, Шоҳона, Вахш ва Ваҳдат дар ҳар ду минтақа ҳамчун навъҳои ояндадор аз навъ назоратӣ бартари дорад.

## Хулоса

1. Муайян карда шуд, ки интихоби тагпайванди хурмои кавказӣ назар ба тагпайванди хурмои виргинӣ, барои навъҳои интихобгардидаи ояндадори хурмои шарқӣ бартари зерин дорад; ба ҷои доими кучонидан то 90-95 %, сабзиши ниҳолҳо, ҷаспиши мучаҳои пайванди то 80-85%, тез ба ҳосил дароӣ дар 3-4 солаги, ҳосили баланд то 48% зиёд нисбат ба тагпайванди хурмои виргинӣ мебошад. [1-М, 12-М,].

2. Аз натиҷаи гузаронидани омӯзиши ҳусусиятҳои биологӣ ва мушоҳидаҳои фенологӣ муайян карда шуд, ки давраи аз оромӣ баромадани дараҳтони хурмои шарқӣ байни навъҳои тезпаз ва дери 8- рӯз ва фарқи байни водиҳо 11 рӯз мебошад, яъне дар водии Вахш дараҳтон барвақтар аз оромӣ мебароянӣ. Пухтарасии меваҳо фарқи байни навъҳои барвақтӣ ва дерӣ 16-17 рӯз ва фарқи байни водиҳо 11-12 рӯз барвақт дар водии Вахш назар ба водии Ҳисор мебошад. Давраҳои нашъу нумӯи хурмои шарқӣ дар водии Вахш ба ҳисоби миёна 265рӯз ва дар водии Ҳисор 245-250 рӯзро ташкил медиҳад. Асосан гузаронидани мушоҳидаҳои фенологӣ, ҳусусан давраҳои гулкунӣ, давонокии он ва фарқ кардани гулҳои ҷинсҳои нарина ва модина барои гузаронидани корҳои селексионӣ лозим меояд, [7-М, 10-М, 13-М,].

3. Муайян карда шуд, ки таъмини мӯтадили намнокии хок дар давраи афзоиш, устуворияти дараҳтонро ба сармо зиёд мекунанд. Дар таҷрибаҳои гузаронида устуворияти баланд ба сармо навъҳои омӯзиши Шарқӣ-1,1, Вахш -1,2 ва Ваҳдат -1,3 ва навъҳои назоратӣ Ҳиакуме-2,5, Зенджи-мару -2,2 хол баҳоғузорӣ гардид, [2-М, 10-М,].

4. Муайян карда шуд, ки дар минтақаҳои тадқиқотии мо, дар водии Ҳисор маҳсулотнокӣ назар ба минтақаҳои субтропикии хушӯк, яъне водии Вахш зиёд мебошад. Аз натиҷаҳои ба даст омадаи мо дар водии Вахш аз гектар ба ҳисоби миёна ҳосилнокии баланд дар навъҳои омӯзишии Вахш-10,28, Шарқӣ -9,19, ва навъи назоратӣ Ҳиакуме -8,8т/га дар водии Ҳисор бошад навъҳои Шарқӣ- 20,1, Ваҳдат- 19,2 ва Вахш-18,4 т/га, нисбатан кам дар водии Вахш навъҳои Тоҷикӣ - 7,5 ва Ҳисорӣ -7,4 т/га ва дар водии Ҳисор навъҳои номбурда,

9,8 ва 10,2 тонна аз як гектар ҳосилнокиро ташкил доданд, [5-М, 8-М,].

5. Сифати мева аз натицаи гузаронидани чошнгирий (дегустация) баҳои нисбатан баланд аз рӯи хол (0-5) ба навъҳои Шарқӣ 4,8, Ваҳдат 4,6 Шоҳона 4,6 ва баҳои паст ба навъҳои Тоҷикӣ-3,7 Ҳисорӣ- 3,5 гузошта шуд, [10-М, 12-М,].

6. Аз натицаҳои хушккунии меваҳои хурмои шарқӣ муайян карда шуд, ки баҳои нисбатан баланд аз рӯи ҷашидан ва сифати меваи хушк дар навъҳои омӯзиши Ваҳдат 4,0x5,0 хол, Шарқӣ 3,8-4,8 хол, нисбатан баҳои паст дар навъҳои Тоҷикӣ-2,8-3,5 хол ва Ҳисорӣ- 2,8-3,6 хол гузошта шуд, ки нисбати навъҳои назоратӣ Ҳиакуме ва Зенджи-мару 1,0- 1,5 хол баланд мебошад, [6-М, ].

7. Аз натицаҳои тадқиқот аниқ карда шуд, ки барои истеҳсоли меваи хурмои шарқӣ дар ду минтақаи аз ҷиҳати хоқу иқтисоди гуногун, ҳароҷот дар як гектар барои истеҳсоли мева аз 16,0 то 22,5 ҳазор сомонӣ инҷунин дараҷаи даромаднокии иқтисодӣ навъҳои омӯзиши дар минтақаи водии Ҳисор аз 169,7 (навъи Шоҳона), то 222,6 % (навъи Шарқӣ) нисбати навъҳои назоратӣ (Зенджи-мару) 65,3 то 134,3 % навъи (Ҳиакуме) дар минтақаи водии Ваҳш бошад дар навъҳои номбурда мутаносибан аз 43 то 90,7% дар навъҳои назоратӣ аз 7,5 то 28,3% зиёд мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки самаранокии навъҳои омӯзиши Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳш ва Ваҳдат дар ҳар ду минтақа ҳамчун навъҳои ояндадор аз навъҳои назоратӣ бартари дорад. [5-М, 8-М,].

8. Самаранокии баланди иқтисодии парвариши хурмои шарқӣ на фақат аз нарҳи фурӯши он вобастагӣ дорад, балки аз тез ба ҳосил дароии он, баланд будани ҳосил, аз ҳама асос ин паст будани арзиши аслии мева бо назардошти дар навбати ҳуд бо ҳароҷоти кам дар буриши шоҳаҳо, заرارрасонҳо ва қасалиҳо ин аз як тараф ҳароҷоти нисбатан кам, нисбат ба дигар дараҳтони мевадиҳанд ва аз тарафи дигар - меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, асоси арзиш ва қимати меваи хурмои шарқиро баланд мекунад, [5-М, 8-М,].

### **Тавсияҳо оид ба истифодай амалии натицаҳои тадқиқот**

1. Навъҳои интихобгардидаи Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат ва Ваҳш аз ҷиҳати устуворияти баланд доштан ба сармо,

касалихо, бартарии сифати мева, мувофиқ барои хушккунӣ ҳамчун навъҳои ояндадор ба водиҳои Ҳисор ва Вахш тавсия дода мешавад.

2. Навъҳои интихобшуда навъҳои миёнапазу дерпаз ва якхонагию духонагӣ буда, дар истеҳсолот навъҳои Вахдат ва Шоҳона ҳамчун гардолудкунанда дар боғҳо ва навъи Вахдат барои хушконидан низ тавсия дода мешавад.

### **Интишоорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия**

#### **Маколаҳо дар маҷалаҳои тақризшаванда:**

**[1-М]. Раҳматов С.Х.** Сабзиш ва қадкашии ниҳоли навъу намунаҳои хурмои шарқӣ вобаста аз тагпайванд / С.Х. Раҳматов// Гузоришҳои АИКТ – 2017-№1 (51).- С 28-31.

**[2-М]. Раҳматов С.Х.** Степень морозоустойчивости саженцев хурмы восточной в зависимости от водного режима почвы / С.Х. Раҳматов// Доклады ТАСХН-2019.-№ 1(59).- С.32-34.

**[3-М]. Раҳматов С.Х.** Рушду нумуъи ниҳоли хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисор / С.Х. Раҳматов, Н. Камолов // Гузоришҳои АИКТ - 2021-№1 (67).-С. 39-42.

**[4-М]. Раҳматов С.Х.** Причины осыпания плодов хурмы восточной и меры его предотвращения в условиях Гиссарской долины / С.Х. Раҳматов// Известия НАНТ- 2021,-№4. - С54-59.

**[5-М]. Раҳматов С.Х.** Маҳсулнокии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Вахш ва Ҳисор / С.Х. Раҳматов// Кишоварз ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур - 2023 -№1(98).- С.78-80.

**[6-М]. Раҳматов С.Х.** Пример применения водного раствора серебра при хранении овощей и фруктов / С.Х. Раҳматов, Г.М. Бобизода, Р.У. Эшанқулова //Наука и инноватция ТНУ- 2023,-№1. - С 91-100.

**[7-М]. Раҳматов С.Х.** Сравнительное изучение роста и развития хурмы восточной в регионах с различными климатическими условиями / С.Х. Раҳматов // Гузоришҳои АИКТ- 2024,-№ 4. - С 71-75.

**[8-М]. Раҳматов С.Х.** Касалӣ ва ҳашаротҳои заرارрасони хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисору Вахш ва чораҳои пешгирии онҳо /С.Х. Раҳматов // Гузоришҳои АИКТ-2024 - № 4.- С. 85-89.

## 11. Мақолаҳо ва фишурдаи интишорот дар маҷмуаҳои дигар чопшуда:

[9-М]. Раҳматов С.Ҳ. Ҳусусиятҳои биологӣ ва нашъунамои навъу хурмои шарқӣ. / С.Ҳ. Раҳматов, М.Табарова // Маводи конф. илмию амалии ҷумҳурӣ “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи қишоварзӣ”, баҳшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” -2021.- С. 50-53.

[10-М]. Раҳматов С.Ҳ. Таъсири зичи тагпайвандҳои хурмои шарқӣ ба ҷаҳони муғчашо ва истеҳсоли ниҳоли пайванди / С.Ҳ. Раҳматов, С. Абдулоев// Маводи конференсияи илмии ҷумҳурӣ «Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи қишоварзӣ» баҳшида ба даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор 2018-2028» - 2022.- С.41-42.

[11-М]. Раҳматов С.Ҳ. Нашъу нумӯи ва маҳсулнокии хурмои шарқӣ вобаста аз тагпайванд дар шароити водии Ҳисор / С.Ҳ. Раҳматов// Маводҳои конференсияи илмии назариявии байналмилалий дар мавзуи «Истифодабарии усулҳои инноватсионӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии дараҳтони мевадиҳанда, ангур ва зироатҳои сабзавотию картошқа» - 2022.- С.21-25.

[12-М]. Раҳматов С.Ҳ. Фенологияи навъҳои хурмои шарқӣ вобаста ба минтақаҳо/ С.Ҳ. Раҳматов, З. Сафарова, Б.С. Ҳолова // Маводи конференсия илмии ҷумҳурӣ ”Нақши олимони ҷавон дар рушди илм инноватсия ва технологияи қишоварзӣ” баҳшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ва даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор 2018-2028” -2023.- С. 101-109.

[13-М]. Раҳматов С.Ҳ. Производственно-хозяйственная эффективность плодов восточной хурмы в зависимости от различных почвенно-климатических регионов республике Таджикистан /С.Ҳ. Раҳматов // Международный научный журнал «in the world of science and education» ОФ

**Номгүй ихтисораҳо ва аломатҳои шартӣ**

**АИКТ-** Академия илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

**АМИТ-** Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

**ВБД-** варақаи бақайдгирии диссертатсия

**га-гектар**

**г-грамм**

**ИБТС-** Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткорӣ

**кг/д-киллограмм** дар 1дараҳт

**кг-киллограмм**

**КОА-**Комиссияи олии аттестатсионӣ

**мг-** миллиграм,

**мм-** миллиметр

**ҳаз-** ҳазор

**РКД-** Рақами қайди давлатӣ

**с/га-сентинер** дар 1гектар

**см-** сантиметр

**сом-** сомонӣ

**т/га-тонна** дар 1гектар

**Рӯйхати адабиётҳои истифодашуда**


1. Гулов С.М. Богдории субтропикӣ. /С.М. Гулов //Душанбе- 1998 с. 13.
2. Животинская С.М. «Субтропические культуры» /С.М. Животинская, О.П. Кульков //№5 Грузинская ССР. «О морозоустойчивости восточной хурмы в Узбекистане» - 1968. с. 88.
3. Загребельный И.А. Эффективное использование агроклиматических ресурсов субтропиков Таджикистана. /И.А. Загребельный // Душанбе -1985. с. 18-21.
4. Запрягаева В.И. Лесные ресурсы Памиро-алая. /В.И. Запрягаева //Ленинград 1976, 31с.
5. Кулиев Ф.А. Субтропические культуры /Ф.А. Кулиев, З.М. Гасанов, С.М. Рамазанов и и др. //Г.Сухуми №5. -1973. с. 45-47.
6. Кульков О.П. Животинская С.М. Температурные условия прохождения фенофаз восточной хурмы на юге Узбекистана, /О.П. Кульков, С.М. Животинская //Труды НИИСВ и в им. Р.Р. Шредера, вып. 32, Ташкент, Изд-во «Фан» АН УзССР, 1970с. - 26.

7. Кулян Р.В. Цитрусовые культуры как объект для селекции /Р.В. //Субтропическое и декоративное садоводство. 2012.- Вып. 46. - №1. - с.71-74.
8. Кутеминский В.Я. Условия почвообразования и география почв. /В.Я. Кутеминский, Р.С. Леонтьева //Почвы Таджикистана. Вып.1. – Душанбе: Ирфон, 1966. - С. 60-65.
9. Массовер Б.Л. Селекция и агротехника субтропических культур /Б.Л. Массовер, В.П. Бурякова //Душанбе -1980,- С. 21-22.
10. Мурри Н.М. Хурма. /Н.М.Мурри //Сухуми: АБГИЗ, -1941. -63с.
11. Мухамедов А.Х. Пути повышения урожайности садов, виноградников и овощных культур. /А.Х. Мухамедов, Г. Дадожанов //Материалы научно-практической конференции, «Перспективы возделывания культуры хурмы восточной в предгорных зонах северного Таджикистана». Институт садоводства виноградарства и овощеводства. г. Душанбе 21.12. 2012. – Стр. 276. Абз. 1.
12. Назиров Х.Н. Анорпарварӣ /Х.Н. Назиров, Н. Камолов, М. Мамадалиева М. //Душанбе -2017 - с. 14.
13. Омаров М.Д. Перспективные гибриды хурмы восточной / М.Д. Омаров // Садоводство и виноградарство. - 2014. - № 4. - с. 26 - 27.
14. Розанов, Б.С. Восточная хурма и перспективы её культуры в Таджикской ССР. /Б.С. Розанов, Н.Г. Ширяева //Сельское хозяйство Таджикистана. – 1949. - №4. – с. 26
15. Рындин А.В. Коллекция цитрусовых культур во влажных субтропических зонах России. /А.В. Рындин, Р.В. Кулян //Садоводство и виноградарство, 2016. -№5. – с. 24-30.
16. Сафаралиев Х.Ф. Даромаднонокии иқтисодии дараҳтони себ вобаста аз намудҳои тагпайванд. /Х.Ф. Сафаралиев //Автореферат диссертатсияи барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои биологӣ Душанбе – 2009. - 27 с.
17. Ширяева Н.Г. Возделывание хурмы восточной в Таджикистане. /Н.Г. Ширяева, Б.С. Розанов, //Сталинабад -1961 с. 12-13. абз.3.
18. Эшанкулов У.Э. Цулая Субтропические культуры, Грузинской ССР. «Субтропические Таджикистана» /У.Э. Эшанкулов, В.И. Цулая //1982 - №6 106 с.
19. Klepper B., Browning V.D., Tauior H.M. Stem diameter in relation to plant water stress / B. Klepper, V.D. Browning, H.M. Tauior // Plant. Physiol. - 1971. - V. 48. - №6. - P. 683–685.

ТАДЖИКСКАЯ АКАДЕМИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК  
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА ВИНОГРАДАРСТВА И  
ОВОЩЕВОДСТВА

*На правах рукописи*

УДК: 632.52:634.451/.451



РАХМАТОВ СУЛАЙМОН ХАСАНОВИЧ

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И СЕЛЕКЦИОННАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ХУРМЫ ВОСТОЧНОЙ В  
УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ И ВАХШСКОЙ ДОЛИНАХ

АВТОРЕФЕРАТ  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата сельскохозяйственных наук

по специальности 06.01.05 - Селекция и семеноводство  
сельскохозяйственных растений

ДУШАНБЕ - 2026

Диссертационная работа выполнена в отделе плодоводства и ягодных культур Института садоводства, виноградарства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук (ТАСХН)

**Научный руководитель:** Камолов Нурмахмад – кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий сотрудник Института садоводства, виноградарства и овощеводства ТАСХН.

**Официальные оппоненты:**

Бобозода Илхомдjon Абдушукур-доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники ТГПУ имени Садриддина Айни.

Шомамадова Зубайды Дустмамадовна - Кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-математических наук МУТП.

**Ведущая организация:**

Хорогский государственный университет имени Моёншо Назаршоева.

Защита диссертации состоится «3» марта 2025 года в 14<sup>00</sup> часов на заседании диссертационного совета 6-Д.КОА – 096 которое состоится при Таджикской академии сельскохозяйственных наук по адресу: 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 21<sup>а</sup> E-mail: aikt91@mail.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджикской академии сельскохозяйственных наук.  
<http://www/taas.tj>,

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 году.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат сельскохозяйственных наук

*Гуль*

Пулатова Ш.С.

## **Введение**

**Актуальность темы исследования.** Обеспечение продовольственной безопасности и ускоренная индустриализация страны без развития сельскохозяйственного сектора, включая садоводство и виноградарство, является актуальной проблемой дня. В последние годы растет спрос на фрукты и виноград, которые обладают лечебными свойствами и богаты питательными веществами. Одним из способов повышения урожайности является создание новых высокоурожайных сортов, отвечающих требованиям рынка, внедрение современных технологий создания садов. Принимая во внимание питательное, лечебное и экономическое значение хурмы восточной, которая является частью садоводческих регионов республики, пригодных для выращивания этого фрукта, и в связи с этим нами разработаны и проведены, настоящее тематическое исследование.

### **Уровень научной разработанности исследуемой проблемы.**

В ходе научно-исследовательской работы, опираясь на достижения и результаты работ ведущих ученых в области садоводства отечественных и зарубежных селекционеров, среди них: А.М. Кормилицин [67, с. 76], Н.М. Мурри [94, с. 63], Б.С. Розанов [141, с. 32-34], Н.Г. Ширяева [171 с. 12-13], С.М. Животинская [46, с. 88], О.П. Кульков [70, с. 26], Ф.А. Кулиев [68, с.45-47], В.И. Запрягаева [52, с. 16-18], Б.Л. Массовер [87, с. 3-20], У.Э. Эшонкулов [173, с. 106], И.А. Загребельный [49, с. 18-21], С.М. Гулов.[29, С. 13-15], D.A. Neuwald, A.A. Saquet, I. Sestari and C.K. Sautter [192, с. 51-56], X.Ф. Сафаралиев [149, с. 27], P.B. Кулян [72, с. 71-74], А.Х. Мухамедов [99, с. 276], E. Badal [179, с. 154-160], М.Д. Омаров [108, с.26-27], А.В. Рындин [143, с. 24-30], X.Н. Назиров [102, с. 14-18], Н. Камолов [102, с. 14-18], Н. Камолов, С.Х. Раҳматов [147, с. 28-31.], [148, с. 21-24.] и другие, посвятившие свои научные исследования выращиванию и селекции фруктовых, субтропических и цитрусовых деревьев, а также законам и постановлениям Правительства Республики Таджикистан, направленных на улучшение и развитие садоводства и виноградарства. Кроме того, в ходе проведения научно - исследовательских работ были непосредственно использованы данные Государствен-

ного статистического агентства при Президенте Республики Таджикистан, Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, агентства по гидрометеорологии при Правительстве Республики Таджикистан и рекомендации научно-исследовательских учреждений.

**Тема диссертации тесно связана с приоритетными научно – исследовательскими направлениями и с рядом государственных программ, в том числе:**

1. Программа развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы №424 от 3 июля 2014 года, согласно которой более 20000га садов созданы под фруктовые деревья;

2. Государственная программа развития Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана на 2016 - 2020 годы, № 483 от 20.10.2016;

3. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 марта 2018 года №165 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Таджикистан» №793 от 30 декабря 2015 года, “Очередная программа развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы”.

4 Тесно взаимосвязана с темой диссертация, также проведены исследования в соответствии с проектами заказа научных работ отдела плодоводства и ягодоводства на 2016-2020 годы на тему “Создание экологически устойчивых сортов плодовых деревьев, орехоплодных, цитрусовых, ягод, совершенствование технологии выращивания саженцев и создание интенсивных садов “ ГР №0116TJ00625.

### **Общая характеристика исследования**

**Цель исследования.** В условиях Гиссарской и Вахшской долинах, в коллекциях восточной хурмы, изучить агробиологические и селекционные характеристики сортов хурмы восточной, влияние подвоев на развитие и рост сортов, выявить перспективные сорта для представления в Государственную комиссию по испытанию сортов сельскохозяйственных культур и защите сортов Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, а также

определить сорта на основе положительных характеристик для селекционной работы.

**Задачи исследований:**

- Изучение подвоев восточной хурмы в зависимости от местных условий;
- Изучение биологических характеристик и фенологических наблюдений хурмы восточной;
- Определение урожайности и биохимического состава хурмы восточной;
- Выявление перспективных местных селекционных сортов для производства;
- Экономическая эффективность выращивания хурмы восточной в условиях Гиссарской и Вахшской долинах.

**Объект исследования.** В качестве объектов исследования были использованы сорта и образцы хурмы восточной: Шарки, Шохона, Вахдат, Вахш, Точки и Хисори, являющиеся сортами селекции Института садоводства, виноградарства и овощеводства, а также использованы подвои хурмы кавказской (*Diospyros lotus*), и хурмы Виргинской (*Diospyros virginiana*). В качестве контрольных сортов были выбраны сорта Хиакуме и Зенджи-мару.

**Тема исследования.** Агробиологическая и селекционная особенность сортов хурмы восточной. С целью проведения научных исследований и выделения перспективных сортов для внедрения в производство. В результате изучения комплекса агробиологических и хозяйственных признаков - морозостойкости, качество плодов, условий хранения, транспортировки и сушки в условиях республики, особенно в Гиссарской и Вахшской долинах.

**Научная новизна исследования.** Впервые, в условиях Вахшской и Гиссарской долинах на высотах от 350 до 1300 м над уровнем моря восстановлена коллекция сортов хурмы восточной, из 15 сортов и образцов отличающиеся по хозяйственно биологическим признакам: морозостойкости, урожайности и качеству плодов, хранению и сушки выделено 3 сорта, которые переданы в Государственную комиссию по сортознанию сельскохозяйственных культур и защиты сортов при Министерстве сельского хозяйства Республики

Таджикистан для дальнейшего изучения. Для сушки отобран сорт «Вахдат».

**Теоретическая и научно-практическая значимость исследования.** Значимость научных исследований заключается в получении перспективных сортов с высокой урожайностью, качественными плодами, высокой лёжкостью, транспортабельностью и совместимостью с сушкой, которые будут использованы в дальнейшем для создания садов хурмы восточной. Решение стратегических вопросов Правительства Республики, предлагает обеспечение продовольственной безопасности и снабжения пищевой промышленности сырьем. Также для селекции использованы сорта, обладающие экономическими и биологическими характеристиками. Результат научно исследовательских работ внедряется на площади 10 гектаров в «Саду 15-летия Независимости» Республики Таджикистан в хозяйстве (ООО) Общество с ограниченной ответственностью в сельском сообществе «Сомон» и на 21га в опытном хозяйстве Сунбула города Гиссара.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Изучение биологических характеристик, фенологических наблюдений подвое хурмы восточной в условиях Гиссарской и Вахшской долинах.
2. Показатели продуктивности, урожайности и биохимического состава свежих плодов хурмы восточной.
3. Экономическая эффективность выращивания местных селекционных сортов хурмы восточной в условиях Гиссарской и Вахшской долинах

**Степень достоверности результатов.** Результаты научных исследований по отбору сортов хурмы восточной были проведены в лаборатории и в полевых условиях по принятым в садоводстве методикам: «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» Мичуринск и Орел [129, с.310], экологическая чувствительность сортов и гибридов по модели, предложенной А.П. Драговцевой, [42, С.46], химический состав плодов - сухие вещества, пектин и др. определены по методике «Методы биохимического исследования растений» А.И. Ермаков, [44,

с.127], достоверность результатов исследования определили методом дисперсионного анализа Б.А. Доспехов, [36, С. 351] с использованием компьютерной программы Microsoft Excel [2010].

### **Соответствие диссертации паспорту научной специальности**

1. Тема диссертации – «Агробиологическая и селекционная характеристика сортов хурмы восточной в условиях Гиссарской и Вахшской долинах», содержание диссертации и проведенные исследования соответствуют паспорту специальности 06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений и соответствует следующим направлениям:

**Пункт 1, часть 2.** Создание новых исходных материалов для селекции, совершенствование существующих методов и технологий селекции и семеноводства.

**Пункт 2.** Создание видов растений с новыми характеристиками и ценными хозяйственными свойствами для селекции путем изучения различных методов и обоснования новых сортов и гибридов, разработка новых методов, совершенствование существующих методов и технологий селекции и семеноводства.

**Пункт 3.** Растительные ресурсы как исходные материалы для селекции.

**Пункт 4.** Методология, методы и процедуры селекции и семеноводства (прививка, методы отбора для селекции и семеноводства, оценка и закаливание).

**Пункт 5.** Методы и технологии выявления ценных сельскохозяйственных свойств селекционных материалов и семян (растений). Разработка условий зонирования сортов (гибридов) и регионального размещения семян и семенных хозяйств, агротехнических методов посадки селекционных материалов с учетом региональных эколого-географических особенностей.

**Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании**  
Личный вклад автора в подготовку и правильный выбор темы исследования, включая теоретическое и практическое обоснование выбранного направления и методов

исследования. Также организацию и проведение лабораторных экспериментов, апробацию и внедрение результатов исследований. Статистический анализ, обработка и внедрение полученных результатов исследований и публикация статей. Автор совместно с научным руководителем провел большую работу, которая отражает общее развитие диссертации, автореферата и оригинальность текста диссертации. Непосредственное участие автора с целью получения научных результатов равны 86,3 %.

**Апробация и реализация результатов диссертации**  
Исследования проводились в 2016-2018 годах. Апробация результатов, проведенных исследований ежегодно обсуждались на заседаниях Совета ученых Института садоводства, виноградарства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Ежегодно (2016-2018гг.) проводились выступления и доклады на заседаниях отдела науки, обучения и подготовки научных кадров Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Научные положения, выводы и предложения производству обоснованы на основе аналитических и экспериментальных данных, степень их достоверности доказана статистической обработкой с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. Выводы и предложения основаны на научных исследованиях, проанализированных современными методами. Результаты научных работ, исследований были опубликованы на республиканских научно-практических конференциях, в рецензируемых газетах и журналах: республиканской научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в развитие науки, инноваций и сельскохозяйственных технологий», посвященные 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, 2020-2040гг. «Двадцать лет изучения и развития естественных, точных и математических предметов в сфере науки и образования», Душанбе. 2021, ТАСХН; Материалах республиканской научной конференции «Вклад молодых ученых в развитие сельскохозяйственной науки, инноваций и технологий», посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», Душанбе-2022; Материалах международной

теоретической научной конференции по «Использованию инновационных методов повышения продуктивности «плодовых деревьев, винограда, овощных культур и картофеля», Душанбе. 2022; Материалах республиканской научной конференции «Роль молодых ученых в развитии науки, инноваций и Агро- технологий», посвященной 2020-2040 годам «Двадцать лет обучения и развития» естественных наук, точных и математики в сфере науки и образования», международная акция десятилетия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028гг., Душанбе, 2024 и др.

### **Публикации по теме диссертации**

Результаты исследования опубликованы в 13 научных статьях, в том числе 8 статей в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 1 статья в Международной конференции и 4 статей в материалах республиканских научно-теоретических конференциях ТАСХН, которые отражают основную суть диссертационной работы.

**Структура и объем диссертации.** Диссертационная работа изложена на 161 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения, рекомендации по практическому использованию результатов, приложений, списка использованной литературы. Научная работа иллюстрирована 29 таблицами, 23 рисунками и 10 диаграммами. Список использованной литературы состоит из 195, в том числе 19 авторов на английском языке.

### **Основные части научной работы**

**Программа и методы исследований.** Научные исследования по изучению агробиологических и селекционных особенностей сортов хурмы восточной проведены в опытном хозяйстве Сунбула, города Гиссара на высоте 700м – 800 м над уровнем моря и в опытной станции субтропических и цитрусовых культур на высоте 300-350м над уровнем моря в районе Дж. Балхи Института садоводства, виноградарства и овощеводства ТАСХН.

По показателям климата, Гиссарская долина является одной из самой благоприятной для садоводства Таджикистана. Период теплой погоды в среднем составляет 235-240 дней.

Суммарная температура воздуха выше 0°C равна 4900°C, выше 10°C равна 4200°C, Агроклиматические ресурсы, [1, с16].

Зима 2016-2017гг, когда ночная температура в течение короткого времени была отрицательной -12-13°C, в этот период на опытных участках от холода были повреждены молодые деревья и одно-двухлетние ветви продуктивных деревьев.

### **Описание почвы Гиссарской долины**

Почвы предгорных и горных районов Гиссарской долины, типичны для условий республики, которые представлены преимущественно серыми и бурьими карбонатами (нормальная зола). В.Я. Кутеминская, Н.В. Леонтьева, [60, с. 60-65].

Эта почва мало отличается от светло-серой почвы, пригодна для создания садов с плодовыми деревьями. Она содержит около 2-3% гумуса, влажность 23-25%, удельный вес 1,12-1,30 г/см3. (анализы почвы проводились в Институте почвоведения и агрохимии ТАСХН).

### **Климат долины Вахш**

Вахшская долина с ее теплым климатом относится к засушливой субтропической зоне. Вахшская долина расположена на высоте 329-425м над уровнем моря, годовое количество осадков составляет 150-200мм. В большей части территории долины выпадает от 200 до 400мм осадков. Максимальная температура в теплый период достигает 48,5°C. [Владимир, 1982].

### **Почва Вахшской долины**

Долина представлена светло-серозёмной почвой - на предгорных равнинах и склонах низких Адыр, на высоте 300-500м над уровнем моря, содержит 1,0 - 1,5% гумуса. Содержание карбонатов составляет 20%. Почва в этом регионе орошаемая и выделена в подтип.

### **Результаты исследований**

Результатами исследований устанавливали, что особую роль при выращивании хурмы восточной имеют подвои. В качестве подвоев хурмы восточной использовали сеянцы кавказской - *Diospyros Iotus* I, и виргинской *Diospyros Virginiana* I.

Правильный выбор подвоев, позволяет обеспечить морозоустойчивость и в период летней засухи. Приживаемость окулированных глазков, обеспечивает их быстрое вступление в плодоношение, высокую урожайность и длительную продолжительность плодоношения хурмы восточной. В результате исследований по приживаемости и всхожести привитых глазков на подвоях хурмы кавказской и виргинской установили, что они различные (табл. 1).

**Таблица 1. Приживаемость окулированных почек сортов хурмы восточной на кавказском и виргинском подвоях (2016-2018 гг.)**

Сорт	Подвой кавказский			Подвой виргинский		
	окулирование почек, шт.	Приживаемость, почек, шт.	Приживаемость, в %	окулирование почек, шт.	Приживаемость почек, шт.	Приживаемость, в %
Хиакуме (кон)	10	8	80	10	5	50
Зенджи-мару (кон.)	10	9	90	10	6	60
Шарки	10	10	100	10	7	70
Шохона	10	10	100	10	7	70
Вахдат	10	9	90	10	6	60
Вахш	10	9	90	10	6	60
Точки	10	6	60	10	4	40
Хисори	10	7	70	10	4	40
<b>Среднее</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>56,25</b>

Следует отметить, как видно из таблицы 1, что приживаемость почек изучаемых сортов на контрольном варианте больше по сравнению с подвоям кавказская, составляет 90- 100, 80-90%. На подвое виргинская 60-70, 50-60 % соответственно. Таким образом, подвой хурмы кавказской условиях Гиссарской и Вахшской долинах Таджикистана являются наиболее перспективными в качестве подвоя.

Приживаемость глазков каждого сорта приведено в диаграмме 1.




Диаграмма 1- Приживаемость окулированных глазков сортов хурмы восточной на различных подвоях, %

Так, на подвое хурмы кавказской приживаемость и всхожесть сортов Шарки, Шохона и Зенджи-мари составила - 100%, у сорта Вахдат 80%. Эти же показатели на подвое хурмы виргинской составили у сортов Шарк и Шохона 70%, у сортов Зенджи-мари и Вахдат 60%. В целом по сортам приживаемость глазков на подвое хурмы кавказской составила 85%, на подвое хурмы виргинской 56,2%. Урожайность восточной хурмы в зависимости от выбранного подвоя (диаграмма 2).

Из таблицы 2 видно, что урожайность исследуемых сортов изменяется в зависимости от подвоев (кавказский, виргинский). Так, на подвое хурмы кавказской урожайность сортов составила: Шарки - 15.2, Вахдат-14.0, Шохона – 13.4кг/дерева. На подвое хурмы виргинской урожайность на перечисленных сортах составила: - 10.2; 10.0; и 8.0кг соответственно, разница урожайность сортов хурмы восточной на подвое кавказской хурмы в сравнении с виргинского

подвоя, это свидетельствует, что изученные сорта соответствуют подвою хурмы кавказской диаграмма 2.

**Таблица 2. Урожайность сортов восточной хурмы 3-5 летних деревьев в зависимости от подвоя (2016-2018)99**

Сорта	Урожайность		Разница урожайност, кг +, -
	На подвое кавказский, кг/дерево	На подвое виргинский, кг/дерево	
Хиакуме (кон.)	10,0	7,0	3,0
Зенджи-мару (к.)	11,5	7,5	4,0
Шарки	15,2	10,2	5,4
Вахш	12,3	9,0	3,3
Вахдат	14,0	10,0	4,0
Шохона	13,4	8,0	5
Тачики	9,0	6,0	3,0
Хисори	8,5	6,0	2,5
<b>Среднее</b>	<b>11,7</b>	<b>7,9</b>	<b>3,8</b>

Выявлено, что разница урожайности изучаемых сортов хурмы восточной в среднем в годы исследований на подвое хурмы кавказской составило от 3.3кг сорта Вахш до 5.4кг/дерево у сорта Шарки. В общем, на подвое хурмы кавказской разница больше, чем у подвоя виргинской, где в среднем составила 3.8кг или (48%). Наш опыт показал, что большое преимущество подвоя кавказской необходимо для выращивания изучаемых сортов восточной хурмы.




Диаграмма 2. -Разница урожайность сортов хурмы восточной в подвоях кавказская по сравнение с подвоя виргинская, (кг/дерево)

### Прохождение фенологических фаз в зависимости от регионов

Коллекционный сад хурмы восточной был создан в 2010 году. По данным исследований предыдущих годов [Массовер Б.Л., 1981; Махмадаминов С. 2001] выявили, что в зависимости от повышения температуры набухание почек восточной хурмы в Вахшской долине в 1999 - 2001гг наблюдалось с 15 по 22 марта, в Гисарской долине с 23 марта по 2 апреля (табл. 3).

Нашиими исследованиями эта тенденция подтвердилась, то есть в 2016-2018 годах эта фаза была отмечена на 8 дней раньше. В Вахшской долине набухание почек отмечено (07 по 14 марта), чем в Гисарской долине (15 по 25 марта). Исследованиями установлено, что изменение фенологических фаз, продолжительности роста и развития разных сортов хурмы зависит от почвы и климата региона. Из вышеупомянутых показателей календарных периодов разных сортов восточной хурмы видно, что дата развития фенологических фаз в Вахшской долине начинается на 10-11 дней раньше, чем в Гисарской долине. Вегетационный период от набухания почек до листопада восточной хурмы в Вахшской долине составляет в среднем 265 дней, а в Гисарской долине 245 дней

Таблица 3 - Фенологические наблюдения Вахшской и Гиссарской долин (2016-2018) в среднем, возраст деревьев 6-8 лет

†


Сорт	Регион	Набухание почек	Распускание почек		Цветение начало	Созревание конец	Листопад
			начало	конец			
Хизуме (контроль)	Вахш	<b>15.03.</b>	<b>30.03.</b>	<b>09.04.</b>	<b>04.05.</b>	<b>16.05.</b>	<b>20.10.</b>
	Гиссар	25.03.	11.04.	20.04.	14.05.	26.05.	05.11.
Зенджи-Мару (контроль)	Вахш	<b>06.03.</b>	<b>16.03.</b>	<b>25.03.</b>	<b>23.04.</b>	<b>06.05.</b>	<b>02.10.</b>
	Гиссар	17.03.	26.03.	05.04.	03.05.	26.05.	12.10.
Шарк	Вахш	<b>14.03.</b>	<b>27.03.</b>	<b>6.04.</b>	<b>01.05.</b>	<b>13.05.</b>	<b>15.10.</b>
	Гиссар	25.03.	08.04.	16.04.	11.05.	23.05.	26.10.
Вахдаг	Вахш	<b>08.03.</b>	<b>21.03.</b>	<b>29.03.</b>	<b>27.04.</b>	<b>10.05.</b>	<b>08.10.</b>
	Гиссар	18.03.	01.04.	09.04.	07.05.	20.05.	18.10.
Шохона	Вахш	<b>07.03.</b>	<b>18.03.</b>	<b>24.03.</b>	<b>25.04.</b>	<b>08.05.</b>	<b>30.09.</b>
	Гиссар	18.03.	29.03.	08.04.	05.05.	18.05.	10.10.
Вахш	Вахш	<b>11.03.</b>	<b>24.03.</b>	<b>03.04.</b>	<b>29.04.</b>	<b>11.05.</b>	<b>11.10.</b>
	Гиссар	21.03.	05.04.	14.04.	10.05.	21.05.	22.10.
Точки	Вахш	<b>02.03.</b>	<b>17.04.</b>	<b>26.03.</b>	<b>25.04.</b>	<b>06.05.</b>	<b>16.10.</b>
	Гиссар	12.03.	28.04.	07.04.	05.05.	16.05.	24.10.
Хисори	Вахш	<b>03.03.</b>	<b>16.04.</b>	<b>25.03.</b>	<b>23.04.</b>	<b>05.05.</b>	<b>14.10.</b>
	Гиссар	11.03	26.04.	05.04.	04.05.	14.05.	23.10.

Для успешного возделывания хурмы восточной в условиях орошаемого земледелия, в местах с континентальным климатом и летней засухой для саженцев необходимо проведение поливов. В результате исследований выявили, что морозоустойчивость хурмы восточной, кроме биологических особенностей, зависит и от обеспеченности почвенной влаги 3-5-летние саженцы (табл. 4).

**Таблица 4 - Норма полива и устойчивость саженцев сортов хурмы восточной к кратковременным морозам (2016-2018),**

Сорта	1-вариант норма орошения, 500-600м <sup>3</sup> /га		2- вариант норма орошения, 500-600м <sup>3</sup> /га	
	количество поливов	средний, балл	количество поливов	средний, балл
Хиакуме (кон..)	12	1,7	4	3,3
Зенджи-мару к.	12	1,5	4	3,0
Шарки	12	0,25	4	2,0
Шохона	12	1,25	4	2,5
Вахш	12	0,4	4	2,15
Вахдат	12	0,5	4	2,25
Точки	12	1,7	4	3,6
Хисор	12	0,4	4	3,8
<b>среднее</b>	<b>12</b>	<b>0,9</b>	<b>4</b>	<b>2,8</b>

Из таблицы 4 видно, что устойчивость сортов к морозу в большей степени зависит от режима полива. Так, в 1-ом варианте при 12 - кратном поливе, влажность почвы в период роста была достаточной. Степень поражения деревьев хурмы сортов от 10-11°C морозов в этом варианте составила в среднем 0.9 баллов. При сокращении поливов (2-ой вариант) этот показатель степени поражения морозом составил в общем 2.8 баллов. Среднее оценка баллов (диаграмма 3)



**Диаграмма 3. - Степень устойчивости сортов хурмы восточной к морозам (2016-2018)**

Выявлено, что степень поражения деревьев хурмы восточной морозом находится в зависимости от сорта. Наименее повреждёнными из сортов в обоих вариантах оказались изучаемые сорта Шарки – 1.1 балл, Вахш – 1.2 и Вахдат – 1.3, Хиакуме – 2.5, Зенджи-мару – 2.2 балла соответственно.

Продуктивность восточной хурмы зависит от места произрастания и сортов. Хурма восточная влаголюбивое растение, за годы исследований жаркое лето в условиях Вахшской долины хурма очень нуждается в воде, нехватка влаги приводит к низкой урожайности, плоды оказались мелкими и не качественны (таблица 5).

Из таблицы 5 видно, что продуктивность сортов хурмы восточной находится в прямой зависимости от климата региона (Гиссар, Вахш). В условиях Вахшской долины с одного дерева хурмы восточной урожайность была меньше, чем в Гиссарской долине. Средняя урожайность с одного дерева (диаграмма 5). Так, на сорте Вахш было получено -30.9, Шарки – 27.6, Хиакуме – 26.7кг/дерево. В условиях Гиссарской долины урожайность составила на сортах Шарки -79.0, Вахдат- 64.0, и Вахш 55.0кг/дерево соответственно. Меньшая урожайность

была отмечена на сортах - Хисори -22.3, Точки - 22.8кг/дерево в Вахшской долине. В Гиссарской долине на указанных сортах этот показатель составил – 29.5 и 30.9 кг/дерево соответственно.

**Таблица 5 - Продуктивность сортов хурмы восточной в условиях Гиссарской и Вахшской долинах (2016-2018гг.)**  
**6-8 летние деревья**

Сорта	Регионы	Урожайность, кг/дерева			Урожайность, т/га.		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Хиакуме кон.	Вахш	28,5	19,3	32,3	9,5	6,4	10,7
	Гиссар	48,0	29,0	87,0	15,9	9,6	28,9
Зенджи-мари кон.	Вахш	25,3	10,0	28,5	8,4	3,3	9,4
	Гиссар	35,8	29,4	52,9	11,9	9,7	17,6
Шарки	Вахш	37,1	7,3	38,4	12,3	2,4	12,7
	Гиссар	65,0	38,0	113,0	21,6	12,6	37,3
Шохона	Вахш	27,7	11,3	30,9	9,22	3,7	10,2
	Гиссар	43,0	24,0	75,0	14,3	7,9	24,9
Вахдат	Вахш	24,3	13,6	29,6	8,09	4,5	9,8
	Гиссар	55,0	33,0	85,5	18,3	10,9	28,4
Вахш	Вахш	30,1	24,8	38,0	10,0	8,2	12,6
	Гиссар	32,3	29,4	41,0	10,7	9,7	13,6
Точки	Вахш	27,5	8,0	28,0	9,1	2,6	9,3
	Гиссар	35,0	21,5	34,5	11,6	7,1	11,4
Хисори	Вахш	24,8	11,0	32,2	8,2	3,6	10,
	Гиссар	29,5	22,3	37,0	9,8	7,4	12,3





Диаграмма 4. -Средняя урожайность сортов хурмы восточной (2016-2018), кг/дерево

Так, урожайность на сорте Вахш составила -30.9, Шарки – 27.6, Хиакуме – 26.7кг/дерево. В условиях Гиссарской долины урожайность на сорте Шарки составила -79.0, Вахдат- 64.0, и Вахш 55.0кг/дерево соответственно. Меньшая урожайность была отмечена на сортах - Хисори -22.3, Точки – 22.8кг/дерево в Вахшской долине. В Гиссарской долине на указанных сортах этот показатель составил – 29.5 и 30.9кг/дерево соответственно. Урожайность с одного гектара зависит от продуктивности деревьев (диаграмма 5).

Наивысшая урожайность в Вахшской долине было получена у сорта Вахш-10.2 с одного гектара, Шарк - 9.1, Хиакуме – 8.8, В Гиссарской долине эти показатели составили на сортах Шарки- 20.1, Вахдат- 19.2, и Вахш-18.4т/га соответственно. Низким урожаем в Вахшской долине отличились сорта Точки-7.5 и Хисори -7.4т/га, в Гиссарской долине у этих сортов урожайность составила 9.8 и 10.2т/га соответственно.



**Диаграмма 5. - Средняя урожайность сортов хурмы восточной в годы исследований (2016-2018), т/га**

#### **Дегустационная оценка сортов хурмы восточной**

Качество и вкус плодов восточной хурмы оценивали дегустационным методом (табл. 6).

Как показывают данные таблицы 6 выявлено, что относительно высокой дегустационной оценкой (0-5) обладали сорта Шарки – 4.8, Вахдат – 4.6, Шахона – 4.6, низкая оценка наблюдалась у сортов Точки – 3.7, Хисори – 3.5 баллов.

Также была рассчитана оценка вкусовых качеств по содержанию танина, который вызывает терпкость плодов хурмы. Оценка также проводилась по хозяйственно биологическим показателям сортов, органолептическим, объемным и вкусовым качествам, по внешнему виду, транспортировки и хранения их плодов.

Таблица 6. Дегустационная оценка сортов хурмы восточной (2016-2018)

Сорт	Цветочное строение	Характеристика цветка	Сортовые признаки	Концентрация глюкозы, г/л	Сортовые признаки, г/л	Очень сладкие, для консервации	Сладкие, для варенья, конфитюлы	Крупные, сладкие, для транспорта	Сладкие, для хранения
Хиакуме контролль	4,3	3,5	3,7	3,5	4,0	3,8	4,2	3,8	крупные, варнирующие
Зенджи-мару контролль	4,2	3,5	3,8	3,5	3,7	4,5	4,5	3,9	сладкие, для транспорта
Шарки	4,8	4,5	4,0	3,5	4,6	4,8	4,8	4,4	сладкие, зимние
Шохона	4,6	4,5	4,2	3,5	4,8	4,8	4,8	4,4	ранний сорт
Вахдат	4,5	4,5	4,0	3,5	4,0	4,8	5,0г	4,3	сладкие, для сушки
Вахш	4,5	4,0	4,5	3,5	4,0	4,0	5,0г	4,2	сладкие, для хранения
Точики	3,7	3,7	3,0	3,0	3,8	4,0	3,5	3,5	терпкие (вяжущие)
Хисори	3,8	3,2	3,0	3,0	3,6	3,8	4,0	3,4	ранний сорт

## Производство сухих продуктов из плодов хурмы восточной

Сушка плодов хурмы восточной проводилась в закрытом помещении с естественной вентиляцией в течение 40 дней, при температуре воздуха 15-25°C, изучали два варианта сушки. Плоды изучаемых сортов хурмы были заложены на сушку в третью декаде октября. Подготовленные плоды двух вариантов замачивали на 10-15 секунд, раствором, состоящим из одного литра кипяченой воды с добавлением 50г сахара, затем пронизывали их нитками и подвешивали на специальные стойки (табл. 7).

**Таблица 7 - Сушка плодов различных сортов хурмы восточной, выход сухого вещества (2016-2018гг), %**

Сорт	Вариант 1		Вариант 2	
	Сухое вещество, %	Дегуста-ционная оценка, балл	сухое вещество, %	Дегуста-ционная оценка,
Хиакуме кон.	19,3	2,8	21,3	3,5
Зенджи-мару	21,5	3,0	23,5	3,6
Шарки	22,3	3,8	24,5	4,8
Шохона	21,0	3,5	24,0	4,5
Вахдат	20,4	4,0	23,4	5,0
Вахш	23,0	3,8	26,3	4,6
Точки	19,5	2,8	21,5	3,5
Хисори	18,8	2,8	20,5	3,6

Как показывают данные таблицы 7 в результате анализа выявлено, что количество сухого вещества в процессе сушки в двух вариантах накапливалось в плодах сорта Вахш и составило - 23,0 и 26,3 %, у сорта Шарки 22,3 и 24,5%. Относительно меньше этот показатель был у сортов - Хисори 18,8 и 20,6 и у сорта Точки - 19,5 - 21,5%. Установили дегустационную оценку сухофруктов плодов хурмы восточной, у сорта Вахдат она составила 4,0-5,0 балла, Шарки 3,8-4,8 балла. Относительно низкая оценка оказалась у сортов Точки 2,8-3,5 балла и у сорта Хисори 2,8-3,6 балла. Для сушки отбирали спелые и твёрдые плоды: в 1-ом варианте плоды нарезали кружочками, во 2-ом были целые плоды, которые прокалывали специальной деревянной иглой (зубочисткой).


## Биохимический состав плодов хурмы восточной

Исследованиями С.М. Гулов, [29, с 13] отмечено, что свежие плоды хурмы содержат 77,6-85,9% воды, 14,1-22,4% сухих веществ, 0,54-1,22% железа, 13,1-20,5% сахара, 0,02-2,35% полифенолов, 6,4-43,5мг% витамина С, 0,104-0,386мг%, каротина. Также плоды хурмы содержат витамины А, Р, макро-и микроэлементы (таб. 8).

Таблица 8. - Биохимический состав плодов сортов хурмы восточной (2016-2018 гг)

Сорта	Сухое вещество, г/%	Сахар, г/%	Дубильные вещества, г/%	Кислотность, г/%	Витамины С, мг/%
Хиакуме	18,5	14,3	0,48	0,14	42,2
Зенджи- мару	23,5	18,5	0,45	0,13	25,3
Шарқӣ	25,0	20,0	0,39	0,12	23,0
Шоҳона	26,3	21,6	0,33	0,14	22,2
Ваҳдат	27,5	22,0	0,25	0,13	19,8
Вахш	25,3	21,5	0,31	0,14	20,3
Точикиӣ	18,4	13,4	0,60	0,14	41,6
Хисорӣ	21,0	16,0	0,58	0,13	24,4

Как показывают данные таблицы 8, в результате исследований выявлено, что биохимические показатели свежих плодов хурмы изменяются. Так, сухое вещество в свежих плодах хурмы восточной в зависимости от сортов увеличивается от 18,5 - 23,5% (контроль) до 27,5% (Ваҳдат). Уровень сахара в плодах, также увеличивается от 14,3 - 18,5% (контроль) до 22,0% (Ваҳдат). Наилучшим сортом по уровням накопления сухого вещества и сахара выделился сорт Ваҳдат. Сравнительно меньшее накопление сухого вещества 18,4%, и сахара (13,4) наблюдалось в плодах сорта Точики. Биохимический состав плодов зависит от сорта и места вращивания, биохимический анализ плодов хурмы восточной был проведен после сбора урожая. Экономическая и производственная эффективность перспективных сортов хурмы восточной в условиях Гиссарской и Вахшской долин (диаграмма 6).



**Диаграмма 6. -Уровень рентабельности сортов хурмы восточной в зависимости от регионов, % (2016-2018)**

Из диаграммы 7 видно, что рентабельность изучаемых сортов в регионе Гиссарской долины составляет от 169,7% (сорт Шохона) до 222,6% (сорт Шарки) по сравнению с контрольными сортами Зенджи-Мару и от 65,3 до 134,3%, у сорта Хиакуме в регионе Вахшской долины. У названных сортов она соответственно составила от 43 до 90,7%, что выше контрольных сортов, от 7,5 до 28,3%. Это свидетельствует об эффективности изучаемых сортов Шарки, Шохона, Вахш, и Вахдат, как перспективных в обоих регионах и превосходит контрольные сорта.

Денежные затраты на производство плодов хурмы восточной в двух регионах с разными почвенно-климатическими условиями составила от 16 тыс. до 22,5 тыс. сомони. Себестоимость плодов за один центнер в Вахшской долине составило от 168 сомон (сорт Вахш) до 208 сомон (сорт Вахдат), в Гиссарской долине 105,5 сомон (сорт Вахш) до 171,4 сомон (Зенджи-мару). Доход увеличился в Вахшской долине от 16,2 тыс. (сорт Вахдат) до 28,9 тыс. сомони (сорт Вахш), в Гиссарской долине увеличился 22,7 сорт (Зенджи-мару) до 78,4 тыс. сомони (сорт Шарки) соответственно, (табл.9).

В результате исследований продуктивности сортов была доказана высокая экономическая и производственная эффективность хурмы восточной в регионах с разными почвенно-климатическими условиями Гиссарской и Вахшской долин республики Таджикистан.

Таблица 9. - Экономическая и производственная эффективность возделывания сортов хурмы восточн.  
в условиях Вахшской и Гиссарской долин (возраст сада - 10 лет)

Сортов	Регион	Урожайн ость, ш/га	Средняя цена реализации 1ц плодов, сомони	Себестоимость и плодов, сомони	Стоимость продукции с 1 га. тыс. сомони	Затраты на производство с 1 га. тыс. сомони	Прибыль с 1/га. тыс. сомони
Хиакуме (контроль)	Вахш	88,8	250	194,8	22,2	17,3	5,0
Гиссар	183,1	250	106,4	45,7	19,5	26,2	
Зенджи- мару (контроль)	Вахш	78,3	220	204,3	17,2	16,0	1,2
Гиссар	130	220	133	133	17,3	11,3	
Шарки	Вахш	91,9	360	188,2	33,0	17,3	15,7
Гиссар	201,9	360	111,4	72,6	22,5	50,1	
Шохона	Вахш	77,5	320	223	24,8	17,3	7,5
Гиссар	156,0	320	118,5	49,9	18,5	31,4	
Вахдат	Вахш	76,9	300	208,0	23,0	16,0	7,0
Гиссар	192,5	300	109,0	57,7	21,0	36,7	
Вахш	102,8	320	168,2	32,8	17,3	15,5	
Гиссар	184,8	320	105,5	59,1	19,5	39,6	
Точики	Вахш	75,3	250	225,7	18,8	17,0	1,8
Гиссар	98,5	250	175,6	24,6	17,3	7,3	
Хисори	Вахш	74,5	220	218,7	16,3	15,5	0,8
Гиссар	102,8	220	168,2	22,6	17,3	5,3	

## Выводы

1. Установлено, что для выделенных перспективных сортов хурмы восточной, отбор подвоя хурмы кавказской по сравнению с подвоям хурмы виргинской имеет свои преимущества: по всхожести сеянцев, по пересадке саженцев на постоянное место, при которой приживаемость составляет до 90-95%, по приживаемости прививок до 80-85%, быстрого вступления в плодоношение в 3-4 года, по урожайности на - 48% выше, чем у подвоя хурмы виргинской [1-А, 12-А,].

2. В результате фенологических и биологический наблюдений было определено, что период выхода из покоя деревьев хурмы восточной между ранними и поздними сортами составляет 8 дней, а разница между долинами - 11 дней, то есть в Вахшской долине деревья выходят из покоя раньше. Разница в созревании плодов между ранними и поздними сортами составляет 16-17 дней, а разница между долинами в Вахшской долине на 11-12 дней раньше, чем в Гиссарской долине. Средний период роста хурмы восточной в Вахшской долине составляет 265 дней, а в Гиссарской долине - 245-250 дней. Фенологические наблюдения, особенно срок цветения, его продолжительность и различие мужских и женских цветков, которые необходимы и нужны в селекционной работе [7-А, 10-А, 13-А,].

3. Установлено, что обеспечение постоянной влажности почвы в период роста повышает морозостойкость деревьев. В проведенных исследованиях оценена высокой морозостойкости изучаемых сортов, у сорта Шарки она составила - 1,1 баллов, Вахш - 1,2 и Вахдат - 1,3, а в контрольных сортах Хиакуме - 2,5, Зенджи-мару - 2,2 балла, [2-А, 10-А,].

4. Было установлено, что в районах исследований, в Гиссарской долине, урожайность выше, чем в сухих субтропических регионах Вахшской долины. Средняя урожайность с гектара в Вахшской долине была высокой у сортов Вахш - 10,28т/га, Шарки - 9,19, у контрольного сорта Хиакуме - 8,8 т/га. В Гиссарской долине у сортов Шарки - 20,1, Вахдат - 19,2 и Вахш - 18,4 т/га. Относительно низкой урожайностью в Вахшской долине выделились сорта Точки -

7,5 и Хисори - 7,4 т/га, а в Гиссарской долине вышеупомянутые сорта дали урожайность 9,8 и 10,2 тонн с гектара, [5-А, 8-А,].

5. В результате дегустации относительно высокие баллы (0-5) получили сорта Шарки 4,8, Вахдат 4,6, Шохана 4,6, а низкие баллы получили сорта Точки-3,7, Хисори-3,5, [10-й, 12-й].

6. По результатам сушки плодов хурмы восточной установлено, что относительно высокие баллы по вкусовым качествам и качеству сухофруктов получили сорта Вахдат 4,0-5,0 балла, Шарки 3,8-4,8 балла. Относительно низкие баллы получили сорта Точки - 2,8-3,5 и Хисори - 2,8-3,6, что на 1,0-1,5 балла выше, чем у контрольных сортов Хиакуме и Зенджимару, [6-А].

7. Выявили, что при производстве плодов хурмы восточной в двух регионах с различными почвенно-климатическими условиями, затраты на производство плодов на гектар составляют от 16 до 22,5 тыс. сомони. Уровень экономической рентабельности изученных сортов в условиях Гиссарской долины составил от 169,7 (сорт Шохона) до 222,6% (сорт Шарки), что по сравнению с контрольным сортом (Зенджи-Мару) ниже и составляет 65,3 до 134,3%, сорта (Хиакуме). В Вахшской долине в указанных сортах этот показатель составил от 43 до 90,7%, в контрольных сортах от 7,5 до 28,3%. Это свидетельствует о эффективности изучаемых сортов Шарки, Шохана, Вахш и Вахдат, как перспективных в обоих регионах и превосходит контрольные сорта [5-А, 8-А,].

8. Высокая экономическая эффективность выращивания различных сортов хурмы восточной обусловлена не только их реализационной ценой, но и быстрым наступлением плодоношения, высокой урожайностью и, что самое главное, низкой себестоимостью плодов, учитывая, в свою очередь, низкие затраты на обрезку, борьбу с вредителями и болезнями. С одной стороны, это относительно не высокие затраты по сравнению с другими плодовыми деревьями, а с другой – экологически чистые плоды, что значительно повышает их ценность [5-А, 8-А,].

## **Рекомендации по практическому применению результатов исследования**

1. Для условий Гиссарской и Вахшской долин Республики Таджикистан рекомендуются перспективные среднеспелые и позднеспелые сорта хурмы восточной: Шарки, Шохона, Вахдат и Вахш, обладающие высокой устойчивостью к морозам, болезням, хорошим товарным качеством плодов, пригодных для сушки.

2. Использование сортов Вахдат и Шохона, рекомендуются в качестве опылителей в садах, а сорт Вахдат, также можно использовать для сушки.

### **Публикации по теме диссертации**

#### **Статьи в рецензируемых журналах:**

**[1-А]. Раҳматов С.Х.** Сабзиш ва қадкашии ниҳоли навъу намунаҳои хурмои шарқӣ вобаста аз тагпайванд / С.Х. Раҳматов// Гузоришҳои АИКТ – 2017-№1 (51), - С. 28-31.

**[2-А]. Раҳматов С.Х.** Степень морозоустойчивости саженцев хурмы восточной в зависимости от водного режима почвы / С.Х. Раҳматов// Доклады ТАСХН-2019-№ 1(59), - С.32-34.

**[3-А]. Раҳматов С.Х.** Рушду нумуъи ниҳоли хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисор /С.Х. Раҳматов, Н. Камолов // Гузоришҳои АИКТ - 2021-№1 (67),-С. 39-42.

**[4-А]. Раҳматов С.Х.** Причины осыпания плодов хурмы восточной и меры его предотвращения в условиях Гиссарской долины / С.Х. Раҳматов// Ахбори АМИТ- 2021-№4, -С.54-59.

**[5-А]. Раҳматов С. Х.** Маҳсулнокии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Вахш ва Ҳисор / С.Х. Раҳматов// Кишоварз ДАТ- 2023 -№1(98), - С. 78-80.

**[6-А]. Раҳматов С. Х.** Пример применения водного раствора серебра при хранении овощей и фруктов / С.Х. Раҳматов, Г.М. Бобизода, Р.У. Эшанкулова //Наука и инновация ТНУ- 2023-№1, - С. 91-100.

**[7-А]. Раҳматов С.Х.** Сравнительное изучение роста и развития хурмы восточной в регионах с различными климатическими условиями /С.Х. Раҳматов // Гузоришҳои АИКТ- 2024-№ 4, - С. 71-75.

**[8-А]. Раҳматов С.Х.** Касалӣ ва ҳашаротҳои зааррасони хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисору Вахш ва чораҳои

пешгирии онҳо /С. Х. Раҳматов // Гузоришҳои АИКТ-2024 - № 4, - С. 85-89.

### **Статьи и тезисы в трудах конференций**

**[9-А]. Раҳматов С.Х.** Ҳусусиятҳои биологӣ ва нашъу намои навъу хурмои шарқӣ. / С.Х. Раҳматов, М.Табарова // Маводи конф. илмию амалии ҷумҳурӣ “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи қишоварзӣ”, Бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” -2021. С. 50-53.

**[10-А]. Раҳматов С.Х.** Таъсири зичи тагпайвандҳои хурмои шарқӣ ба ҷаҳони муғчроҳо ва истеҳсоли ниҳоли пайванди / С.Х. Раҳматов, С. Абдулоев// Маводи конференсияи илмии ҷумҳурӣ «Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи қишоварзӣ» Бахшида ба даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор 20818-2028» - 2022. С.41-42.

**[11-А]. Раҳматов С.Х.** Нашъу нуму ва маҳсулнокии хурмои шарқӣ вобаста аз тагпайванд дар шароити водии Ҳисор /С.Х. Раҳматов //Маводҳои конференсияи илмии назарияи байналмиллалии дар мавзуути «Истифодабарии усулҳои инноватсионӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии дараҳтони мевадиҳанда, ангур ва зироатҳои сабзавотию картошқа» - 2022. С.21-25.

**[12-А]. Раҳматов С.Х.** Фенологияи навъҳои хурмои шарқӣ вобаста ба миндақаҳо /С.Х. Раҳматов, З. Сафарова, Б.С. Холова //Маводи конференсия илмии ҷумҳурӣ ”Нақши олимони ҷавон дар рушди илм инноватсия ва технологияи қишоварзӣ” Бахшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзи дар соҳаи илму маориф” ва даҳсолаи байналмиллалии амал “об барои рушди устувор 2018-2028” -2023. С. 101-109.

**[13-А]. Раҳматов С.Х.** Производственно - хозяйственная эффективность плодов восточной хурмы в зависимости от различных почвенно-климатических регионов республики Таджикистан /С.Х. Раҳматов //Международный научный журнал «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION»

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science” 15 июля Almaty, Kazakhstan -2025, - С.12-18.

### **Список сокращений и символов**

**ВАК** – Высшая аттестайонная комиссия

**га-гектар**

**г-грамм**

**ГРН** - государственный регистрационный номер

**ИСВИО**- Институт садоводства, виноградарства и овощеводства

**кг/д-киллограмм дарахт**

**кг-киллограмм**

**мг/г- миллиграмм грамм**

**мм-миллиметр**

**НАНТ** - Национальная академия наук Таджикистана

**с/га-сентинер гектар**

**см- сантиметр**

**сом-сомони**

**т/га-тонна гектар**

**ТАСХН** – Таджикская академия сельскохозяйственных наук

**тыс- тысяча**

### **Литература**

1. Гулов С.М. Богдории субтропикӣ. Душанбе- 1998 с. 13.
2. Животинская С.М., Кульков О.П. «Субтропические культуры» №5 Грузинская ССР. «О морозоустойчивости восточной хурмы в Узбекистане» - 1968. с. 88.
3. Загребельный И.А. Эффективное использование агроклиматических ресурсов субтропиков Таджикистана. Душанбе - 1985. с. 18-21.
4. Запрягаева В.И Ленинград Лесные ресурсы Памиро- алая.1976, 31с.
5. Кулиев Ф. А., Гасанов З.М., Рамазанов С.М. и другие Субтропические культуры, №5 Сухуми. -1973. с. 45-47.
6. Кульков О.П., Животинская С.М. Температурные условия прохождения фенофаз восточной хурмы на юге Узбекистана, Труды НИИСВ и В им. Р.Р. Шредера, вып. 32, Ташкент, Изд-во «Фан» АН УзССР, 1970.с. 26.

7. Кулян Р.В. Цитрусовые культуры как объект для селекции / Субтропические и декоративные садоводство. 2012.-Вып. 46. - №1. - с.71-74.
- 8.Кутеминский В.Я., Леонтьева Р.С. //Почвы Таджикистана. Условия почвообразования и география почв. // В.Я. Кутеминский, Р.С. Леонтьева //Вып.1. –Душанбе: Ирфон,1966. –С.60-65.
9. Массовер Б.Л., Бурякова В.П. Селекция и агротехника субтропических культур Душанбе -1980,- с 21-22.
10. Мурри Н. М. Хурма. — Сухуми: АБГИЗ, 1941. 63 с.
11. Мухамедов А. Х., Дадожанов Г. Пути повышения урожайности садов, виноградников и овощных культур. Материалы научно-практической конференции- г. Душанбе 21.12.2012. «Перспективы возделывания культуры хурмы восточной в предгорных зонах северного Таджикистана». Институт садоводство и овощеводство. Стр 276.абз1
12. Назиров Х.Н., Камолов Н., Мамадалиева М. Аюрпарварӣ Душанбе -2017 с.14.
13. Омаров М.Д. Перспективные гибриды хурмы восточной // Садоводство и виноградарство. – 2014. – № 4. – с.26–27.
14. Розанов, Б.С. Ширяева Н.Г. Восточная хурма и перспективы её культуры в Таджикской ССР Сельское хозяйство Таджикистана. – 1949. - №4. –с. 26
15. Рындин А.В., Кулян Р.В. Коллекция цитрусовых культур во влажных субтропических России. / Садоводство и виноградарство, 2016. -№5. – с. 24-30.
16. Сафаралиев Х.Ф. Даромаднонокии иқтисодии дараҳтони себ вобаста аз намудҳои тагпайванд. Автореферат диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои биологӣ Душанбе – 2009. - 27 с.
17. Ширяева Н.Г., Розанов Б.С. Возделывание хурмы восточной в Таджикистан. Сталинабад -1961 с .12-13. абз.3.
18. Эшанкулов У.Э, Цулая В.И. Субтропические культуры, Грузинская ССР. «Субтропические Таджикистана» 1982 -№ 6 с 106.
19. Klepper B., Browning V.D., Tauior H.M. Stem diameter in relation to plant water stress // Plant. Physiol. – 1971. – V. 48. – №6. – P. 683–685

## ШАРҲИ МУХТАСАР

ба диссертатсияи Раҳматов Сулаймон Ҳасанович дар мавзуи «Хусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисору Ваҳш» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ, аз рӯи иҳтиносӣ 06.01.05 - Селексия ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ.

**Калимаҳои қалидӣ:** хурмои шарқӣ, навъ, тагпайванд, хурмои кавказӣ, хурмои виргинӣ, ояндадор, назоратӣ, фенология, давраҳои қадкашии навдаҳо, ба сармотобоварӣ, ҷошнгирӣ (дегустация), хушкмева, таркиби кимёвӣ, ҳосилнокӣ, самаранокии иқтисодӣ.

**Усулҳои таҳқиқот ва таҷхизоти истифодашуда:** Ба сифати тагпайванд хурмои кавказӣ ва виргинӣ истифода шуданд: Ба сифати объекти тадқиқот навъу намунаҳои хурмои шарқӣ, аз қабили навъҳои Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат, Ваҳш, Тоҷикӣ ва Ҳисорӣ ки маҳсулни селексияи Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткорӣ мебошанд, истифода шудаанд. Ба сифати навъи назоратӣ навъҳои Ҳиакуме ва Zendжи-мару интиҳоб гардидаанд. Дар омӯзиш усулҳои таҳқиқоти саҳрои ва лабораторӣ истифода бурда шуданд. Баҳодиҳӣ ва аломатҳои маҳсулнокии хурмои шарқӣ дар давраи нашъу намо вобаста ба варианҷҳои таҷриба давра ба давра гузаронида шудааст.

**Натиҷаҳои ба дастоварда ва навғонии онҳо.** Бо мақсади гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ ва ҷудо намудани навъҳои ояндадор барои дар истеҳсолот ҷорӣ намудан коллексияҳои навъҳои хурмои шарқӣ аз нав барқарор карда шуд. Дар натиҷаи омӯзиши маҷмӯи хусусиятҳои агробиологиу ҳоҷагӣ, ба сармо тобоварӣ, сифати мева, нигоҳдорӣ, интиқол додан ва хушконидан дар минтақаҳои водигии Ҷумхурӣ, алалхусус водиҳои Ҳисору Ваҳш дар баландиҳои аз сатҳи баҳр аз 350 то 1300 м, бори нахуст омӯзиши 15 навъу намунаҳо гузаронида шуда, дар натиҷа аз байни онҳо 3- навъи дорои хусусиятҳои хоси ҳоҷагиу- биологӣ дошта, аз он ҷумла 1 навъ барои истеҳсоли хушкмева интиҳоб карда, ба Комиссияи давлатии озмоишии навъҳои зироатҳои кишоварзӣ ва муҳофизати навъи Вазорати Кишоварзӣ супорида шуд.

### Тавсияҳо оид ба истифодай амалии натиҷаҳои тадқиқот

1. Навъҳои интиҳобгардидаи Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат ва Ваҳш аз ҷиҳати устуворияти баланд доштан ба сармо, касалиҳо, бартарии сифати мева, мувоғиқ барои хушккунӣ ҳамчун навъҳои ояндадор ба водиҳои Ҳисор ва Ваҳш тавсия дода мешавад.

2. Навъҳои интиҳобшуда навъҳои миёнапазу дерпаз ва якхонагиу духонагӣ буда, дар истеҳсолот навъҳои Ваҳдат ва Шоҳона ҳамчун гардолудкунанда дар боғҳо ва навъи Ваҳдат барои хушконидан низ тавсия дода мешавад.

**Соҳаи истифода.** Навъҳои интиҳобшуда дар корҳои селексионӣ истифода бурда мешавад.

## АННОТАЦИЯ

к диссертации Рахматова Сулаймона Хасановича на тему «Агробиологические и селекционные характеристики сортов хурмы восточной в условиях Гиссарской и Вахшской долинах» для получения степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур.

**Ключевые слова:** хурма восточная, сорт, подвой, хурма кавказская, хурма виргинская, фенология, циклы роста, развитие, морозостойкость, дегустация, сухофрукты, химический состав, урожайность, экономическая эффективность.

**Цель работы:** Основной целью исследования является изучение агробиологических и селекционных особенностей сортов хурмы восточной в условиях Вахшской и Гиссарской долин, отбор их перспективных сортов для представления в Государственную комиссию по изучению и защите сельскохозяйственных культур и выделение сортов для селекционных работ по положительным признакам.

**Предметом исследования:** в качестве посадочного материала использовали сорта хурмы восточной, Шарки, Шохона, Вахдат, Вахш, Точки и Хисори, являющиеся продуктами селекции Института садоводства, виноградарства и овощеводства. В качестве контрольного сорта были выбраны сорта Хиакуме и Зенджи-мару. В качестве подвоев хурмы восточной использовали сеянцы хурмы кавказской - *Diospyros Iotus I*, и виргинской *Diospyros Virginiana I*.

**Полученные результаты и их новизна:** На основании проведенных полевых экспериментов выделены перспективные сорта для внедрения в производственные условия, восстановлена коллекция сортов хурмы восточной и достигнут желаемый результат. Были изучены комплекс биологических и сельскохозяйственных характеристик: морозоустойчивость, качество плодов, сушка, хранение их, транспортировка в долинных регионах республики на высотах от 350 до 1300м над уровнем моря, в том числе в Гиссарской и Вахшской долинах, 3 сорта были переданы Государственную комиссию по изучению и защите сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства Таджикистана, которые находятся на испытательном изучении. Впервые в республике было проведено исследование сортов для сушки, в результате чего из 15 сортов и образцов был отобран 1 сорт (Вахдат) для производства сухофруктов.

### Рекомендации для производства.

1. Для условий Гиссарской и Вахшской долин Республики Таджикистан рекомендуется перспективные среднеспелые и позднеспелые сорта хурмы восточной Шарки, Шохона, Вахдат и Вахш, обладающие высокой устойчивостью к морозам, болезням, хорошим товарным качеством плодов, пригодных для сушки.

2. Использование сортов Вахдат и Шохона, рекомендуются в качестве опылителей в садах, а сорт Вахдат, можно, также использовать для сушки.

**Область применения:** селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур.

## ANNOTATION

for the abstract of the dissertation of Rakhmatov Sulaimon Khasanovich, on the topic "Agrobiological and breeding characteristics of oriental persimmon varieties in the Gissar and Vakhsh valleys" for the degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.01.05 - breeding and seed production of agricultural crops. **Key words:** oriental persimmon, variety, rootstock, phenology, cycles of growth, development, frost resistance, tasting, dried fruits, chemical composition, yield, economic efficiency.

**Objective:** The main purpose of the study is to study the agrobiological, economic and breeding features of varieties and hybrids of oriental persimmons in the conditions of the Vakhsh and Hissar valleys, to select their promising varieties for submission to the State Commission for the Study and Protection of Agricultural Crops and to identify varieties for breeding work on positive traits.

Subject of research: Oriental persimmon, Sharki, Shokhona, Vahdat, Vakhsh, Tochiki and Hisori, which are the products of selection of the Institute of Horticulture, Viticulture and Vegetable Growing, were used as planting material. The Hiakume and Zenji-mari varieties were chosen as the control varieties. Caucasian seedlings - *Diospyros lotus* I, and Virginia seedlings *Diospyros virginiana* I were used as rootstocks of eastern persimmons.

**Results obtained and their novelty:** On the basis of field experiments, promising varieties have been identified for introduction into production conditions, the collection of oriental persimmon varieties has been restored and the desired result has been achieved. A set of biological and agricultural characteristics was studied: frost resistance, fruit quality, drying, storage, transportation in the valleys of the regions of the republic at altitudes from 350 to 1300 m above sea level, including in the Vakhsh and Hissar valleys, 3 varieties were transferred to the State Commission for the Study and Protection of Agricultural Crops under the Ministry of Agriculture of Tajikistan, which are under test study. For the first time in the republic, a study of varieties for drying was carried out, as a result of which 1 variety (Vahdat) was selected from 15 varieties and samples for the production of dried fruits.

**Recommendations for production.** For the conditions of the Hissar and Vakhsh valleys of the Republic of Tajikistan, promising mid-season and late-ripening varieties of persimmons of the east Sharki, Shokhona, Vahdat and Vakhsh, which have high resistance to frost, diseases, good commercial quality of fruits suitable for drying, are recommended.

The use of the Vahdat and Shohona varieties is recommended as pollinators in orchards, and the Vahdat variety can also be used for drying.

**Field of application:** selection and seed production of agricultural crops.