

АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ БОҶУ ТОКПАРВАРӢ ВА САБЗАВОТКОРӢ

Ба ҳуқуқи дастнавис

ВБД 631.52: 634.451./453

РАҲМАТОВ СУЛАЙМОН ҲАСАНОВИЧ

ХУСУСИЯТҲОИ АГРОБИОЛОГӢ ВА СЕЛЕКСИОНИИ НАВӢҲОИ  
ХУРМОИ ШАРҚӢ ДАР ШАРОИТИ ВОДИҲОИ ҲИСОРУ ВАҲШ

Диссертатсия

барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои кишоварзӣ  
аз рӯи ихтисоси 06.01.05 селекция ва тухмипарварии  
растаниҳои кишоварзӣ

Роҳбари илмӣ: номзади илмҳои  
кишоварзӣ Камолов Н.

Душанбе-2025

## Мундариҷа

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Сарсаҳифа.....                                                                                       | 1         |
| Номгӯи ихтисораҳо ва аломатҳои шартӣ.....                                                            | 4         |
| Муқаддима.....                                                                                       | 5         |
| Тавсифи умумии тадқиқот.....                                                                         | 10        |
| <b>БОБИ 1. Шарҳи адабиёт.....</b>                                                                    | <b>17</b> |
| 1.1. Пайдоиш ва минтақаҳои парвариши хурмои шарқӣ.....                                               | 17        |
| 1.2. Таъсири тағпайвандҳо ба рушду нумӯ ва ҳосилнокии<br>хурмои шарқӣ.....                           | 22        |
| 1.3. Хусусиятҳои биологии хурмои шарқӣ.....                                                          | 25        |
| 1.4. Аҳамияти хоҷагии хурмои шарқӣ ва минтақаи парвариши он<br>дар Тоҷикистон.....                   | 40        |
| 1.5. Селексияи хурмои шарқӣ.....                                                                     | 42        |
| 1.6. Ба сармо тобоварии хурмои шарқӣ.....                                                            | 47        |
| 1.7. Таркиби биокимиёвии навъҳои хурмои шарқӣ.....                                                   | 50        |
| <b>БОБИ 2. Мавод ва методҳои тадқиқот.....</b>                                                       | <b>51</b> |
| 2.1. Хусусиятҳои ҳоку иқлими водихои Ҳисор ва Вахш.....                                              | 51        |
| 2.2. Минтақа, методика ва маводҳои корҳои илмӣ тадқиқот.....                                         | 60        |
| 2.3. Гузаронидани тадқиқотҳо дар қитъаи таҷрибавӣ.....                                               | 68        |
| <b>БОБИ 3. Натиҷаҳои аз тадқиқот бадастомада.....</b>                                                | <b>70</b> |
| 3.1. Интиҳоби тағпайванд ба рушд ва афзоиши навъҳои хурмои<br>шарқӣ.....                             | 70        |
| 3.2. Сабзиш ва қадкашии ниҳоли навъҳои хурмои шарқӣ, вобаста аз<br>тағпайванд.....                   | 74        |
| 3.3. Муқоисаи ҳосили дарахтон хурмои шарқӣ вобаста аз<br>тағпайванд.....                             | 79        |
| 3.4. Давраҳои гузариши фазаҳои фенологӣ.....                                                         | 81        |
| 3.5. Омӯзиши муқоисавии фенологияи хурмои шарқӣ дар шароити<br>минтақаҳои водихои Ҳисор ва Вахш..... | 84        |

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.6. Афзоиш ва рушди дарахтони навъҳои хурмои шарқӣ, вобаста ба минтақа дар водиҳои Ҳисор ва Вахш..... | 89         |
| 3.7. Устуворияти навъҳо ба ҳарорати пасти ҳаво.....                                                    | 94         |
| <b>БОБИ 4. Таъсири омилҳои шароити иқлим ба сифат, ҳосилнокӣ ва таркиби мева.....</b>                  | <b>100</b> |
| 4.1. Таъсири ҳарорати баланд ба сифати мева.....                                                       | 100        |
| 4.2. Сабабҳои рехтани меваҳои хурмои шарқӣ ва чораҳои пешгирии он.....                                 | 102        |
| 4.3. Ҳосилнокӣ ва сифати меваи навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисор ва Вахш.....             | 107        |
| 4.4. Сифати меваи хушки хурмои шарқӣ.....                                                              | 115        |
| 4.5. Таркиби кимиёвии меваи навъҳои хурмои шарқӣ.....                                                  | 118        |
| 4.6. Устуворияти навъҳо ба касалиҳо ва зараррасонҳо.....                                               | 120        |
| 4.7. Самаранокии иқтисодии навъҳои дурнамои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Вахш ва Ҳисор.....        | 122        |
| <b>БОБИ 5. Баррасии натиҷаҳои тадқиқот.....</b>                                                        | <b>129</b> |
| Хулоса.....                                                                                            | 137        |
| Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тадқиқот.....                                               | 140        |
| Рӯйхати адабиёти истифодашуда.....                                                                     | 141        |
| Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.....                                                             | 150        |
| Замимаҳо.....                                                                                          | 162        |

## **Номгӯи ихтисораҳо ва аломатҳои шартӣ**

**АИКТ-** Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

**АМИТ-** Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

**ВБД-** варақаи бақайдгирии диссертатсия

**га-**гектар

**г-**грамм

**ИБТС-** Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ

**кг/д-**киллограмм дар 1 дарахт

**кг-**киллограмм

**КОА-**Комиссияи олии аттестатсионӣ

**мг-** миллиграмм,

**мм-**миллиметр

**ҳаз-** ҳазор

**РҚД-** Рақами қайди давлатӣ

**с/га-**сентинер дар 1 гектар

**см-** сантиметр

**сом-**сомонӣ

**т/га-**тонна дар 1 гектар

## Муқаддима

**Мубрамии мавзуи тадқиқот.** Дар амал татбиқ намудани ду ҳадафи стратегии мамлакат; таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноаткунони босуръати кишвар, (таъмини саноати хӯроқворӣ бо ашёи хом) бе рушди соҳаи кишоварзӣ аз он ҷумла бахши боғу тоқпарварӣ масъалаи мубрами рӯз аст. Солҳои охир талабот ба меваю ангур, ки дорои хусусияти шифои ва ғизои бой мебошанд зиёд гардида аст. Мувофиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 –феврали соли 2022 № 76 меъёри ҳади ақали истеъмолии меваю ангур дар як сол 122 кг. дар як шабонарӯз бошад 340 г.- муқарар шудааст. Мувофиқи маълумотҳои Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 1,01,2024 дар Ҷумҳурӣ дар ҳамаи сохторҳои хоҷагидорӣ 208 396 гектар боғу тоқзор мавҷуд буда, 1 112 981,5т меваю ангур аз он ҷумла 823 050,2т . мева ва 289 936,3 тонна ангур истеҳсол шудааст, ки ба сари аҳоли 106 кг рост меояд, ки ҳамагӣ 87% - и меъёри муқараршударо таъмин мекунад.

Яке аз роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, ин ба вучуд овардани навҳои нави серҳосилу ба талаботи бозор ҷавобгӯ ва муқамалгардони технологияи бунёди боғҳо бо тарзи замонавӣ мебошад. Парвариши хурмои шарқӣ дар Тоҷикистон таърихи 65-70 сола дошта ба яке аз меваҳои маъмулу дӯстдошта мубадал гаштааст. Аҳамияти ғизоию шифои ва иқтисодии хурмои шарқиро, ки як қисмати минтақаҳои боғдории Ҷумҳурӣ барои парвариши ин мева мувофиқ аст, ба назар гирифта мавзӯи тадқиқот таҳрезӣ шудааст.

Чунки маҳсулотҳои ин бахш дар шакли тару тоза, қоқ ва коркарди саноати на танҳо дар бозори дохили, балки имрӯзҳо дар бозори беруна мавқеи худро васеъ карда истодааст. Масъалаи рушди ин бахш дар қатори дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ дар зери назорати Ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад. Бо назардошти боз ҳам баланд бардоштани рушди соҳаи боғпарварӣ дар кишвар Барномаи рушди соҳаи боғу тоқпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020, №424 аз 3 июли соли

2014, ки мувофиқи он зиёда аз 20000 га бунёди боғи дарахтони мевадиханда бунёд шудаанд ва Барномаи давлатии рушди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, № 483 аз 20.10.2016, тасдиқ гардидааст гувоҳи ин мебошад.

Иқлими мусоид на танҳо ягона сабаби дар Тоҷикистон паҳн шудани хурмо мебошад, инчунин он дорои микро, макро элементҳо ва витаминҳои зиёди фойданок мебошанд, ки онро духтури воқеии табиат меноманд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон хурмои шарқӣ, амалан аз сабаби дер гул карданаш дар муқоиса бо дарахтони зардолу ва шафтолу аз сардихоии баҳорӣ, ё ин ки баргарданда осеб намебинад. ва даромаднокиаш муқоиса бо меваҳои себ ва нок дар як зина меистад. Дертар пухта расидани мева ва навъҳои, ки муҳлати нигоҳдориашон нисбатан дароз аст ҳамчун манбаи арзишманди ашёи хом барои саноати консервакунонӣ мебошад. Солҳои охир дар натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ тарзҳои гуногуни хушконидавро, аз навъҳои мувофиқ ба хушкунонӣ ба роҳ монда шуд, ки ин ҳам як даромади аз ҷиҳати иқтисодӣ арзишманд мебошад.

Муддати зиёда аз ним аср олимони Тоҷикистон ва Осиёи Маркази омӯхтани хурмои шарқиро дар шароити нави иқлим ва хоки инчо барои ин растанӣ мавриди корҳои тадқиқотии худ қарор доданд. Натиҷаи маҳсули ин корҳои илмӣ -тадқиқоти буд, ки ҳоло хурмои шарқӣ дар минтақаҳои субтропикии Тоҷикистон ва мавзеҳои иқлимашон мусоид ба таври васеъ парвариш карда мешаванд. Даҳсолаҳои охир бо сабаби муноқишаҳои дохилӣ ва нарасидани мутахассисон корҳои илмӣ-тадқиқоти оид ба хурмои шарқӣ қариб, ки гузаронида нашуда буд. Вобаста бар ин солҳои охир дар парвариши ин растании субтропикӣ чанд масъалаҳои ҷалталаб пайдо шудаанд, ки ҳалли онҳо заруранд. Аз он ҷумла роҳҳои нисбатан самараноки истеҳсоли тағпайвандҳо ва ниҳолҳои пайванди, технологияи парвариши хурмои шарқӣ ва ҳифзи он

аз касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасони зироатҳои кишоварзӣ, азхудкунии методикаи нигоҳдорӣ ва хушкунӣ ба ҳисоб меравад.

Аз ин лиҳоз омӯзиши хусусиятҳои агробиологии хурмои шарқиро актуали шуморида, мақсад гузоштем, ки дар муҳлати муайян методикаи гузаронидани корҳои илмӣ тадқиқотино аз худ карда, навъҳои сифатан беҳтар:

- қобилияти баланди нигоҳдорӣ ва интиқол додани мева дошта

- навъҳои, ки сифати хуби хушккунӣ доранд омӯхта, бо адабиётҳои марбут ба хусусиятҳои биологӣ ва технологияи парвариши ин меваи субтропикӣ барои Тоҷикистон муҳим шинос шавем. Инчунин дар бораи хусусиятҳои сабзиш, ҳосилбанди ва усулҳои афзоиши хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисор ва Вахш мушоҳидаҳои илмӣ гузаронем.

Дар қатори дигар зироатҳои субтропикию ситрусӣ хурмои шарқӣ дорои витаминҳои зиёд, макро ва микро элементҳо мебошад. Меваи хурмои шарқӣ хусусияти шифобахшӣ дошта барои таъмин намудани бозори дохили ва ҳам барои содирот нигаронида шудааст. Тибқи маълумотҳои олимони, С. М. Гулов, [31, с. 13], А.Д. Микаладзе, [91, с. 288], Б.С. Розанов [137, с. 155], В.Н. Колесников [64, с. 233], меваи хурмои шарқӣ таркиби бойи биокимиёвӣ дорад. Дар таркиби он 77,6-85,9 % об, 14,1-22,4 % моддаҳои хушк, 0,54-1,22 % туршиҳои органикӣ, 13,1-20,5 % кандҳо, 0,02-2,35 % полуфенол, 6,4-43,5 мг% витамини С, 0,104-0,386мг% каротин инчунин витаминҳои А, В, дар меваи хоми он 0,1-1,5% танин (моддаҳои дабӯи ) мавҷуд аст.

Хурмои шарқӣ, ки меваи мамлакатҳои иқлимаш мусонӣ мебошад, дар ноҳияҳои гармӣ ҷумҳурӣ ҳангоми обмонии сунӣ худро нағз ҳис карда, аз ҳар як га то 25-30 тонн ҳосил медиҳанд. Хурмои шарқиро дар шакли тару тоза, қоқ маҳсулотҳои коркарди саноати –ҷем, мурабо, мармелад ва ғайра истифода мебаранд А. Д. Микаладзе, [91, с. 288]. Хурмои шарқиро солҳои 40-60-уми асри хх ба ҷумҳурии мо интродуксия намудаанд. То имрӯз дар ноҳияҳои водигии ҷумҳурӣ се наъби он

Хиакуме, Зенджи мару, Гошо-гаки ноҳиябанди шудааст. Хурмои шарқӣ –яке аз маъмултарин растани дар Тоҷикистон гардидааст. Аз ин рӯ омӯзиши хусусиятҳои агробиологии навъҳои нави хурмои шарқӣ ва аз байни онҳо ҷудо намудани навъҳои дурнамо дар шароити Ҷумҳурии бо мақсади васеъ кардани майдони боғҳои хурмои шарқӣ ва ба истифода пешниҳод кардани онҳо масъалаи мубрами рӯз мебошад.

**Дарачаи коркарди илмӣ масъалаи мавриди омӯзиш.** Дар рафти корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, аз дастоварҳо ва натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотии олимони варзидаи соҳаи боғпарварӣ ва селекционерони дохиливу хориҷӣ, аз он ҷумла: А.М. Кормилицин [67, с. 76], Н.М. Мурри [94, с. 63], Б.С. Розанов [141, с. 32-34], Н.Г. Ширяева [171 с. 12-13], С.М. Животинская [46, с. 88], О.П. Кульков [70, с. 26], Ф.А. Кулиев [68, с.45-47], В.И. Запрягаева [52, с. 16-18], Б.Л. Массовер [87, с. 3-20], У.Э. Эшонқулов [173, с. 106], И.А. Загребельный [49, с. 18-21], С. М Гулов.[29, С. 13-15], D. A. Neuwald, A. A. Saquet, I. Sestari and C. K. Sautter [192, с. 51-56], Х.Ф. Сафаралиев [149, с. 27], Р.В. Кулян [72, с. 71-74], А.Х. Мухамедов [99, с. 276], E. Badal [179, с. 154-160], М.Д. Омаров [108, с.26-27], А.В. Рындин [143, с. 24-30], Ҳ.Н. Назиров [102, с. 14-18], Н. Камолов [102, с. 14-18], Н.Камолов, С.Ҳ. Раҳматов [147, с. 28-31.], [148, с. 21-24.] ва дигарон, ки корҳои илмӣ тадқиқотии худро ба парвариш ва селекцияи дарахтони мевадиханда, субтропикӣ ва ситрусӣ бахшидаанд, инчунин қонунҳо ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки оид ба беҳтар намудан ва рушди соҳаи боғу тоқпарварӣ нигаронида шудааст, истифода гардидаанд.

Илова бар ин, дар рафти гузаронидани корҳои илмӣ- тадқиқотӣ маълумотҳои Агентии давлатии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии обуҳавосанҷии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тавсияҳои муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ бевосита истифода гардидаанд. Самаранок истифода бурдани обу заминҳои қорам ва баланд бардоштани

ҳосилнокӣ то сатҳи ниҳои ва сифати хуби мева аз агротехникаи пешқадам ва гузаронидани саривақтии чорабиниҳои агротехникӣ тибқи талаботҳои дар боғдорӣ қабулшуда вобастагӣ дорад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар дигар самтҳои боғпарварӣ алаҳхусус боғпарварию субтропикӣ дар Ҷумҳури то ҳол хело кам гузаронида шудаанд ва натиҷаҳои он хело кам татбиқ гардидааст, бинобар ин мавзӯи интихобшуда барои баланд бардоштани маҳсулотнокии хурмои шарқӣ ва дар оянда васеъ кардани майдони он нақши муҳим дорад.

### **Робитаи тадқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯҳои илмӣ.**

Мавзӯи диссертатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самтҳои афзалиятноки тадқиқотӣ – илмӣ алоқамандии зич дошта, бо як қатор барномаҳои давлатӣ аз ҷумла:

1 Барномаи рушди соҳаи боғу тоқпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020, №424 аз 3 июли соли 2014, ки мувофиқи он бунёди 20 000га. боғи дарахтони мевадиханда нақшабанди шуда буд.

2. Барномаи давлатии рушди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, № 483 аз 20.10.2016.

3. Мувофиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 27-уми март соли 2018, №165, дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №793, аз 30-юми декабри соли 2015 оид ба “Барномаи навбатии рушди соҳаи боғу тоқпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои солҳои 2016-2020”.

Инчунин тадқиқотҳо мутобиқ ба лоиҳаи фармоиши қорҳои илмӣ-тадқиқоти шӯбаи мевапарварӣ ва бутамевагӣҳо барои солҳои 2016-2020 дар мавзӯи “Офаридани навъҳои ба шароити экологӣ устувори дарахтони мевадиханда, чормағзиҳо, ситрусӣҳо бутамевагӣҳо, такмилдиҳии технологияи парвариши ниҳол ва бунёди боғҳои интенсивӣ“РҚД 0116 ТҶ00625 амалӣ гардидааст.

## **Тавсифи умумии тадқиқот**

**Мақсади таҳқиқот.** Дар шароти водии Ҳисору Вахш, дар коллексияҳои хурмои шарқӣ, омӯхтани хусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии навъҳои хурмои шарқӣ, таъсири тағпайвандҳо ба рушду нумӯи навъҳо, ҷудо намудани навъҳои дурнамо барои пешниҳод кардан ба Комиссияи давлатии озмоишӣ навъи зироатҳои кишоварзӣ ва муҳофизати навъҳои Вазорати Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз рӯи аломатҳои мусбӣ ҷудо намудани навъҳо, барои корҳои селексионӣ.

### **Вазифаҳои тадқиқот:**

-Омӯзиши тағпайвандҳои навъҳои хурмои шарқӣ вобаста ба шароити маҳал

-Омӯзиши хусусиятҳои биологӣ ва давраҳои фенологии навъҳои хурмои шарқӣ

-Муайян намудани ҳосилнокӣ ва таркиби биохимиявии навъҳои хурмои шарқӣ.

-Муайян намудани навъҳои дурнамои селексионии маҳаллӣ ба истеҳсолот.

-Самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водихои Ҳисору Вахш

**Объекти тадқиқот.** Ба сифати объекти тадқиқот навъҳои хурмои шарқӣ, аз қабили навъу намунаҳои Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат, Вахш, Тоҷикӣ ва Ҳисорӣ ки маҳсули селексияи Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ мебошанд ва тағпайвандҳои хурмои Кавказӣ (*Diospyros lotus*), хурмои Виргинӣ (*Diospyros virginiana*) истифода шудаанд. Ба сифати навъи назоратӣ навъҳои ноҳиябандишудаи Хиакуме ва Зенджи мару интиҳоб гардиданд.

**Мавзӯи (предмет) тадқиқот.** Хусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водихои Ҳисору Вахш.

**Навгонии илмий тадқиқот.** Бо мақсади гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ ва ҷудо намудани навъу навъҳои ояндадор барои дар истеҳсолот ҷорӣ намудан коллексияҳои навъҳои хурмои шарқӣ аз нав барқарор карда шуд. Дар натиҷаи омӯзиши маҷмӯи хусусиятҳои агробиологию ҳоҷагӣ, ба сармо тобоварӣ, сифати мева, нигоҳдорӣ, интиқол додан ва хушконидаш дар минтақаҳои водигии Ҷумҳурӣ, алаҳхусус водии Ҳисору Вахш дар баландии аз сатҳи баҳр аз 350 то 1300 м, бори нахуст омӯзиши 15 навъу намунаҳо гузаронида шуда, дар натиҷа аз байни онҳо 3- наъи дорои хусусиятҳои ҳоси ҳоҷагию- биологӣ дошта, аз он ҷумла 1 навъ барои истеҳсоли хушкмева интихоб карда, ба Комиссияи давлатии озмоишии навъҳои зироатҳои кишоварзӣ ва муҳофизати наъи Вазорати Кишоварзӣ супорида шуд.

**Аҳамияти назариявӣ ва илмӣ амалии тадқиқот.** Аҳамияти тадқиқотҳои илмӣ дар он аст, ки дар натиҷаи гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ ба истеҳсолот пешниҳод намудани навъу намунаҳои ояндадори дорои ҳосили баланд, меваҳои хушсифат, қобилияти баланди нигоҳдорӣ, интиқолдихӣ ва ба хушконидаш мувофиқ, дар оянда барои бунёди боғҳои хурмо пешниҳод карда мешавад, ки ба ҳалли масъалаҳои стратегияи Ҳукумати Ҷумҳурӣ, амнияти озуқаворӣ ва таъмини саноати хуруквориро ба ашъи хом мусоидат мекунад. Инчунин навъҳое, ки дорои аломатҳои ҳоҷагию биологӣ дошта барои корҳои селекционӣ истифода бурда мешавад. Натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар масоҳати 10 га дар ҳоҷагии ҶДММ «Боғи -15 солаги» Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамоати деҳоти Сомон ва 21га дар ҳоҷагии таҷрибавии «Сунбул»-и шаҳри Ҳисор татбиқ шудааст.

**Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда;**

1. Дар шароити водии Ҳисору Вахш омӯзиши хусусиятҳои биологӣ, марҳилаҳои фенологӣ ва тағпайвандҳо барои навъҳои хурмои шарқӣ.
2. Нишондодҳои маҳсулотнокӣ, ҳосилнокӣ ва таркиби биохимиявии сифати меваҳои тару тозаи меваи навъҳои хурмои шарқӣ.

3. Самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои селекцияи маҳаллии хурмои шарқӣ дар шароити водихои Ҳисору Вахш.

**Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳо.** Натиҷаҳои корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар шароити озмоишгоҳ ва саҳрои тибқи методикаи дар боғдори қабулшуда «Барнома ва усулҳои омӯзиши навъҳои дарахтони мевадиханда, буттамевагиҳо ва чормағзиҳо», Орёл [123, с. 310] гузаронида, ҳассосияти экологии навъу дурагаҳо аз рӯи модели пешниҳод кардаи И.А. Драговцева [42, с. 46] ва таркиби биохимиявии мева дар шароити лаборатории - модаҳои хӯшк, пектин ва дигарҳо мувофиқи методикаҳои дар китоби А.И. Ермаков, [44, с.127] «Усулҳои тадқиқоти биохимиявии растаниҳо» овардашуда, таҳлили дисперсионӣ тибқи “Усулҳои гузаронида таҷрибаҳои саҳроӣ”, Б. А. Доспехов [36, С. 351] ва барномаи компютерӣ Microsoft 2010 муайян карда шуд.

Мақолаҳо, рисолаҳо китобҳои илмӣ соҳавии олмони ватанию хориҷӣ, ки ба омӯзиши масъалаҳои ба сармо тобоварӣ, технологияҳои парвариш ва маҳсулотнокии навъҳои гуногуни хурмои шарқӣ бахшида шудаанд, асоси методологӣ назариявии таҷрибаҳо буданд.

Дар навъу намунаҳои хурмои шарқӣ; мушоҳидаҳои зерин ба қайд гирифта аз натиҷаҳои онҳо хулосабароии карда шуд.

1. Ба сармотобоварии навъҳо дар шароти саҳро ҳар сол зери тадқиқот қарор гирифта тибқи ҷадвали 5-хола (0-5) баҳогузорӣ карда шуд.

2. Мушоҳидаҳои фенологӣ аз давраи варамкунии мугчаҳо сар шуда то ба итмомрасии ҳазонрез идома меёбад. Саршавӣ ва ба охиρрасии ҳар як давраи нашъунамо дар ҷадвал қайд карда шуд.

3. Омӯзиши ҳассосияти навъҳо бо пасту баландшавии ғизлатии намакҳо, зиёдшави ё норасоии макро ва микроэлементҳо аз рӯи меъёри таҳлили биометрӣ, морфологӣ, фенологӣ ва кимёвии муоинавӣ амалӣ гардид.

4. Ба қайдгирии саҳроии устуворияти навъу дурагаҳо ба ҳашаротҳои зараррасону касалиҳо вобаста аз мутобиқати онҳо ба

мухити атроф бо тарзи муфассал ва назардид гузаронида шуд. Ба устуворияти навъҳо аз рӯи дараҷаи 0-5 ҳол ба ҳар намуди ҳашароти зараррасон ва касал дар алоҳидагӣ баҳогузорӣ карда мешавад.

5. Ҳосилнокии навъҳо дар давоми се сол аз рӯи методи ба ҳисобгирии яклӯхт ҳамаи ниҳолҳои таҷрибавӣ аз рӯи ҷадвали 5-ҳола баҳогузорӣ гардид. Дараҷаи ҳосилбанди бо усули бо чашм муайянкунии 0-5 ҳол гузори муайян кардем. Дар баробари ин ҳисоби пешаки миқдори ва бо тариқи тарозукаширо дар вақти ҷамъоварии ҳосил истифода бурда шуд.

6. Сифати молии ҳар як навъ, зери омӯзиш қарор дошта дар асоси нишондоди баҳши 9-уми «Барнома ва усулҳои омӯзиши навъҳои дарахтони мевадиханда, буттамевагиҳо ва чормағзиҳо», Орёл [123, с. 310] омӯхта шуд.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи тадқиқот).** Мавзӯи диссертатсионӣ, “Хусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисору Вахш”, буда, мазмуни диссертатсия ва тадқиқотҳои иҷрошуда ба шиносномаи ихтисосӣ 06. 01.05.- Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ мебошад ва ба бандҳои соҳаҳои зерин мутобиқат мекунад;

**Банди 1, қисми 2.** Ба вучуд овардани маводҳои нави ибтидоӣ барои селексия, такмилдиҳии усул, тарзҳои мавҷудбуда дар қорҳои селекционӣ ва тухмипарварӣ.

**Банди 2.** Барои селексия муҳайё намудани намудҳои растаниҳо бо аломати нав ва хусусиятҳои пурқимати хоҷагӣ бо ёрии омӯзиши усулҳои гуногун ва асосноккунии навъҳои нав ва гибридҳо, қоркарди усулҳои нав, такмилдиҳии усул, тарзҳои мавҷудбуда дар қорҳои селекционӣ ва тухмипарварӣ.

**Банди 3.** Захираҳои растанӣ ҳамчун маводи ибтидоӣ барои селексия

**Банди 4.** Методика, усул, тартиби равишҳои селекционӣ, тухмипарварӣ, (пайвандкунӣ, тарзҳои интиҳоби селекционӣ ва тухмипарварӣ, баҳодиҳи ва сақаткунӣ).

**Банди 5.** Усул ва тарзҳои ошкор кардани хусусиятҳои пурқимати хоҷагии маводҳои селексионӣ ва тухмӣ (кӯчатҳо). Коркарди шартҳои минтақабандии навҳо (гибридҳо) ва ҷобачогузори минтақавии тухмиҳои зироатҳо ва хоҷагиҳои тухмипарварӣ, агротехникаи маводҳои селексионии киштшаванда бо назардошти хусусиятҳои минтақавии экологӣ-ҷуғрофӣ.

**Саҳми шахсии довталаби дарҷаи илмӣ дар тадқиқот.** Саҳми шахсии муаллиф дар омода намудан, интиҳоби дурусти мавзӯи тадқиқотӣ аз ҷумла асосноккунии назариявӣ, амалии самти интиҳобшуда ва усулҳои таҳқиқот, инчунин ташкилу гузаронидани таҷрибаҳои саҳроӣ, озмоишгоҳӣ, апробатсия ва татбиқи натиҷаҳои тадқиқот, таҳлилу коркарди оморӣ ва татбиқи натиҷаҳои ба даст омада иборат мебошад. Ҷамъбасти натиҷаҳои тадқиқот ва наشري мақолаҳо аз ҷониби муаллиф дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ анҷом дода шуда, инчунин таҳияи умумии диссертатсия ва автореферати он аслияти матни диссертатсияро инъикос мекунад. Иштироки бевоситаи муаллиф ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳои илми 86,3% баробар мебошад.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия (гузориши нуқтаҳои асосии диссертатсия дар конференсияҳо, маҷлисҳо, семинарҳо ҳангоми хондани маърузаҳо дар муассисаҳои таълимӣ).** Тадқиқотҳо тайи солҳои 2016-2018 гузаронида шудаанд. Муарифии натиҷаҳои тадқиқотҳои гузаронидашуда ҳамасола дар ҷаласаи Шурои олимони Институту боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ Академияи илмҳои кишоврзии Тоҷикистон муҳокима карда шудаанд. Ҳамасола таҷрибаҳои саҳроӣ аз ҷониби комииссияи апробатсионии Институту боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ АИКТ бо иштироки намоёндагон аз дигар муассисаҳои илмӣ АИКТ дидан намуда, баррасӣ карда шудааст. Муқаррароти илмӣ, хулосаҳо ва пешниҳодҳо оид ба истеҳсолот асоснок карда шуда, ба маълумоти таҳлилӣ ва таҷрибавӣ асос ёфтаанд, ки дараҷаи эътимоднокии онҳо бо коркарди оморӣ бо истифода аз барномаи компютерии Microsof Exsel собит шудааст. Хулоса ва пешниҳодҳо ба

тадқиқотҳои илмӣ асос ёфтаанд, ки бо усулҳои муосир таҳлил гардидаанд. Инчунин натиҷаи корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар конференсияҳои илмӣ амалии ҷумҳуриявӣ ва рӯзномаву маҷалаҳои тақризшаванда аз ҷумла:

Конференсияи илмӣ амалии ҷумҳуриявӣ “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ” Бахшида ба 30–солгии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” Душанбе 2021, АИКТ, Маводи конференсия илмӣ ҷумҳуриявӣ «Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ» Бахшида ба даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор 2018-2028» Душанбе -2022, Маводҳои конференсияи илмӣ назарияи байналмилалӣ дар мавзӯи «Истифодабарии усулҳои инноватсионӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии дарахтони мевадиханда, ангур ва зироатҳои сабзавотию картошка» Душанбе- 2022, Маводи конференсия илмӣ ҷумҳуриявӣ “Нақши олимони ҷавон дар рушди илм инноватсия ва технологияи кишоварзӣ” Бахшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзи дар соҳаи илму маориф” ва даҳсолаи байналмилалӣ амал “об барои рушди устувор” 2018-2028 Душанбе “Ганҷи хирад”- 2024 ва ғайра конференсу семинарҳо барасӣ ва муҳокима шудаанд.

**Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия.** Натиҷаҳои тадқиқот дар 13 мақолаҳои илмӣ, аз он ҷумла 8 мақола дар маҷалаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар маводҳои Конференсияҳои ҷумҳуриявии илмиву назарияи АИКТ ва 1 мақола дар Конференсияи байналмилалӣ ба ҷоп расидааст, ки мазмун, мундариҷа ва муҳтавои асосии тадқиқоти мазкурро дар бар мегирад.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Кори диссертатсионӣ дар ҳаҷми 161 саҳифаи матни компютерӣ дарҷ гардида, аз муқаддима, 5 боб, хулоса,

тавсия ба истифодаи амалии натиҷаҳо, рӯйхати адабиётҳои истифодагардида ва замимаҳо иборат аст. Кор бо 29 ҷадвал, 23 расм ва 10 диаграмма тавсиф ёфтааст. Рӯйхати адабиёти истифодагардида 195 аз ҷумла 19 адабиёти хориҷи кишварро ба забони англисӣ дар бар мегирад.

## БОБИ 1. Шарҳи адабиёт

### 1.1 Пайдоиш ва минтақаҳои парвариши навъҳои хурмои шарқӣ

Хурмои шарқӣ як намуди васеъ паҳнғаштаи авлоди *Diospyros L.* аз оилаи обнусиҳо мебошад, ки ин авлод қариб 200 намудро дар бар мегирад, ки қисми зиёдаш ҳамешасабз буда, дар мамлакатҳои иқлимаш тропикӣ ва якчанд намудах дар минтақаҳои иқлимаш субтропикии арзҳои муътадил меруяд. Хурмои шарқӣ- (*Diōspyros kākī L.*) як намуд дарахти бисёрсола намояндаи оилаи *Ebenaceae* обнусиҳо буда, аз Осиё сарчашма мегирад. Ватани хурмои шарқӣ қисми шимолӣ ва марказии давлати Чин мебошад. Ин намуд дар Ҷопон, Чин, Мянма, Непал ва шимоли Ҳиндустон мерӯяд. Тибқи маълумоти олимони дар Чин он дар шакли ёбон *F. Edwar. Gilman and G. Dennis*, [186, с.14-19], дар баландии то 1830-2500 м. аз сатҳи баҳр меруяд. Дар Чин тақрибан 2000 навъ, дар Ҷопон зиёда аз 800 навъ маълум аст, ки тақрибан 150-тои онҳо тавсиф шудааст, *J. Morton*, [191, С. 505].

Дар ҳудуди собиқ ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шуравӣ як намуди худруйи он хурмои кавказӣ мерӯяд, ки дар Тоҷикистон бо номи челон ё чилванг маълум аст *В. А. Колесников* [64, С. 233], *В.И. Запригаева* [53, С. 32-34]. Инчунин намудҳои хурмо (*Diospyros Lotis*) ва Виргинӣ (*Diospyros virginina*) интродуксия шудаанд. Хурмои кавказӣ ва виргинӣ асосан барои тағпайванд истифода бурда мешавад.

Дар сарзамини Чин хурморо ханӯз то милод парвариш мекарданд. Дар Чин хурмои шарқӣ яке аз қадимтарин растани ба ҳисоб меравад он тақрибан 2000 сол ин ҷониб парвариш карда мешавад. Минбаъд хурмопарварӣ дар Япония ва Корея низ анъана гашт. Эҳтимол, хурмо бори аввал ба Аврупо дар киштиҳои тоҷирони португалӣ дар асри 16 ворид шуда, буд *Debra Morris, Martinez Tribune*, [184, С.34-35].

Дар ибтидои асри XVII дар Аврупо, ки аз парвариш ва селекцияи хурмо маълумоте надоштанд, аз сабаби хурданибоб набудани ин мева аз парваришаш даст кашидаанд. Хурмопарварӣ дар ин ҷо фақат баъди дар

мачаллаҳои кишоварзии Фаронса (с.1870) дарҷ гардидани мақолаҳои илмӣ расми шуд. Ба сарзамини собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ хурмо дар соҳили Баҳри сиёҳ ва Кавказ солҳои 1888-1889 оварда шуда буд.

Дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ хурмои шарқӣ дар соҳили Баҳри сиёҳ, Гурҷистон, Абхазия, Озарбойҷон, Арманистон, Доғистон, вилояти Краснодар ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ҷумҳуриҳои Ўзбекистону Тоҷикистон парвариш карда мешавад В.П. Екимов, [43, с. 273]. Б.С. Розанов, У.Э. Эшонқулов, [135, с. 28-29], Б.С. Розанов, У.Э. Эшонқулов, Б.Л. Массовер, [136, с. 28-30], В.Г. Сильвандер, М.Я. Менликиев [156, с. 37-39].

Федерацияи Россия сарфи назар аз ҳудуди азими 17 миллион километри мураббаъ, танҳо як қисми нозик (қариб 50 ҳазор гектар) майдонҳое дорад, ки барои парвариши зироатҳои гармидӯсти субтропикӣ, аз қабилҳои хурмо, фейҳоа, анҷир, меваҳои цитрусӣ ва унаби мувофиқ мебошад, Р.В Кулян, Ф.К. Иваненко, Д.В Ксенофонтова, [73, с. 223-227].

Шароити табиӣ минтақаҳои соҳили баҳри Сиёҳ ва Кавказ имкон медиҳад, ки бисёр зироатҳои субтропикӣ, аз ҷумла хурмо парвариш карда шавад, парвариши хурмои шарқӣ дар солҳои 1888-1889, вақте ки ширкати боғдории Синоп дар Сухум аввалин маротиба аз Италия 13 навъи хурморо харидааст оғоз ёфт. Пас аз 4 сол, коллексияи хурди навъҳои хурмои субтропикӣ дар боғи ботаникии Тбилиси ва соли 1901 дар Боғи ботаникии Никитскийи Қрим як боғи хурди хурмо бунёд шуда буд, С. Ю. Хохлов, [162, с. 206-220].

Дар давраи пеш аз инқилоб охири харидаи назарраси ниҳолҳои хурмои шарқиро боғи ботаникии Батуми соли 1913 анҷом дода буд В.Л. Витковский, [15, с. 42], В. Л. Витковский, [16, с. 403], В.В Воронцов, [19, с. 270].

Аз руи маълумоти И.М. Бережной, [7, с.34-40] дар минтақаҳои соҳили баҳри сиёҳ аз сарҳадҳои ҷануби то вилояти сочи дарахтони

чавон ва дарахтони алоҳидаи ҳосилдиҳанда дар Озорбойҷон, Доғистон, дар соҳили ҷанубии нимҷазираи Қрим, боғи ботаникии Никитинский бошад шӯморай ками дарахтони хурмои шарқӣ мавҷуд буд. Дар Гурҷистони Ғарбӣ хурмопарварӣ аз соҳили баҳри сиёҳ то вилояти Кутаиси паҳн шудааст И.М. Бережной, [7, с. 34-40].

Дар қаламрави Абхазия ва Адҷария зиёда аз 120 навъҳои хурмо мавҷуд аст, ин аз он шабоҳат медиҳад, парвариши хурмои шарқӣ ҳамчун шӯғли дустдошта паҳн шудааст. Ниҳолҳо аз Ҷопон, ки ватани дуҷуми хурмо аст, оварда шудааст, Н.И. Зактрегер, [51, с. 22-32].

Дар Абхазия дарахтони соли 1888 шинонда шудаанд, ки ҳоло ҳам месабзанд ва мева медиҳанд. Дарахтони калонсол дар хоҷагиҳои шахси ва богдории саноатӣ вомехуранд. Аз зироатҳои субтропикӣ бештар хурмои шарқӣ ба сармо тобовар аст. Минтақаи шимолии парвариши он дар ҷануби Русия, вилояти Геленжик (деҳаи Джанхот) мебошад, ки дар ин ҷо дар баъзе солҳо сардиҳои зимистон то 15-20°C мушоҳида мешавад, аммо хурмо дар ин ҷо бор меорад ва пайваста ҳосили баланд медиҳад, В. Е Воронцов, [20, с. 24], Г.Т. Селянинов, [151, с. 142].

Хурмои шарқӣ (*Diospyros kaki L.*) яке аз маъмултарин зироатҳои мевагӣ дар соҳили баҳри Сиёҳи Федератсияи Русия мебошад, М.Д Омаров, [108, с. 26-27].

Дар Федератсияи Русия хурмои шарқӣ бо назардошти коркарди саноатӣ дар соҳили баҳри Сиёҳ, қаламрави Краснодар, минтақаи ҷанубии Ҷумҳурии Доғистон ва баъзе минтақаҳои Қрим парвариш карда мешавад Н.Г. Загиров, М.М. Мурсалов, [48, с. 31-33],

Дар Пажӯҳишгоҳи умумирусиягии гулпарварӣ ва зироатҳои субтропикӣ (Сочи) коллексияи хурмои шарқӣ мавҷуд аст, ки 22 навъи селекцияи ватанӣ ва хориҷиро дар бар мегирад, ки аз Чин, Ҷопон, Амрико ва Италия ворид карда шудаанд М.Д. Омаров, Т.Д. Беседина [114, с. 162].

Ҳоло хурмо ғайр аз Чин, Япония, Корея ва дигар мамолики Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубӣ - Шарқӣ дар мамлакатҳои ҷануби Аврупо, ки дар соҳили баҳри Миёназамин ҷой гирифтаанд, ҳамчунин дар Африқои Шимолӣ, ИМА, Мексика, Австралия ва ғайра парвариш карда мешавад.

Ба ИМА хурморо ботаник Ф. Н. Мейер аз Чин бурдааст, аз ҳамон замон (солҳои 90-уми асри XIX) сар карда дар штатҳои Флорида, Алабама, Техас ва Калифорния ба парвариши ин дарахт шурӯъ намуданд.

Тухми хурмо бори аввал соли 1855 аз ҷониби Коммодор Перри аз Ҷопон ба ИМА оварда шудааст. Баъдтар, дар соли 1870, ниҳолҳои хурмо аз ҷониби Департаменти кишоварзӣ аз Ҷопон харида шуда, дар Калифорния шинонда шуданд. Он дар Австралия аз соли 1885, дар Бразилия аз соли 1890 парвариш карда мешавад (ниҳолҳои хурмо пас аз соли 1920 бо афзоиши шумораи муҳоҷирони Ҷопон ба таври назаррас васеъ шуданд, *D. A. Neuwald, A. A. Saquet, I. Sestari, and C. K. Sautter*, [192, с. 51-56].

Наздиктарин ҳешовандони хурмои шарқӣ дар кишварҳои гуногун мерӯянд, ки бо номи машҳури дарахти сиёҳ дар Африқо мерӯяд, дигараш сиёҳи сурх дар ҷазираи Маврикий, хурмои виргинӣ дар ИМА, Кавказ, Хитой, Хиндустон, Эрон, Закавказье, инчунин дар соҳили баҳри Сиёҳ низ мерӯяд, В. Дадыкин, [38, с. 142-143].

Хурмои шарқӣ дар кишварҳои Баҳри Миёназамин дар Фаронса дар миёнаҳои асри XIX, сипас дар Италия ва Алҷазоир парвариш карда шуд. Дар Русия, ҷорӣ намудани хурмо дар фарҳанг дар солҳои 1888-1889 дар Сухум оғоз ёфт, ки дар он ҷо ниҳолҳо аз Италия ворид шуда буданд. Дар боғи ботаникии Тбилиси соли 1895 аллакай 22 навъ парвариш меёфт, ки аз Италия ворид карда шуда буданд, Н. М. Мурри, [96, с. 63].

Хурмои шарқӣ дар ҷаҳон аз ҳама паҳншуда буда, дар боғдориҳои субтропикӣ пас аз зироатҳои цитрусӣ ҷои дуюмро ишғол мекунад. Ба ақидаи Н.М. Мурри навъҳои нави хурмо аз дурағаҳои табиӣ хурмои

ромбифолия ва хурмои чини сарчашма гирифтааст Н.М. Мурри, [97, с. 68].

Макони асосии парвариши хурмои шарқӣ Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Чин ва Ҷопон мебошад, ки дар онҳо зиёда аз 120,0 ҳаз. га боғҳои он мавҷуд аст. Хурмои шарқӣ дар ИМА (Иёлоти Калифорния, Аризона, Алабама, Техас, Флорида ва Ҷорҷия), инчунин дар Италия, ки айни замон дар он ҷо зиёда аз 18 ҳаз. га боғҳои саноатӣ мавҷуд аст, ба миқдори кам парвариш карда мешавад, ки аз он тақрибан 0,5 миллион тонна мева истеҳсол мекунад В. Е. Воронцов, [20, с. 24].

Дар кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар Гурҷистони Ғарбӣ, Озарбойҷон, Туркманистон, ҷануби Ўзбекистон навъҳои истеҳсолии дарахтони хурмои шарқӣ (японӣ) ҷойгир буданд, ки дар майдони зиёда аз 6,0 ҳаз. га кишт карда мешуданд К.В. Блиновский, [8, с. 49-52], В.Л Витковский, [15, с. 42], Н.И. Зактрегер [50, с. 82-93], Ф.Ф. Мануйло, [81, с. 26-28].

Айни замон дар минтақаҳои субтропикии баҳри Сиёҳи кишвари Краснодар дар майдони 135 га боғҳои хурмо, ки асосан аз навъҳои омехта иборатанд меруянд В.Е Воронцов, [20, с. 24].

Дар соли 1935 аввалин воридшавии ниҳолҳои хурмо оғоз ёфта, аммо корҳои илмӣ оид ба ин зироат соли 1939 гузаронида шуд. Се намуди хурмо аз Ҷопон ворид карда шуданд (Шарқӣ, Виргинӣ ва Қафқозӣ), зиёда аз 20 навъҳои беҳтарини қаламчаҳои воридшуда аз онҳо 10 навъи онҳо сабзиданд. Хулосаҳои аввалине, ки дар бораи ин зироат ба даст омадаанд, дар бораи ба сармо ва гармӣ тобовар буданд, К.Р. Раҷабов, [133, с. 216-218].

Соли 1935 аз шаҳри Сухуми Гурҷистон ниҳолҳои пайвандии хурмои шарқиро ба стансияи таҷрибавии Ҷ. Балхӣ оварда буданд, аммо дар натиҷаи сардиҳои зимистони соли 1936 ниҳолҳо аз сармо осеб дида, хушк шуданд. Бори дуюм дар шароити ҷанубии Ўзбекистон дар тағпайванди хурмои кавказӣ аз қаламчаи хурмои шарқӣ ниҳолҳо сабзонида шуда,

соли 1949 ба стансияи таҷрибавии Колхозободи водии Вахш имрӯза стансияи таҷрибавии зироатҳои субтропикӣ ва ситрусӣ ноҳияи Ҷ. Балхӣ ва шаҳри Душанбе мавзеи боғи ботаникии Донишгоҳи Давлатии Миллии Тоҷикистон оварда шинонида шуданд. Дар минтақаҳои субтропикии мевапарварии Тоҷикистон се намуди хурмо, шарқӣ, кафказӣ ва виргини меруяд. Дар боғдорӣ хурмои шарқиро барои таъми خوش доштани меваш, миқдори зиёди қанд 20-25% дар намуди глюкоза ва фруктоза парвариш мекунад, Б.Л.Массовер, [86, с. 55].

Дар натиҷаи тадқиқотҳои гузаронида шуда, дар қаламравӣ Ҷумҳуриамон то баландии 1100 м аз сатҳи баҳр хурмои шарқиро дар хоҷагиҳои назди ҳавлигӣ ва қитъаҳои начандон калон зиёда аз 22 навъу намунаҳо парвариш карда мешавад, С.М.Гулов, [30, с. 200-213].

Дар Тоҷикистон аз соли 1949 аз стансияи таҷрибавии Деҳнави ҷумҳурии Ёзбекистон ворид карда шуда буд. То ин ҷониб дар қаламравӣ Ҷумҳуриамон то баландии аз сатҳи баҳр 1100 м баланди парвариш карда шуда, зиёда аз 22 навъу намунаҳо дар бар мегирад, С. М. Гулов, [31, с. 27].

## **1.2 Таъсири тағпайвандҳо ба рушду нумӯ ва ҳосилнокии хурмои шарқӣ**

Дар истеҳсолот аксарияти дарахтони мевадиханда: себ, нок, бихӣ, зардолу, шафтолу, олу, олуча, гелос, олуболу, чормағз, бодом, pista, хурмои шарқӣ ва ғайра бо воситаи пайванд афзоиш дода мешавад, ки аз ду қисм- тағпайванд (реша) ва болопайванд (қисми пайвандшуда) иборат аст.

Аз маҷмуи муракаби робитаи тағпайванд бо болопайванд дар истеҳсолот ин тағйирпазирии навъи пайвандшуда аз таъсири тағпайванд мебошад. Ба ақидаи С.Н. Степанов, [155, с. 24-35], тағпайванд бо болопайванд тавассути мубодилаи моддаҳо таъсир мерасонад. Ҳатто тағпайванди ҷавон ба навъи пайвандшуда, таъсир мерасонад. Аз тағпайванд рушду инкишоф, дарозумрӣ, оғози ҳосилбандӣ, ҳосилнокӣ,

басармотобоварӣ, гузариши давраҳои фенологӣ ва сифати мева вобастааст.

Оид ба омилҳои муайянкунандаи қобилияти умумии сабзиши чинсҳои гуногуни дарахтони мевадихандаи пайвандшуда муҳаққиқ, С.Н. Степанов [155, с. 24-35], қорҳои илмӣ- тадқиқотӣ бурдааст.

Махсусияти фардии навъҳо ба таъсири байниҳамдигарии тағпайванду болопайванд, таъсири тағпайванд ба сифати асосии аломатҳои хоҷагӣю биологӣю болопайванд оид ба хурмои шарқӣ ки ирси ташакул ёфтаанд олимони, Б.А. Массовер [87, с. 3-20], З. М. Гасанов, [23, с. 431], Н.М. Мурри [98, с. 62], А. Д. Микаладзе [91, с. 288], Т.Г. Габибов, [21, с. 26], Н.Г. Загиров, [47, с. 28], А.Х. Мухамедов Г. Дадаҷонов, [99, с. 276], дар маводҳои илмӣю худ маълумотҳои зиёде овардаанд.

Пайвастишавии тағпайванд бо болопайванд худ ба худ кафолати сабзиши муътадили дарахти пайвандшударо, рушду нумӯи хуб ва маҳсулотнокии баландро намеридад. Дар амалияи боғдорӣ бисёр мушоҳидаҳо ҳаст, ки пайванд хуб мегузарад, лекин ниҳоли пайвандшуда тез ба касалиҳо дучор шуда кӯтоҳ умр мешаванд, ки ин гуна хусусиятҳо аз ҷиҳати анатоми номувофиқии тағпайванду болопайванд меноманд, С.Н. Степанов, [155, с. 24-35].

Ба ин омил таъсис шудани тағпайванд аз болопайванд ё баракс. Камғизои дар ниҳолҳо, пайдошавии нуқтаҳои сиёҳ дар қисми болою поёни ҷои пайвандшуда мушоҳида мешавад. Дар мавриди дараҷаи пасти пайдошавии касалии нуқтагӣ чиншавии ҷуби танаи дарахтонмушоҳида мешавад. Ба ақидаи В.А. Коровин, [71, с. 127], касалии нуқтагӣ аз ҳама шакли паҳнғаштаи номувофиқатии тағпайванду болопайванди себ дар минтақаи боғдорӣи Русия мебошад.

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои олимони дар боло овардашуда таъсири тағпайванд бо болопайванд дар давраҳои рушду инкишофи дарахтони мевадиханда мушоҳида мешавад. Хурмои шарқӣ асосан дар тағпайванди хурмои кавказӣ ва дар минтақаҳои камнаму хунук дар тағпайванди хурмои виргинӣ пайванд гузаронида мешавад.

Дар хурмои шарқӣ, сарфи назар аз як қатор бартарихи тағпайванди хурмои кавказӣ, имконият ва дурнамои истифодаи тағпайванди хурмои виргинӣ ба сармо тобовар пас аз зимистони шадиди солҳои 2007-2008 исбот карда шуд. Аз натиҷаҳои мушоҳидаҳои фенологӣ маълум шуд, ки давраи нашъунамои хурмои шарқӣ дар тағпайванди хурмои кавказӣ новобаста аз навъу намунаҳо як ҳафта пештар назар ба хурмои виргинӣ оғоз меёбад, А.Х. Мухамедов, Г. Дадочонов, [99, с. 276].

Дар хурмои шарқӣ решаҳои амудӣ дар дарахтони 10-сола то 140-160 см чуқур мераванд, решаҳои уфуқӣ аз тана то 250 см дур мешаванд, аммо зичии аз ҳама зиёд (67- 82%) дар масофаи 100 см ҷойгир мебошад. Хурмои шарқӣ, ки ба хурмои қафқозӣ пайванд карда мешавад, системаи решааш муякдор ва панчазада мебошад. Дар муқоиса бо тағпайванди Виргинӣ, он ғуҷуғваттар аст ва решаҳои скелетии бештар дорад.

Дарозии умумии 1/2 решаҳо дар хурмои Қафқоз 1647 см, дар хурмои Виргинӣ 1234 см мебошад, ки 1,5 маротиба зиёдтар аст. Дар дарахтони хурмои шарқӣ, ки дар тағпайванҳои гуногун пайванд карда шудаанд, решаҳо аз тана дар масофаи 250 см дур ҷой гирифтаанд, аз ин рӯ, растаниҳо дар ин синну сол бо нақшаи 5x5 м шинонидан тавсия мешавад, М. Д. Омаров, З.М. Омарова, [107, с. 43-50].

Хурмои шарқӣ, ки тағпайвандаш хурмои кавказӣ мебошад ба қадри имкон ба хушкӣ тобовар аст. Хушксолие, ки баҳору тобистони соли 1957 шуда гузашт, давомнокиаш 160 рӯзро ташкил дод, сабаби рехтани баргу мева шуд. Дар ҳамон давра ба монанди дигар меваҳои субтропикӣ хурмои шарқӣ осеб дида ҳосили паст дод, А.С. Мосияш, [95, С. 98--100].

Хурмои шарқӣ ба воситаи ба ниҳоли хасаки Кавказӣ пайванд кардани чашмаки он зиёд карда мешавад. Танҳо барои баъзе навъҳои нав чашмакҳои ба хурмои шарқӣ ё Виргинӣ пайвандкардашуда натиҷаи хуб медиҳад. Тухми хурмои кавказиро дар пуштаҳои бо култиватори тракторӣ кашидашудаи бараш 60-70 см мекоранд, тухми дар қаторҳо кошта мешавад ва онро ба чуқурии 2-3см зери хок мекунанд. меёри

кишти хурмои кавказӣ 35-45кг/га мебошад. [Б.О. Розанов., У.Э. Эшонкулов, [135, с. 28-29].

Ниҳолҳои хурмои кавказӣ шохаҳои хурду решаҳои хуб инкишофёфта доранд, дар аснои шинондан дар ҷойҳои доимӣ нашъу нумуи беҳтар доранд, ниҳолҳои хурмои виргинӣ бошанд, бо решаҳои худ фарқ мекунад, ва ба хушкӣ сармо устуворияти хуб дорад, С.М Животинская, [45, с. 7-8].

Ниҳолҳои хасаки хурмои Виргинӣ алакай дар соли якуми сабзишашон тирреша пайдо карда, чуқур ба замин ҷой мегиранд, ки дар вақти ба ҷой доими шинонидан боиси сабзиши паст мегарданд. Аммо хурмои Виргинӣ дар Кавказӣ пайвандшуда, решаҳои панчазада пайдо карда сабзиши хуби ниҳолҳоро таъмин мекунад, Б.Л. Массовер, Ж.А. Леванова, [89, с. 26].

Бояд ба инобат гирифта шавад, ки навъҳои дар тағвайванди хурмои виргини пайванд гузаронида шуда, дорой кадом хусусиятҳо мебошанд.

а) барои аз як ҷо ба ҷой дигар кучонидан он қадар мувофиқ нест (сабабаш решаҳои суст афзоиш ёбандаи паҳлуи мебошад),

б) нисбатан ба нами эҳтиёҷ дорад,

в) афзоишаш суст,

г) ҳосилнокиаш нисбати тағвайванди хурмои кавказӣ паст,

д) дароз умр нест дар Амрико навъҳои хурмои виргинӣ Meader «Мида», Earir «Еви», Carretson «Карретсон», Prok «Прок» ва ғайра, ки бо номи «Персимон» (persimmon – хурмо) парвариш карда мешавад, Г. К. Герасимов, [24, с. 5-6].

### **1.3. Хусусиятҳои биологии хурмои шарқӣ**

Дар технологияи парвариши боғдорӣ гузаронидани як қатор чорабиниҳои агротехникӣ, вобаста аз хусусиятҳои биологии ҷинси дарахтони мевадиханда гузаронида мешавад. Хусусан аломатҳои биологию хоҷагии онҳо, ки аз ҷиҳати генетикӣ дар сатҳи ҳуҷайра ва бофтаҳо пайдо шудаанд робитаи зич дошта бошанд ҳам, лекин вобаста ба муҳити зист устуворият ба гарми, сарди, хушкӣ, намнокӣ, касалиҳои

занбурӯғӣ, ҳосилнокӣ ва сифати мева, натавона намудҳо, балки наваҳо байни яктигар тафовути калон доранд. Бинобар ин дар вақти ба нақшагирии бунёди боғҳо ба назар гирифтани хусусиятҳои биологии дарахтони мевадиханда шартӣ зарури мебошад, И. А. Драгавцева, И.Ю. Савин, [42, С. 46].

Баҳри рушду инкишофи муътадили хурмо маҷмӯи ҳарорати фаъол бояд 3000–3500°C бошад. Ҳарорати мусоидтарин барои сабзиши наваҳо 17–19°C, барои шукуфтани гул 20–22°C аст. Қатъи назар аз ин ҳуноқиҳои тирамоҳ ва баҳоррӯя ба дарахти хурмо метавонанд зиён расонанд, С.М. Гулов, [30, с. 200].

Зироатҳои субтропикӣ анор ва хурмои шарқӣ дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзии мусбӣ тақрибан 20°C, О. П. Кулков, С. М. Животинская, [70, с. 26] ва баъзе растаниҳои арктикӣ дар ҳарорати мусбӣ 2,0-2,5 °C В. Ф. Шамурин, [169, С. 26], мешукуфанд. Барои гардолудшавии растаниҳои тропикӣ ҳарорати муътадил аз 18-20°C лозим аст, ки гарди анор ва хурмо дар ҳарорати мусбӣ 12° ва муътадили мусбӣ 20-25°, себ ва дарахтони зардолу мутаносибан дар 5° ва 15-20°C, гелос, олу дар 3° ва 10 -18° гардолуд мешаванд, А. А. Ядров, [176, с. 16-19].

Мувофиқи маълумоти Розанов Б.С. [1969], барои пухта расидани меваи ҳар як зироат дар алоҳидаги миқдори ҳароратҳои зерин лозим аст: лиму 3500- 4000°C, анор, афлесун 5000-6000°C, анҷир 4300-5000°C, хурмо- 4000-4500°C, бодом-3800°C. Ин нишондодҳо дар шароити Ўзбекистон мувофиқат мекунанд, Б. С. Розанов, [138, с. 41-43].

Қисми асосии реша (то 80%) дар чуқурии 10–50 см ҷойгир аст, дар давраи нашъунамо ба растанӣ на камтар маҷмӯи ҳарорати фаъол аз 3000-3500°C (ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво 10°C) лозим аст. Давраи сабзиш дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво +8°C...+9°C оғоз мешавад. Нашъунамои наваҳо дар +17°C - +19°C ба амал меояд. Ҳарорати мусоидтарин барои гулкунӣ +20°C - + 22°C мебошад, А. К.

Пасенков, [125, с. 5-9], А.А. Ядров, Л.Т. Синко, А. Н. Казас, В. А. Шолохова, [176, с. 16-18].

Масъалаи хусусиятҳои биологии хурмои шарқиро дар минтақаҳои гуногуни парвариши он олимони А. П. Драгавцев [42, с. 46], А. Я. Зарецкий [55, с. 93-106], З.Ю. Набиев [101, с. 24], О.П. Кулков [69, с. 26-27], Ф.А. Кулиев, [68, с. 45-47], А. К. Пасенков [125, с. 5-9], С. М. Животинская [45, с. 7-8], А.А. Ядров [176, с. 16-19], Б.Л. Массовер [85, с. 28], [86, с. 55], Г.Т. Гутиев, [34, с. 39-40], А. Г. Минков [92, с. 80] ва дигарон омӯхта аз натиҷаҳои тадқиқотҳои гузаронидаашон хулосабарори карда, дар маводҳои илмиашон маълумотҳои зиёд овардаанд.

Хусусиятҳои нашьунамои мева ва наждаҳои дарахти хурмои шарқӣ муқаррар карда шудааст, ки дар наждаҳо афзоиши дуҷумдараҷаи тобистона мушоҳида шудааст ва пайдоиши муғчаҳои нашьӣ дар тирамоҳ пас аз ранг гирифтани мева оғоз меёбад. Дар ин вақт, мева нашьунаморо қатъ мекунад ва то пурра пухтан қутраш тағйир намеёбад. Дар вақти нарасидани об аввал кам шудани диаметри нажда мушоҳида мешавад, баъд аз чанд вақт ташакулёбии мева қатъ мегардад. Баъди обёрӣи растанӣ аввал нажда, баъд мева ташакул меёбад. Таъсир дар афзоиши андозаҳои хаттии онҳо зоҳир мешавад. Яъне ташакулёбии мева ва наждаҳо вобастаги дорад аз речаи обёрӣ О. А. Ильницкий, С. П. Корсакова, Ю. В. Плугатар, [58, с. 32-34].

Решаҳои хурмои шарқӣ ба структураи хокҳои сабук ниёз доранд, дар массаи ҳаҷми хоки 1,6 см<sup>3</sup> афзоиш намекунанд, агар чи ташакул ҳам ёбанд аз зичӣ ва набудани ҳаво нобуд мешаванд, В. А. Колесников, [66, с. 152].

Беҳтарин хок барои хурмо хоки тираанги, намнок, каштани сабук, хоки зарди хокистаранги мебошад. Дарахтон ба шароити хок камталаб буда, ба хокҳои шибарзамин тоб намеоваранд, А. Ядров, Л.Т. Синко, А.Н. Казас, В.А. Шолохова, [176, с. 16-18].

Ба ақидаи бисёр олимон алалхусус А. Я. Зарецкий, [55, с. 93-106], Ф. А. Кулиев [68, с. 45-47], З. Ю. Набиева [101, с. 24], ва ғайра барои парвариши навъҳои дилҳои хурмои шарқӣ дар заминҳои обёришаванда дар тобистони гарму камоб қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ гузаронида, рушду нумӯ ва ҳосилнокии дарахтонро ғайри қаноатбахш ҳисобиданд. Ба оби зиёд ниёз доштани хурмои шарқиро дигар олимон тасдиқ кардаанд [Ф.А. Кулиев, З. М. Гасанов, С.Р. Рамазанов, А.С. Рзаев, [68, с. 45-47].

Навъҳои зиёди хурмои шарқӣ мавҷуданд, ки аз рӯи намуди гулҳо фарқ мекунанд, аммо ҳамаашон ба рӯшноӣ ва намӣ эҳтиёҷ доранд, А. К. Пасенков, [125, с. 5-9], А. А. Ядров, Л.Т. Синко, А. Н. Казас, В. А. Шолохова, [176, с. 16-19].

Бо нарасидани рӯшноӣ баргҳо дигаргун мешаванд, наваҳо аломатҳои этиолатсияро нишон медиҳанд ва меваҳо мерезанд. Дар минтақаҳои, ки соя ҳаст қади дарахтон баланд шуда, ҳосилнокӣ паст мегарадад. Омӯзиши воқуниши растаниҳои хурмо ба норасоии мӯътадили обёрӣ (50% аз назорати ҳисобшуда барои истеъмоли умумии об) дар яке аз се давраи пайдарпайи нашъунамои мева (дарҳол пас аз гул, нимаи тобистон ва пеш аз пухтан) ба норасоии об ҳассосият нишон дод. Ба нашъунамои меваи хурмо ва вазни низоии онҳо бештар нарасидани намии тобистон (аз нимаи моҳи июль то охири моҳи август) таъсир расонд. Кам шудани вазни мева инчунин аз он сабаб буд, ки норасоии мӯътадили об дар давраи аввал рехтани меваҳо кам гашта, дар низои кор микдори меваро нисбат ба назорат зиёд карда, хароҷоти обро 20 фоиз кам кард, E. Badal, I. Buesa, D. Guerra, L. Bonet, P. Ferrer, D.S. Intrigliolo, [180, с. 143-147].

Дар шароити норасоии об дар Қрим, ин хусусиятро барои нигоҳ доштани ҳосил хангоми пас аз гулкунӣ паст будани ташаккули мевачаҳо истифода бурдан мумкин аст. Дар баробари ин бояд ба назар гирифт, ки афзоиши умумии мева вазни онро кам мекунад ва дар навбати худ арзиши тичоратии онҳоро паст мекунад. Ба ҳамин тарик, барои муайян

кардани стратегияи истифодаи норасоии муътадили об, ки имкон медихад самараи истифодаи обёрӣ бе кам кардани хароҷоти иктисодӣ зиёд карда шавад, тадқиқоти минбаъдаи комплекси хусусиятҳои экофизиологии зироати хурмо зарур аст. Бо назардошти ҳамин минбаъд таъмини чараёни речаи обёриро омуктан лозим меояд.

В. Г. Карманов, Е. П. Рябова, [62, с. 81-87], R. L. Closs, [182, с. 281-288], с. R. Daum, [185, с. 425-431], В. Huber, E. Schmidt, [188, с. 514-529], D.S. Intrigliolo, J.R. Castel, [187, с. 173-180], ва тағйирот дар диаметри поя Н.Г. Балыков, [6, с. 18-34], В. Klepper, V.D. Browning, H.M. Tauier, [189, с. 683-685].

Хурмои шарқӣ ба намии зиёд ниёз дорад, дар баробари ин, зиёдати он зараровар аст, зеро он боиси пурқувват нашъунамои навдаю реша мегардад; мева ба кадри кифоя наму гизо нагирифта, мерезад, А. А. Ядров, Л.Т. Синко, А. Н. Казас, В. А. Шолохова, [176, С. 16-19].

Бо нарасидани намӣ дар давраи нашъунамо равандҳои фаъоли нашъунамо боздошта мешаванд, сифати ҳосил паст мешавад, ташаккули навдаи генеративӣ суст мешавад ё тамоман рух намедихад, М. Д. Кушнеренко, А. Б. Курманова, М. Д. Исакова, [76, с. 17-19], Ҳ. Акса, Ҳ. Ozkan, В. М. Asma, [177, с.129-133].

Барои нашъунамои муътадилу хуби ниҳолҳои наврас мунтазам гузаронидани обёрӣ ва дар ҳолати нарм нигоҳ доштани хоки гирду атрофии ниҳолҳо тадбири асоси мебошад. Обёрии боғи чавони дарахтони хурмои шарқиро аз ҳар ду тарафи қатор (дар масофаи 25-30 см аз дарахтон) мегузаронанд. Аммо дар боғҳои пеш ба вучуд овардашуда чуякҳо то як метр аз дарахтон дуртар ҷой дода мешавад. То давраи ба ҳосилбанди пурра даромадани дарахтон дар давраи нашъунамои ниҳолҳо то 14-15 маротиба ва дар давраи ҳосилбанди 11-12 маротиба обёри гузаронида мешавад, Г. Т. Гутиев [35, С. 164].

Дар асоси мушоҳидаи А. Д. Микаладзе гарчанде, ки хурмои шарқӣ аз минтақаҳои намноки субтропикӣ мебошад, ба боришоти бисёр эҳтиёҷ надорад. Барои нашъунамои хуб микдори боришоти солона бояд аз 900-

1200 мм зиёд бошад. Нарм кардани беҳи дарахтон барои онҳо манфиатовар буда, лекин наздик будани обҳои зеризамини ва захҳо ба афзоиш ва нашъунамо монеъа мешаванд. Гармии ғойданок барои хурмои шарқӣ 3000-3500<sup>o</sup>C мебошад. Дар гармии 17-18<sup>o</sup>C наваҳои хурмои шарқӣ нағз инкишоф ёфта, дар 20-22<sup>o</sup>C гарми бошад ба гулшукуфи сар мекунад, А. Д. Микаладзе, [91, с. 288].

Таъмини речаи об ва ғизоии зироатҳо асос барои ташаккули ва маҳсулотнокии онҳо хизмат мекунад. Шиддати равандҳои биологӣ дар растанӣ ва ҳок меафзояд гузоштани узвиҳои тавлидкунада ғайол мешавад, сифат ва андозаи меваҳо беҳтар мешавад, устувориаташон ба касалиҳо, ҳашароти зараррасон ва пайдошавии шароити стрессӣ зиёд мешаванд, В. А. Грязев, Т.В. Тутберидзе, Т.Г. Причко, Т.Л. Троянова, [28, с. 464-467], Т.В. Тутберидзе, [160, с. 27].

Боғи хурморо баҳор пас аз тамош шудани ғасли боришот вобаста аз тип ва таркиби ҳок ҳар 10-15 рӯз як бор об мондан лозим аст (тахминан моҳи май як маротиба, июн, июл, август 3 маротиба, сентябр 2 маротиба, октябр як маротиба) Замин доимо аз алафҳои бегона тоза ва нарм бошад, О. П. Кульков, [69, с. 26-27].

Шоҳу шоҳча ва наваҳои зиёдати бо якдигар ҳалаловаро сари вақт буридан инчунин наваҳои аз ҳад зиёд рост ба боло сабзидаистодаро ба баландии 30-40 см кӯтоҳ кардан хуб аст. Дар 4-5 соли якуми ҳосилбанди ба беҳи як дарахт сола як маротиба то 300 гр азот, 200 гр фосфор 120 гр калий, ва 8-10 кг поруи органикӣ рехтан лозим аст.

Шоҳаҳо, муғчаҳо ва решаҳои гуногунсолу сифатан муҳталифӣ дарахтон, ки дар амалияи боғдорӣ, хусусан дар қорҳои селекционӣ, ҳангоми зиёд кардани ниҳолҳо ва пиростани дарахтон васеъ истифода мешаванд, яке аз хусусиятҳои биологгии дарахтони боровар мебошад, С.М. Гулов, Т. Пирзода, Ф.У. Урунов, В.Г. Силвандер, [32, с. 89-93].

Калиди ба даст овардани ҳосили баланд дар ин гуна боғҳо технологияи оқилонаи кишоварзӣ, нигоҳдории дурусти ҳок, инчунин истифодаи нуриҳо ба назар гирифтани хусусиятҳои афзоиш ва рушди

системаи реша дар тагпайвандҳои гуногун (хурмоҳои кавказӣ ва виргинӣ) мебошад. Набудани ин маълумот муайян кардани майдонҳои гизодихиро дар каторҳо ва байни дарахтон душвор мегардонад, ки ин дар вақти бунёди боғҳо ва парвариши навъҳои нав хеле муҳим аст, З.Ю. Набиева, [101, с. 24], М. Д. Омаров, М.А. Авидзба, [113, с. 29-31], М.Д. Омаров, М.А. Авидзба, [112, с. 157-163].

Бо ақидаи И.С. Леквайшвили дар дарахти хурмо решаи ташакулёфтаи боқуват инкишоф меёбад. Решаҳои дарахти хурмо дар сини 8-10 солагӣ дар заминҳои серҳосил то чуқурии 90-100 см ва решаҳои асоси бошад то чуқурии 15-40 см дар хокҳои структурашон вазнин то чуқурии 10-30 см мераванд. Дар ҳама ҳолат қутри (диаметри) паҳноии реша ба қутри шохсори дарахт баробар аст, В. А. Колесников, [64, с. 233].

Набудани решаҷаҳо дар қабати 0-20 см-и хоки хурмои шарқӣ дар тагпайванди хурмои Виргинӣ сабаби заиф будани системаи реша дар гарданаки реша мебошад. Ин раванд дар қабатҳои гуногуни хок рух медиҳад, дар муқоиса бо хурмои кавказӣ, он дар қабати 10-20 см оғоз меёбад, муҳаққиқони дигар низ ба мавҷуд будани решаҷаҳои панҷазада дар решаи хурмои кавказӣ ишора мекунанд, З.М. Гасанов, [23, с. 431], З. Ю. Набиева, [101, с. 24], С. М. Животинская, [45, с. 7-8].

Муайян карда шудааст, ки дарахтони хурмо дар сини 25-солагӣ андозаи решаҳо ба дарозии то 770 см мерасанд, вале зиёда аз 70% (қисми асосии) решаҳо дар масофаи 200-250 см мавҷуд мебошанд, А. П. Драгавцев, [41, С. 52-54].

Истифодаи заминҳои нишебӣҳо барои парвариши дарахтони мевадиханд, алалхусус хурмои шарқӣ имкон медиҳад, ки заминҳои дар шароити муқаррарӣ бесамар ба истехсолот ҷалб карда шаванд, М. Д. Омаров, [104, С. 46], [109, С. 100], [103, С. 20].

Ҳама навъҳои хурмои шарқӣ ба 3 гурӯҳ тақсим карда шуданд:

1. Танини (таннидные) ё доимӣ, ки ин гуна меваҳо тумч ҳастанд;

2. Бетанин (Бестанидные) ё ширин, ки ба меваҳои ширин мувофиқат мекунад;

3. Тағйирёбанда, ё шоколади, ки аз гардолудшавӣ вобастаги дорад (Кишти хурмо дар қаламрави СССР. Факултети зооинженерии Донишгоҳи давлатии аграрии Русия – Академияи кишоварзии Маскав. Сомонаи ғайрирасмӣ.) Номи маъмулии “Королек” асосан ба навҳои қадимии ҷопонии “Hiakume” дахл дорад.». Ба навҳои машҳури «шоколади» навӣ «Зенджи мару» дохил мешавад, Хурма королек и другие популярные сорта, Orchardo.ru, [167, с. 12].

Бедоршавии муғчаронии хурмо паст (61,71%) ва қобилияти наварони дорад, ки дар боғ он дар дарахтони аксари навҳо шохҳои урён (бараҳна бе барг) мушоҳида мешаванд. Микдори наварҳои кутоҳшуда (то 3 сантиметр) 16-19 %, наварҳои дароз 45—53% ва таносуби наварҳои нашъунамо ба шумораи формацияҳои кутоҳшуда 2,53-2,94 %-ро ташкил медиҳад. Дарозии наварҳои солана дар як дарахт 23,1 - 44,9 сантиметрро ташкил медиҳад, Т.Г. Габибов, [21, с. 26].

Мичурин исбот кард, ки ҳатто дар шароити замини серғизо ва бо намай таъмин, навҳои ба сарди устувор ба вучуд овардан мумкин аст. Имконияти васеӣ ба тартиб истифодаи речаи обро хангоми парвариши ниҳолҳо барои ба сарди тобоварӣ будан ба назар гирифтани лозим меояд, А. М. Кормилицин, [67, с. 76].

Тибқи мушоҳидаҳои И. А. Бобиев, варамкунии муғчаҳои хурмои Кавказӣ дар шароити ноҳияи Панҷ аз 5то 15 март, дар боғи ботаникии марказӣ аз 15 то 25март дар боғи қуҳии ботаникии Варзоб дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво 10-12 С° оғоз меёбад. Кушодашавии муғчаҳои хурмои Кавказӣ дар шароити ноҳияи Панҷ аз 15 то 25 март, дар боғи Ботаникии марказии шаҳри Душанбе аз 25 март то 5 апрел, дар шароити стансияи боғи ботаникии -қуҳии Варзоб (Варзобская горно-ботаническая станция) аз 1то 10 апрел ба қайд гирифта шуд. Баъд аз 5-6 рӯзи кушодашавии муғчаҳо баргҳо пайдо мешаванд. Дар шароити ноҳияи

Панҷ кушодашавии баргҳо аз 25 то 10-уми апрел, дар боғи Ботаникии марказии шаҳри Душанбе аз 5 то 20 апрел дар шароити боғи Ботаникии Варзоб аз 10 то 25 апрел мушоҳида шуда, 2-3 ҳафта пас аз кушодашавии баргҳо муғчаҳои гули пайдо мешаванд (бутоны).

Шумораи рӯзҳо аз варамкунии муғча то гулшукуфӣ ба ҳисоби миёна 45-50, аммо ҳарорати гармии ғойданок дар ин давра 750-850°C ташкил медиҳад. Давраи пухтарасии мева дар шароити ноҳияи Панҷ аз 15 октябр то 10 ноябр, дар боғи марказии ш. Душанбе аз 25 октябр то 15 ноябр дар шароити стансияи кӯҳии боғи ботаникии – Варзоб аз 1 то 20 ноябр идома меёбад. Дарозии навдаҳои яксолаи хурмо 55-85 см ташкил медиҳад. Дар давраи шаклгирии ва ғунчабандии мева ҳарорати ҳаво то 30 °C мерасад, И. А. Бобиев, [9, с. 8-10].

Дарахтони хурмои шарқӣ дар моҳҳои май-июн, баъзан дар моҳи июл гул мекунанд ва вобаста ба шароити обу ҳаво 1-1,5 моҳ давом мекунад. Давомнокии гули моддина 3-4 рӯз ва гули нарина 12 рӯз аст.

Дар давраи нашъунамои ғайри мева тағйироти шадиди намии хок ва ҳаво боиси рехтани меваҳои сабз, пеш аз ҳама меваҳои бе бордоршуда (партенокарпӣ) мегардад, E. Badal, El. Abd, T.A. Mageed, I. Buesa D. Guerra, L. Bonet, D.S Intrigliolo, [179, с. 154-160].

Растаниҳои хурмо бо ташаккули аксари потенциали фотосинтетикӣ дар ибтидои афзоиш хос аст, худтанзимкунии нашъунамои навдаҳо, ташаккули мева ва мувозинатии муносибатҳои донорӣ-аксептори узвҳои растанӣ ва тавлидӣ дар раванди истеҳсолот, С.М. Гулов, [31, с. 27].

Хусусияти хоси хурмо, ки ба шароити мавсими кишт вобаста нест, мавҷудияти ду давраи баръало рехтани тухмдонҳо мебошад. Рехтани махсусан пурқуввати узвҳои генеративӣ, ки ҳосилнокии хурморо муайян мекунад, феврал пас аз гулкунӣ ба амал меояд. Якчанд сабабҳо вучуд дошта метавонанд: бордоркунии нодуруст, ҷараёни нокифояи моддаҳои пластикӣ ба узвҳои мевадиханда, шароити номусоиди обу ҳаво ҳангоми гул, мавҷудияти бемориҳо ва ҳашароти зараррасон, набудани намӣ. Дар

давраи дуҷуми нашъунамо, рехтани меваҳо камтар мегардад. Дар хушксоли, рехтани мева дар давраи ташакулёби (сентябр) ба назар мерасад. Яке аз омилҳое, ки ба ҳосилнокии растаниҳо таъсир мерасонанд, таъмини намнокӣ мебошад, бинобар ин дар Крим, ки дар он ҷо нарасидани оби ползӣ ба таври доими мавҷуд аст, объёри яке аз тадбирҳои асосии нигоҳубини растаниҳо мебошад, E. Badal, I. Bues, D Guerra, L Bonet, P Ferrer, D.S. Intrigliolo, [180, с. 143-147], D. S. Intrigliolo, J.R.Castel, [187, с. 173-180].

Нишондиҳандаҳои намии хок, ки ба растанӣ дастрас аст ва параметрҳои муҳити зист онҳоро ҳамчун нишондиҳандаи обёрии вокуниш (реакция)-и зироат ба об таъмин кардан мумкин аст. Речаҳои идоракунии объёри ва равандҳои физиологие, ки маҳсулнокии баланди дарахти хурморо таъмин мекунанд, бо истифода аз методология ва асбобҳои фитомониторинг имконпазир аст, О. А. Ильницкий, В. А. Ушкаренко, М. И. Федорчук, С.С. Радченко, С.В. Бондарчук, [59, с.124]. Нишондодҳои ҳарорати баргҳо ва фарқияти ҳарорати ҳаво ва баргҳо бо транспиратсияи баргҳо ва речаи об алоқаманданд В.С. Семин, О. А. Ильницкий, [153, с. 308-311].

Маълум аст, ки дар сурати набудани намии хок тағйирёбии баръакси суръати нисбии ҷараёни ксилема дар нажда ва тағйирёбии радиалии ҳаҷми он ба камшавии фазавии онҳо тағйир меёбад, О. А. Ильницкий, Н. Ф. Бойко, М. И. Федорчук ва дигарон, [57, с. 345].

Нашъунамои наждаҳои хурмо моҳи апрел оғоз ёфта ва то оғози гулшукуфӣ қатъ мегардад, А. А. Ядров, Л.Т Синко, А. Н. Казас, В. А. Шолохова, [176, С. 16-19].

Дар бисёр навҳо нашъунамои дуҷумдараҷаи наждаҳои инфиродӣ дар охири моҳи июн - аввали июл оғоз ёфта, дар моҳи август ё сентябр ба охир мерасад, А. К. Пасенков, [125, с. 5-9].

Наждаҳое, ки то зимистон пухта намерасанд дар натиҷа наждаҳои заиф ба вуҷуд меоянд, ки баъдан боиси паст шудани сифати мева мегардад. Навдаҳои хурмо, ки нашъунамояшон барвақт анҷом меёбад,

қобилияти тавлиди мучаҳои гулиро доранд, назар ба он наваҳое, ки нашъунамояшон дер ба анҷом мерасад, A. D. Mowat, A. P. George, R. J. Collins, [190, с. 141-149].

Кушодашавии муғчаҳои дарахтони хурмои шарқӣ аз гарму хунук омадани зимистон вобаста мебошад, агар ҳарорати миёнаи зимистон ба 7° дараҷа гарми расад ва 5-рӯз пеш аз кушодашавӣ 14-16° С гарм шавад, дар ин ҳолат аз давраи охири ҳазонрез то муғчашукуфи, муғчаҳо дар 106-108 рӯз кушода мешаванд. Агар ҳарорати миёнаи зимистон 4-5° ё 7,5-8,8° гарми расад дар ин ҳолат муғчаҳо дар мудати 136-147 рӯз кушода мешаванд, С. М. Животинская, [46, с. 7-8]. Чуноне ки маълум аст, ҳосили баланди хурмои шарқиро дар ҳолати дарозии наваҳо ба 30-40 см будан интизор шудан мумкин аст. Ҳамин гуна талабот дар ҳолати нақшаи шинонидани дарахтон ба 7x5 ва 8x6, 7x4 ба даст оварда мешавад. Ҳамин тариқ нашъунамои дарахтон дар давраи таҳқиқотҳо ба нақшаи 7x4, 7x5, 8x6 м шинонидан натиҷаҳои хуб медиҳад, А. С. Кутузова, [75, с. 88].

Дарахти хурмо дар наваҳои сабзидаи яксолаи соли равон ташакул ёфта ҳосил медиҳанд. Шумора ва афзоиши наваҳои яксолаи сабзида аз ҳосилнокӣ гувоҳӣ медиҳанд, С. М. Животинская, О.П. Кулков, [46, с. 88].

Наваҳои хурмо қобилияти баланди обнигоҳдори дар фасли зимистон доранд 83-95 % обро дар мудати шабонарӯзи нигоҳ медоранд, ки хориҷшавӣ 5-17 % ташкил медиҳад. Тобистон бошад хело паст - 40 % аст. Қобилияти баланди обнигоҳдорӣ яке аз омилҳои мусоидкунанда барои зимистонгузаронӣ мебошад, С. Товкач, [159, с. 151].

Дар хурмои шарқӣ ду давраи инкишофи наваҳо вучуд дорад 1-ум баҳорӣ аз моҳи март- апрел давомнокиаш 25-30 рӯз мебошад, пеш аз гулкуни инкишофи наваҳо 1-2 моҳ қатъ мегардад, баъд инкишофи дуюми наваҳо сар шуда 30-50 рӯз давом мекунад, П. М. Бушин, К. В. Васильев [14, с. 114].

Калиди ҳосили баланди хурмо ин нашъунамои хуби наваҳои солона мебошад, ки дар навабати худ аз таъмини дарахтон бо маводи ғизой, об ва буриш вобаста аст.

Ташакулёбии ниҳоии мева ба афзоиши диаметри навдаҳо вобастаги дорад. Дар айни замон, баръало, навдаи нашвии солона пеш аз гул ба вуҷуд меояд. Дар охири зимистон, мугчаҳо шакли конусиро мегиранд. Ин навдаҳо (монанди навдаи ангур) дорои тамоми маълумот барои шоҳаи оянда бо баргҳо ва гулҳо мебошанд. Дар аввали баҳор ташаккул ва инкишофи гули дар паҳлуи баргҳои ҷавон пайдо мешаванд, [195, с. 16],

Гулҳо дар баҳори соли оянда танҳо аз навдаи хуб афзоишёфта, ки дар охир ва миёнаи навдаи оянда пайдо мешаванд. Натиҷаҳо дар рафти тадқиқот ба даст овардашуда имкон медиҳанд, ки моделҳои математикии робитаи байни хусусиятҳои экофизиологии растани ва омилҳои муҳити зист сохта шаванд ва ин равандҳо пешгуи карда шаванд, О. А. Ильницкий, Н. Ф. Бойко, М.И. Федорчук ва дигарон, [57, с. 345].

Хурмо растании духонаги ва якхонаги (дучинса) мебошад. Баъзе навъҳо танҳо гулҳои модина, дар дигар навъҳо танҳо гулҳои нарина дида мешавад ва танҳо баъзе навъҳо, ки дар як дарахт ҳам гулҳои нарина ва ҳам модина ҷойгир мешавад, Т. Akagi, К. Kajita, Т. Kibe, Н. Morimura, Т. Tsujimoto, S. Nishiyama, Т. Kawai, Н. Yamane, R. Tao, [178, с. 214-221].

Нашъунамои навдаҳо дар моҳи апрел оғоз ёфта, то давраи гули оммавӣ қатъ мешавад. Гулкунӣ дар моҳҳои май-июн оғоз ёфта, вобаста ба шароити обу ҳаво 1-1,5 моҳ давом мекунад. Дар баъзе навъҳо дар охири моҳи июн - аввали июл нашъунамои дуҷуми навдаҳои алоҳида оғоз ёфта, дар моҳи август ба охир мерасад, А. А. Ядров, Л.Т. Синко, А.Н. Казас, [176, с. 16-19]. Барои гирифтани ҳосили баланд ва меваи хушсифат барои аксари навъҳои хурмои шарқӣ гардолудкунандаро талаб мекунад. Аммо навъҳое ҳастанд, ки бе бордоршавӣ меваҳои хушсифат медиҳанд, М. Д. Омаров, Р. В. Кулян, З. М. Омарова, [102, с. 25-29], А. В. Рындин, Н. Г. Загиров, Н. А. Иброгимов, [142, с. 116-120]

Навдаҳои дарахти хурмо, новобаста аз навъ, аз рӯи андозаи худ ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: заиф - аз 0 то 10 см, миёна - аз 10 то 30 см ва

қавӣ - аз 30 см боло дар давраи ҳосилбандӣ ва нашъунамои дарахтони шохсори навъҳои Хнакуме ва Зенджи мару, ки бе буриш, якбора зиёд шуда (зиёда аз 80 фоиз) шумораи навдаҳои хеле кутох (0-10 см) бемахсул мушоҳида карда мешавад. Навдаҳои заифи даруни шохсор хушк шуда, ҳосил бештар дар навдаҳои канори яъне беруна мушоҳида мешавад, Б. Л. Массовер, [85, С. 28].

Хурмои шарқӣ, ба монанди дарахтони қадпаст ва миёнақадӣ дарахтони себ, ба ҳосилнокӣ барвақт оғоз мекунад ба ин монанд дар шароити Доғистони ҷанубӣ, аллакай дар соли дуюм ё сеюм пас аз шинондан дар боғ мева медиҳад.

Хурмои шарқӣ, растании дарозумр буда, давомнокии ҳосилдеҳии он то 100-150 сол давом мекунад. Дар ватани хурмои шарқӣ Хитой, дар минтақаи шимолу ғарбии Пекин дарахтони патриархӣ то 400—500 сола мавҷуд мебошад. Дар соҳили ҷанубии Қрим (ГНБС, деҳаи Никита) дарахтони хурмои шарқӣ (навъи Костата) мунтазам мева медиҳанд, ки тақрибан садсола ҳастанд. Баландии дарахти хурмои шарқӣ 10-12 м мерасад, навъҳои суст афзоишёбанда бошад тақрибан 3 метрро ташкил медиҳад, Реферат, [134, с. 26].

Миқдор ва сифати ғардҳои як навъ аз ҳолати дарахт вобаста аст ва сол то сол фарқ мекунад. Баъди соли серҳосил шумораи гулҳои на танҳо модина, балки гулҳои нарина низ кам мушоҳида мешавад. Ғардҳо дар аввали гулкунӣ фаъолтар мебошанд. Барои таъмин намудани ғардолудкуни хушсифат тавсия дода мешавад, ки дар боғҳои саноатӣ якчанд навъҳои хурмои шарқии ғардолудкунандаҳо шинонда шаванд, О. П. Кулков, [70, с. 26-27].

Интихоби нақшаи бунёди боғҳои хурмои шарқӣ аз соли 1989 бо вариантҳои зерини 6x5, 6x4 ва 6x3 м тадқиқотҳо гузаронида шуд, бинобар ин дар варианти 6x3 м афзоиши яқсола. навда 19 см, 6x4, 22 см ва 6x5 м -27 см буд. Ҳамин тариқ, мо гуфта метавонем, ки ҳосилнокӣ дар варианти 1-ум назар ба дигар вариантҳо барвақтар сар мешавад. Сабаб

он аст, ки ҳосили асоси (70—80 фоиз) дар навдаҳои аз 10 то 25 сантиметр, зиёда аз 25 сантиметр ҳамаги 20—30 фоиз ҳосил дида мешавад. Ин хусусияти биологии навҳои хурмо мебошад, М. Д. Омаров [96, с. 132].

Дар солҳои якӯм дарахтони хурмои шарқиро бисёр буридани шоҳу навдаҳо мумкин нест, зеро дар ин маврид навдаҳо хело калон шуда, ҳосилбанди кашол меёбад.

Навҳои дурнамои дар ҷумҳуриҳои Осиёи миёна, навҳои рушноӣ ва намидустдори дучинсаи ба хунокии то 20 °С тобовар буда, дар заминҳои шӯр ва оби зеризаминиаш наздик намеруяд. Дар 2-3 солагишон ба ҳосил даромада, дар 7-10 солаги ба ҳосилдиҳии пура мебароянд. Ҳосилнокиашон дар ин давра ба 150-250 с/га мерасад, Б.Л. Массовер, Ж. А. Леванов, [89, С. 26].

Нисбати дигар дарахтони субтропикӣ аз он ҷумла хурмои шарқӣ анор ба гармии ҳаво ва шурии хок устувортар аст. Дар таркиби хокҳои дорои таносуби 0,5 г бар 1 кг ин растани хеле хуб месабзад, ба намуди хок он қадар талаботи зиёд надорад, Х. Н. Назиров, Н. Камолов, М. Мамадалиева, [102, с. 14-18].

Хурмои шарқӣ дарахти мевадиҳандаи ҳазонрезии субтропикӣ буда, машҳур бо номи шарқӣ, хурмои субтропикӣ, японӣ, ё персимон ба авлоди *Diospyros* ва оилаи эбиновӣ дохил мешавад, ба ин оила 5 авлод 320 намуд дар мамлакатҳо тропикӣ месабзад. Аз нигоҳи олимони ба ин авлод шумораи гуногуни намудҳо дохил аст. Аз он ҷумла Г.Т. Гутиев ба авлоди *Diospyros* 190 намуд, В. И. Запрыгаева 200 намуд, Б. С. Розанов 190 намуд, Гулов М.С. 290 намуд, А. П. Драгавцев барои давлати Чин 30 намудро нишон додаанд. Як қисми онҳоро дарахтони мевадиҳанда ташкил дода қисми дигарашро бошад бо номи дарахти эбиновӣ барои чуби қиматаш истифода мебаранд, Г.Т. Гутиев, [35, с. 164]. В. И. Запрыгаева, [54, с. 32-34]. Б. С. Розанов [137, с. 155], М. С. Гулов, [29, с. 13]. А. П. Драгавцев, [41, с. 52-54].

Хурмои шарқӣ меваи суптропикӣ буда, бо меваҳои калон-калони норинҷи ниҳоят зебои худ, ки таркиби мевааш бомаза аст диқати

инсонро ба худ ҷалб менамояд. Дарахташ хазонрез буда, қадаш 5-8м баланд, баъзан аз ин ҳам баландтар мешавад. Гули хурмо се намуд мешавад; нарина, модина ва дучинса. Гулҳои наринаю дучинса гӯруҳ-гӯруҳ ҷой гирифта, нисбат ба гули модина майдатар мебошанд. Гулҳои модина тоқа ҷой гирифтанд.

Навъҳои дар Тоҷикистон ноҳиябандишуда Хиакуме, Гошо-гаки ва Зенджи мару мебошад, ки навъи худгардолудкунандаи Зенджи-мару барои гардолудкунии дигар навъҳо лозим аст. Дар водиҳо дар баъзе ноҳияҳое, ки ҳарорати ҳаво ба хунокии  $-18-20^{\circ}\text{C}$  мерасад ин навъҳо ба хуноки тоб намеоранд. Бо ҳамин хотир ин навъҳоро дар нишебҳои аз шамол паноҳ ва аз хунокиҳои саҳт эмин шинонидан лозим аст, Госагропром Таджикский ССР, [27, с. 3].

Дар Тоҷикистони марказӣ аз варамкунии муғча то пухта расидани мева дар ҳолати гармии умуми фаъол  $4000-43000^{\circ}$  будан  $190-200$  рӯзро дар бар мегирад. Ҳамин тариқ аз давраи гулкунӣ то давраи пухтарасии мева дар ҳолати гармии умумии фойданок  $3200-3500^{\circ}$  будан, ба  $130-160$  рӯз мерасад. Дар даҳаи 2-юми моҳи октябр меваҳо пура пухта мерасанд. А. Г. Минков [92, с. 80].

Давраи оромии дарахти хурмо дуру дароз аст, бинобар ин ба хунокии дарозмуддати  $8-10^{\circ}\text{C}$  ва сармои кӯтоҳмуддати  $18-20^{\circ}\text{C}$  низ тобовар аст. Бинобар дер гул карданаи хунокиҳои охири баҳор ба хурмо зарар намерасонанд.

Касалиҳои хурмои шарқӣ дар иқлими намноки иттиҳоди Шӯрови 20-намуд ба қайд гирифта шудааст, яке аз ин намуди касалиҳо фомопсис *phomopsis diospyri* ва саратони хурмо, аз касалиҳои паҳнғашта ва зараровар мебошанд, Н. Б. Дзимистаришвили, [39, с. 172-1173].

Дар шароити Тоҷикистон бедоршавии дарахти хурмои шарқӣ дар моҳи март рост меояд. Хурмои шарқӣ растании гармидуст буда, варамкунии муғчаҳои он дар ҳарорати ба ҳисоби миёна  $+10^{\circ}\text{C}$  оғоз мегардад, Б. С. Розанов, В. Л. Данилов, С.Т. Скороход, [137, с. 155].

Қанднокии таркиби меваҳои хурмо бениҳоят зиёд аст. Дар меваҳои тару тоза 25% ва дар хушкаш 82 % қанд мавҷуд буда, кислота бошад дар таркибашон кам 0,05-0,20 %-ро ташкил медиҳад Б.С. Розанов, У.Э. Эшонкулов, [140, с. 109].

Меваҳои нопухтаи хурмо, аз моддаҳои даббоғӣ (танин 17-21,3 %) бой аст. Меваҳои нопухтаи навъи Хиакуме дар таркибаш 25,5 % моддаҳои дабоғӣ дорад. Бо мурури пухта расидани меваҳо модаҳои дабоғи оҳиста – оҳиста кам мешавад, дар баъзе навъҳо ин ҳолат тезтар мегузарад назар ба навъҳои тумч, В. Т. Гогия, [26, с. 158-159].

Нигоҳдории меваҳои хурмои шарқӣ дар ҳароратҳои гуногун ( $t = +2^{\circ}\text{C}$ ,  $+4^{\circ}\text{C}$ ,  $+6^{\circ}\text{C}$ ) гузаронида шуд, ки беҳтарин нигоҳ доштани сифатҳои тиҷоратии мева дар ҳарорати  $+4^{\circ}\text{C}$  ба қайд гирифта шудааст, А. С. Рябова, [146, с. 50-52].

#### **1.4. Аҳамияти хоҷагии хурмои шарқӣ ва минтақаҳои парвариши он дар Тоҷикистон.**

Аҳамияти ғизои ва табобатии маҳсулотҳои зироатҳои кишоварзиро, аз он ҷумла хурмои шарқиро таркиби химиявии онҳо муайян мекунад.

Аз руи маълумотҳои В. А. Тутелян, [159, с. 6-8], дар ғизоии аҳолии кишварҳои пешрафта норасоии моддаҳои фаъоли биологӣ вучуд дорад. Ҳамин тариқ, дар ғизои инсон то 25% аминокислатаҳои пурра, то 40% нахи парҳезӣ то 50,0% - витамини С то 30% витаминҳои А ва гурӯҳи В намерасанд, дар ҳоле ки аксарияти аҳоли ба кадри кофӣ маъданҳои минералӣ – калсий, оҳан, йод ва ғайраро намегиранд.

Хурмои шарқӣ ба ғайр аз витамину минералҳо бой буданаш (калсий, калий, оҳан, фосфор, марганетс, магний, йод, мис, витаминҳои С, РР, Е, А хурмо антиоксиданти аълои табиӣ буда, муҳофизати баданро зиёд мекунад, хатарри пайдошавии ҳуҷайраҳои саратонро кам мекунад, дар табобати диабет қанд, дилу рағҳо, касалиҳои онкологӣ, пӯст ва дигар бемориҳои вазнин самарай хуб медиҳад, *M.S Butt, M.T. Sultan, M Aziz*, [181, с. 542-561].

Меваҳои хурмои шарқӣ аз қанд (то 25,9%) бой мебошанд, ки асосан аз глюкоза ва фруктоза иборатанд. Дар меваи хушк микдори қанд ба 62—85 % мерасад. Дар меваҳои хурмо 25 макро- ва микроэлементҳои муайян карда шудаанд, ки 9-тои онҳо барои бадани инсон заруранд. Микроэлементҳои мис, рух, марганес, молибден, ки дар мева мавҷуданд, як қисми ферментҳо ва гормонҳо мебошанд М. Д. Омаров, [122, с. 162], М. Д. Омаров, З. М. Омарова, [118, с. 49-53].

Меваи хурмои шарқӣ, бо тамоми хусусиятҳои худ: андоза, шакл, ранги пӯст, концентратӣ ва ранги селлюлоза хеле тағйирёбанда аст. Вазни мевааш вобаста ба навъҳои аз 50 то 300 грамм аст, меваҳои хурмо болаззат ва серғизо мебошанд. Ҳангоми тару тоза, онҳо аз 13 то 25,9% қанд, асосан глюкоза ва фруктоза дар таркибаш мебошад, А. А. Ядров, Л.Т. Синко, А. Н. Казас, В. А. Шолохова, [176, с. 16-19].

Дар тибби халқии муосир меваҳои хурмо ро ҳамчун воситаи балғампартоӣ, барои бемориҳои гадуи сипаршакл беҳтар намудани кори узвҳои меъдаю рӯда истифода мебаранд. Селлюлозаи аз меваҳои хурмои пухташуда захираҳои узвҳои берунаро шифо мебахшад. Меваи нопухта, яъне тумч бар зидди исҳол истифода бурда мешавад, П. А. Къиосев, [77, с. 56-57].

Дар тибби халқии тоҷик ҳокаи хурмои шарқиро дар шакли хокаи ҳамчун маҳсулоти косметикӣ тоза намудани доғҳои пӯсти рӯй ва шарбати моеъи меваҳои онро хурмо-душобро барои камхунӣ ва заифшавии бадан ҳамчун доруи руҳафзо истифода мекунанд 5 г. барги меваи хурмои шарқиро дар 300 мл об ҷӯшонид, истеъмол мекунанд, И. Д. Кароматов, [62, с. 62-64].

Аз шарбати ангуру тут ва хурмои шарқӣ дар Тоҷикистон малҳами «Рухмин» тайёр карда мешавад, ки хосиятҳои мутобиқшавӣ, гепатопротекторӣ дорад, Д.Т. Петенг де Вогренанд де Кугнак, М. Қ. Қурбонов, А. А. Саидов Ҳ. Ш. Ҷӯраев ва дигарон, [127, с. 54-57].

Истеъмоли меваи хурмои шарқӣ барои норасоии йод дар организм хеле муфид аст. Ҳолатҳои пайдоиши фитобезоарҳо бо истеъмоли дарозмуддати меваҳои хурмо, махсусан дар кӯдакон тавсия шудаанд, В. Г. Лалетин, С. Я. Аржанов, [76, с. 32-33], Ю. Ю. Соколов [157, с. 60-64]. М. И. Давидов, Е. В. Владимирский ва дигарон [37, с. 21-25].

Аз сабаби таркиби он, ки аз микроэлементҳо ва моддаҳои фаъоли биологӣ бой аст, меваҳои хурмо ҳамчун ғизои функционалӣ тавсия карда мешаванд, О. Дзюндзя, [40, с. 65-70].

Дарахти хурмо бисёр қиматбаҳо буда, онро дар соҳаи боғдорӣ, мустаҳкамкунии соҳилҳо, ва сабзу хурам гардониӣ шаҳру маҳалаҳо истифода карда мешавад. Дар боғдорӣ дарахти хурморо (хурмои кавказӣ) ҳамчун тағпайванди ба сармо устуворӣ хурмои шарқӣ ва барои соҳил мустаҳкамкуни дар доманакухҳо низ истифода бурда мешавад, В.И. Запрягаева [52, с. 16-18].

Меваҳои хурмои шарқӣ дар ҳолати хом, хӯшк ва консервашуда истифода бурда мешаванд. Аз онҳо спирти баланд сифат, ликёр тайёр мекунанд. Пустлох, боқимондаҳои чуб, меваҳои нопухта ва ғайраҳо ҳамчун маводҳои рангкунанда истифода шуда, дар истеҳсолот барои тайёр кардани лак ва рангҳо истифода карда мешаванд, Л. Н. Ласареишвили. [79, с. 63].

Дар таркиби меваи хушки хурмо, ки мазааш ба анҷири хушк монанд аст 62% қанд, (13,58% глюкоза ва 48,42% фруктоза) мавҷуд аст. Дар ҳолати хушк будан, ҳама навъҳои хурмо тумчи онҳо гум мешавад ва барои тайёр кардани маҳсулотҳои қанноди, афшура ва мураббо истифода мешавад, Г. Шлыкова, [172, с. 67].

### 1.5 Селексияи хурмо

Тадқиқоти аввалини омӯзиши селексионии навъҳои хурмои шарқиро дар ҳудуди станцияи таҷрибавии хоҷагии қишлоқи Сухуми Гурҷистон дар солҳои 1924—1925 оғоз намуда буданд. Тадқиқоти дуумро дар соли 1928 А. Я. Зарецкий, баъд дар соли 1932 В. И. Гаркунова гузаронданд, А. Я. Заретский, [55, с. 93-106]. В. В. Маркович,

16 навъи хурморо Ликоперсикум, Костата, Эмон, Окама, Нитари, Цуру, Цуруноко, Миотан, Триумф, Мару, Гошо, Тапенаши, Зенджи мару, Хачиа, Хиакуме ва Охиро-каки-ро омӯхтааст.

Тасаввуроти маъмул дар бораи он, ки навъи хурмои Шарон гибриди дарахти себ ва хурмои шарқӣ мебошад, асос надоранд. Ин як навъи доимии ширини хурмои шарқӣ мебошад, ки дар Исроил парвариш карда мешавад. Меваи навъи Шарони хурмои шарқӣ тухмҳо надорад ва таъми ҳалим дорад, зеро он қариб аз танинҳо маҳрум аст, BerkeleyWellness.com. UC Berkeley, [182, с. 3-4].

Кори тадқиқоти илмиро бо селекцияи хурмои шарқӣ дар станцияи таҷрибавии Сочи соли 1933 баъди ташкили сектори селекция ва навъшиносии Э. Гусева ба роҳ монд тадқиқотро Л. Н. Черняева, ки навъҳои Костата ва Таненаширо аз навъҳои тавсияшуда барои дар истеҳсолот ҷорӣ кардан баровардааст давом дод. Ф.М. Зорин [1939] дар майдони 0,5 гектар боги коллексионии 23 навъу намунаро ташкил кард. Дар айни замон се намуди хурмо дар субтропикҳои Абхазия ва ҷануби Русия маъмул аст - ҷопонӣ ё шарқӣ (*Diospyros kaki* L.), қафқозӣ (*Diospyros lotus* L.) ва Виргинӣ (*Diospyros virginiana* L.), В. Л. Витковский, [15, с. 42], [16, с. 403].

Муайян кардани манбаъҳои хусусиятҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ арзишнок имкон медиҳад, ки навъу намунаҳои ояндадор интихоб карда шаванд. Интихоби навъҳои хурмои шарқӣ ба маҷмӯи хусусиятҳои муҳим, аз қабилҳои устуворӣ ба сармо, хушкӣ, кам будани миқдори танин ва ҳосилнокӣ мувофиқ бошанд, М. Д. Омаров, Р. В. Кулян, [116, с. 23-26]., М.Д. Омаров Р. В. Кулян, [115, с. 42-46].

Ташкили коллексияҳо воситаи ҳифзи гуногунии генетикӣ мебошад. Р. Ш. Заремук, Е. М. Алехина, С. В. Богатырева, Ю. А. Доля [54, с. 32-42], ва зиёд намудани шаклҳои намунаҳо тавассути корҳои селекционӣ З. М. Омарова, [119, с. 69-72]., М. Д. Омаров, Р. В. Кулян, З. М. Омарова [117, с. 18-20], дар заминаи онҳо барои ба вучуд овардани генотипҳои

байнинаслӣ, байнинамудҳои дорои селекцияи мураккаб ва дорои хусусиятҳои мусбӣ, гузаронидани корҳои тадқиқотӣ оид ба барқарор намудани хусусиятҳои филогенетикӣ Р. В. Кулян [72, с. 71-74], инчунин омӯзиши навъҳо бо мақсади беҳтарин навъҳои ояндадорӣ истеҳсолиро интихоб кардан, Н. В. Можар, [93, с. 55-61], Р. В. Кулян, [74, с. 110-118].

Қобилияти ғаъол будани гардҳои гарддон аз рӯи усули З. П. Паушева, [126, с. 304]. Баъзе дарахтони мевадор гардолудкунии дастиро талаб мекунанд, ки дар он ҷо гардолудкунандагони ғайриҳашарот дастрас нестанд, барои санҷидани он, ки гардолудшаванда ба гардолудкунии омода аст, шумо бояд ангуштони худро болои гардҳо гузоред. Агар он тайёр бошад, дар нуги ангуштон донаҳои зард боқӣ мемонад. Вақти муътадил барои гардолудкунии пагоҳирӯзи пас аз ду-се рӯзи ҳавои хушк ва гарм аст. Бо истифода аз резинкаи нарм, бояд бодикқат гардро аз гардбарг ба стигмаи тухмдон интиқол диҳед, Х. Бейкер., [5, с. 95].

Хурмои мексикой барои ба вучуд овардани навъҳои нав нақши бориз мебозад, зеро он ҳосили хуб ва таъми баланд дорад, В. И. Гаркунова, [22, с. 26].

Раванди интиҳоби навъҳо пайвастагӣ дорад бо усулҳои он ва пайваста такмил меёбанд. Сарфи назар аз усулҳои сершумори селекция, дурагакунии ва селекцияи клоналӣ усулҳои асосӣ боқӣ мемонанд. Ба вучуд овардани шаклҳои нав, дурагакунии байнинавъҳо ва байнинамудҳо васеъ истифода мешавад, А. В. Рындин, В. С. Мохно, [145, с. 140-149].

Ба раванди селекция дохил намудани намуди дигари хурмо *virginiana* D. Lotis имкон медиҳад, ки навъҳои гуногуни ниҳолҳо ба даст оварда шаванд, зеро ҳешовандон интиқолдиҳандаи генҳои ояндадор мебошанд, ки муҳимтарин аломатҳои иқтисодӣ ва биологиро доранд, М. Д. Омаров [108, с. 26-27].

Дар дурагакунӣ вазифаи асосиро гардҳои шаклҳои падарӣ мебозад, чунки ин ба ҳамвор будани сохти морфологии он ва шароити обу ҳаво дар давраи гулкунӣ алоқамандии зич дорад, Р. В. Кулян, Н. С. Киселева, [74, с. 110-118].

Дар селекцияи хурмои шарқӣ бисёр институтҳои илмӣ ҷалб карда шудаанд. Дар боғи ботаникии Никитский бисёр гибридҳо ба даст оварда шуданд, ки бисёре аз онҳо навъ қабул шуданд: Россиянка, Спутник, Мечта, Находка, Ялтинская. Дар станцияи таҷрибавии Ўзбекистони Ҷанубӣ навъи ширини Деҳнавӣ ба вуҷуд овардаанд. Кормандони илмии Институти илмӣ-тадқиқоти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ АИКТ намунаҳои «Вахш», «Шарқӣ» «Тоҷикӣ», «Ҳисорӣ» «Шоҳона» ва «Ваҳдат»-ро. ба даст оварданд: Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ корҳои селекционӣ оид ба хурмои шарқӣ дар ВНИИТСИК (Сочи) гузаронида шуд. Дар Федератсияи Русия ҳозира Институти мевапарварӣ дорои коллексияи асоси мебошад, ки дар он зиёда аз 20 навъ мавҷуд аст, М. Д. Омаров, З. М. Омарова, [119, с. 69-72].

Раванди парвариши хурмои шарқӣ аз он сабаб душвор аст, ки аксари навъҳое, ки хусусиятҳои муҳими иқтисодӣ доранд, гарди онҳо он қадар ғаёл нест, бинобар ин онҳоро танҳо дар гибридизатсия ҳамчун шакли ибтидоии модарӣ истифода бурдан мумкин аст. Маҷмӯи навъҳое, ки гардолудшавии қобили ҳаёт доранд, дар минтақаи мо маҳдуданд ва бо навъҳои 'Zenji-Maru', 'Geili', 'Tiui' муаррифӣ шудаанд, М.Д. Омаров, Р. В Кулян, [116, с. 23-26].

Объектҳои тадқиқот коллексияи навъҳои хурмои шарқӣ, намуд *D. virginiana* L. Интиҳоби шаклҳои ибтидоии хурмо мувофиқи дастурҳои методи ВИР «Омӯзиши ҷамъоварии зироатҳои мевагии субтропикӣ», Дастурҳои методи VIR. Ленинград-1989, инчунин «Барномаҳои Маркази Кавкази Шимолӣ оид ба селекцияи меваю буттамева, гул, дарахтони ороишӣ ва ангур барои давраи то соли 2030». Қобилияти

фаъолнокии ҳайёти гардҳо бо усули З. П. Паушева, Д. А. Транковский, [126, с. 304].

Дар натиҷаи дурагакунии байни навъҳо ва намудҳо коллексияи 35 бех ниҳоли дурагаҳои гуногун ояндадор ба вучуд оварда шуд. Ду шакл аз санчиши давлатии навъсанчи гузаштанд. гибриди байнинамуди № 99 ('Miader') коди «МВГ Омарова», гибриди № 39 (аз гардолудкунии озод) коди «Зухра». Навъи ватании «Хостинский» (муаллиф Омаров) таҳия шудааст, М. Д Омаров, [122, с. 56-59].

Истифодаи намуди ёбои хурмои Виргинӣ (*D. virginiana*) дар дурагакунии имконият медиҳад намудҳои хурмои шарқӣ нисбатан устуворӣ ба стресс биотикӣ (унсурҳои зиндаи экосистема ба ҳамдигар таъсир мерасонад) ва абиотикӣ (омилҳои унсурҳои ғайризиндаи муҳити зист, ки ба организмҳо таъсир мерасонад) ба даст оварда шавад, М. Д. Омаров, Р. В. Кулян, [124, с. 120-124].

Кормандони Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ Б. С. Розанов, Н. Г. Ширяева навъҳои Вахш, Восток ва «Денаусский сахарный»-ро ба даст оварданд, М. Д. Омаров, Р. В Кулян, [124, с. 120-124].

Ба ақидаи П.М. Жуковского [1964] хурмои шарқӣ ин дурагаи мурракаби байни намудҳо дар натиҷаи дурагашавии табиӣ хурмоҳои ёбои дар Хитой *D. kak iL.*, *D. lotis L.*, *D.*, *sinensis L.*, пайдо шудааст. Хурмои ёбоии дар Хитой дар баландии аз сатҳи баҳр 900-1200 м меруяд, О. П. Кулков, [70, с. 26-27].

Корҳои селекционӣ оид ба интихоби бехтарин дурагаҳои, ки аз гардолудкунии озоди навъҳои гуногуни селексияи хориҷӣ ва дохилии хурмои шарқӣ ба даст оварда шудаанд, инчунин селекционерони Осиёи Миёна Б.С. Розанов, Н. Ширяева, Б.Л. Массовер дар байни ниҳолҳои дурагаҳои интихобкардаи онҳо навъҳои «Тоҷикӣ», «Хисор», «Шарқӣ», «Вахш» ва «Денаусский сахарный» бештар таввачуҳ доранд, М. Д. Омаров, Р.В. Кулян, З.М. Омарова, [121, с. 30-33].

Чуноне, ки Б.Л. Массовер қайд мекунад, дар солҳои 80-уми асри гузашта коллексияҳои навромузи хурмои шарқӣ дар Тоҷикистон, дар ҷануби ҷумҳурӣ, стансияҳои зироатҳои субтропики водии Вахш, дар қисми марказӣ собиқ НИИ (боғи ботаникӣ) ва дар қитъаи навросанҷии Ҳисор мавҷуд буданд, Б. Л. Массовер, [84, с. 7-8].

Афзоиши навро ин раванди пайдошавии фардҳои навро аз ҳуҷайраҳои соматикӣ, пӯст ва узвҳои растаниҳои модарӣ аст. Ин дар соҳаи мевапарварӣ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд, зеро аломатҳои растании афзоишдиҳанда бе тағир мемонанд ва дар натиҷа растаниҳо аломатҳои хоси волидайнӣ ҳудро нигоҳ медоранд Г. П.Чимпоеш, [168, с. 4-6].

Навромузи ва тадқиқотҳои наврои географии нишон дод, ки хурмои шарқӣ, Хитой, Японӣ ё Амрикоӣ ба Иттиҳоди Шуровӣ интродусияшуда дар Туркменистон, Ёзбекистон ва Тоҷикистон ягона камбудии ин зироат ин ба сармо ноустувори дар минтақаҳои субтропикии иқлимаш хушки ин ҷумҳуриҳо мебошад, Н.И. Зактрегар, [50, с. 82-93].

Ба вуҷуд овардани навроҳои навро барои ташкил намудани боғҳои мевадиҳандаи аврупоӣ ва суптропикӣ ҷӣ дар корҳои илмӣ ва ҷӣ дар истеҳсолот вазифаи муҳим мебошад, Ф. Ф. Мануйло, [80, с. 129].

### **1.6. Ба сармо тобоварӣ**

Баъди аз солҳои 1945 дар СССР дар Боғи ботаникии ба номи Никитский ба воситаи селекцияи бевосита А. К.Пасенков аввалин шуда, гибриди байни намуди хурмои шарқӣ ва хурмои виргиниро бароварда шуд, бехтарин дурағаҳои он интиҳоб карда шуд, ки баъдтар номи «Россиянка»-ро гирифт, ки ба сардиҳои то 26 °С тобовар мебошад, Г.К. Герасимов, [25, с. 35].

Дар байни растаниҳои мевадиҳандаи субтропикӣ хурмои шарқӣ яке аз зироатҳои ба сармо тобовар ба ҳисоб меравад. Ниҳолҳои ҷавон ба ҳарорати пасти дуру дароз то -12-15°C бе зарари ҷиддӣ тоб оварда метавонанд. Новобаста аз ин дар ҳарорати паст, навроҳои яқсолаи

хурмои шарқӣ дар минтақаҳои шимолӣ қисман аз сармо осеб мебинанд, ки ин боиси кам шудани ҳосил мегардад, М.Д. Омаров, А. В. Риндин, [120, с. 332-342], А. Қ. Раҷабов, А. В. Риндин, [131, с. 216-218].

Намудҳои хурмо серҳосил буда, ба шароити хоку иқлим нағз мутобиқ мебошанд. Устуворияти онҳо ба сармо имкон медиҳад, ки ба  $-16$   $-18^{\circ}\text{C}$  бе зарар дар  $-19$ .  $-20^{\circ}\text{C}$ , навдаҳои яксола пурра ва дусола қисман дар ҳарорати  $-22$   $-25^{\circ}\text{C}$ ; пурра дарахт аз сармо осеб мебинанд ва хушк мешавад, А. А. Ядров, Л.Т. Синко, А. Н. Казас, В. А. Шолохова, [176, с. 16-19].

Хурмои шарқӣ низ дар қатори дигар намудҳои хурмо ба касалиҳо ва ҳашароти зараррасон устувор аст, Б. М. Гусейнова, Т. И. Даудова, [33, с. 107-112].

Дарахтони калонсоли хурмои шарқӣ то ҳарорати тӯлонии манфии  $15$   $-17^{\circ}\text{C}$  бидуни зарари ҷиддӣ тоб меоранд. Ҳарорати паст  $-18$   $-20^{\circ}\text{C}$  боиси осеб دیدани навдаҳои яксола ва чубу қисман бисёрсола мегардад. Ҳарорати пастӣ осебпазир барои хурмои шарқӣ манфӣ  $-21$   $-22$  дараҷа аст. Ба шарофати ин хосиятҳо, хурмо берун аз минтақаи субтропикии кишвари Краснодар - дар Новороссийск ва Темрюк мерӯяд. Коллексияи навҳо дар тарафҳои минтақаҳои шимолӣ солҳои охир якбора кам шуда, истодааст, М.Д. Омаров, Т.Д. Беседина, [114, с. 162].

Ҳарорати барои хурмои шарқӣ осебпазир дар шароити водии Хисор дар зимистонҳои саҳти солҳои 1948-1949 ва 1949-50, ки пастшавии минималии ҳарорат муқаррар шудааст.  $-20,6^{\circ}\text{C}$  (Денав) дар ин сармоҳо дарахтони навҳои Хиакуме ва Зеджи мару, ки солашон 10-12-сола буданд, ҳале осеб دیدанд, 85 фоизи шумораи умумии дарахтон аз зарари расида барқарор нашуданд ва солҳои 1951-1952 хушк шуданд, Б. С. Розанов, П. Г. Ширяева, [139, с. 87].

Хурмои шарқӣ дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯрови яке аз зироатҳои субтропикии парваришшаванда ба сармо тобовар мебошад. Саркарда аз аввалҳои шинонидани ин зироат аз асри гузашта (1888-1897с) то ин

ҷониб олимон ба хунуки тобоварии он аҳмияти ҷидди медиҳанд. Бо ақидаи профессор Т.Т Селянинова хурмои шарқӣ дар шароити иқлими субтропикии намнок то хунукии  $-15^{\circ}\text{C}$  осеби кам ва дар хунукии  $-20^{\circ}\text{C}$  осеби бисёртар дида дар хунукии  $-25^{\circ}\text{C}$  бошад то решааш хунук мезанад Б.Л. Массовер, [87, с. 3-20].

Навъҳои дурнамои ба сармо тобоварӣ хурмои шарқӣ, ки дар талу тепаҳои ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон парвариш карда мешавад, навъҳои Тоҷикӣ, Шарқӣ, Ҳисори ва Вахш мебошад, ин навъҳо дар водиҳо дида дар ноҳияҳои наздикуҳӣ низ, шинонидан самарани хуб медиҳад, Госагропром Таджикской ССР, [27, с. 3-6].

Дар байни меваҳои субтропикӣ дарахти хурмо метавонад то хунукиҳои  $-18$   $-20$  дараҷа аз сармо осеб намебинад, аммо дар аввали баҳор хангоми бедоршавии мугчаҳо ҳавои  $-4$   $-5$  дараҷа сарди метавонад, мугчаҳоро сармо занад. Хурмои шарқӣ назар ба анор ба гарми камтар эҳтиёҷ дорад, аммо намидӯст аст. Агар дар тобистон намии замин аз ҳад зиёд бошад ғурааш мерезад, Ф. Урунов, С.Г. Гулов, [162, с. 36-37].

Тадқиқотҳои чандинсолаи олимон нишон дод, ки натиҷаи ягонаи ба хунуки мутобиқ кардани хурмои шарқӣ ин тарзи пайвандкунии дар баландии 1,2м дар танаи хурмои виргинӣ мебошад. Ин гуна тарзи пайванд соли 1949 дар стансияи таҷрибавии собиқ н. «Колхозобод» гузаронида шуда буд, У.Э. Эшонкулов, В. И. Цулая. [173, с. 106].

ИИТ Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои зиёд навъҳои ба хунуки устуворро омӯхтанд, 12 сол хунукиҳои саҳт барои навъҳои стантартӣ омӯхта шуда, ин ҳолат 6 бор такрор шуд. Навъҳои ба қадри имкон ба хунуки тобовар Тоҷикӣ, Ҳисори, Шарқӣ ва Вахш буда, соли 1976 ба комиссияи навъомӯзи қабул шуда буд. Дар шароити Тоҷикистон аз назари Г.Т. Гутиев ба сармо тобоварии навъҳои хурмои шарқӣ аз яқдигар фарқ мекунанд, аз он ҷумла дар шаҳри Душанбе зимистони соли 1940-41 дар ҳарорати  $-17^{\circ}\text{C}$  баъзе навъҳо осеб надиданд, Г.Т. Гутиев, [34, с. 39-40]. Б.Л.Массовер, [88, с. 31-32], [84, с. 7-8].

### 1.7. Таркиби химиявии хурмои шарқӣ

Дар таркиби меваи хурмо то 25% канд, сафеда, равған, витамини С, гликозидҳо, флавоноидҳо, кислотаҳои органикӣ, танин мавҷуданд, М. Д. Омаров, З. М. Омарова, [118, с. 49-53]., М.Ш. Абдулаев ва дигарон, [2, с. 111-113], У.А. Бабаева, [4, с. 52-54].

Хурмои шарқӣ дорои миқдори зиёди намакҳои Mg, Mn, Pb, Fe, K ва мг% йод мебошад. Дар решаи растанӣ нафтохинонҳо – динафтодиоспирол Д, Е, диоспирин, 8-гидроксидиоспирин муайян карда шудааст, меваҳои хурмо барои норасоии йод дар организм истифода мешавад. Ҳодисаҳои пайдоиши фитобезоарҳо бо истеъмоли дарозмуддати меваҳои хурмо, махсусан дар кӯдакон тавсиф шудаанд, В. Г. Лалетин, С.Я. Аржанов, [78, с. 32-33], Ю. Ю. Соколов, [157, с. 60-64]., М.И. Давидов, Е.В. Владимирский ва дигарон, [37, с. 21-25].

Умуман, мувофиқи вариантҳои хушккунӣ, ҳосили маҳсулоти хушк дар варианти 2 аз ҳадди ақал 23,0% -ро ташкил медиҳад (мевахоро ба 4 қисм, бурида) то 48%. Дар меваҳои хушк хурмои шарқӣ афзоиши миқдори витамини С, каротин ва кислотаҳо қайд карда мешавад. Дар раванди хушккунӣ миқдори пектинҳо ва танинҳо якбора коҳиш меёбад, ки ба аз байн рафтани тумчи ва беҳтар шудани ҳосиятҳои органолептикӣ мусоидат мекунад. Барои хушккундан танҳо меваҳои пухта ва саҳт истифода мешуданд, Г. Н. Шайхмагомедова, [170, с. 24].

Дар таркиби меваҳои хурмо то 25% канд, сафеда, равған, витамини С, гликозидҳо, флавоноидҳо, кислотаҳои органикӣ ва танин мебошад, М.Д. Омаров, З.М. Омарова, [118, с. 49-53]., М.Ш. Абдулаев ва дигарон, [2, с. 111-113]. У. А. Бабаева, [4, с. 52-54].

Миқдори йоднокӣ дар хурмо баъд аз феҳоа меистад, аммо миқдори кобальт бошад дар ҷои аввал. Таркиби меваи хурмо аз оҳан 1,5-2 маротиба зиёд назар ба меваи себ ва нок буда, лекин аз ангур камтар аст. Бо миқдори марганца бо муқоиса аз дигар меваҳо афзалият дорад, Е.П. Франчук, [163, с. 197]., А.Я. Зарецкий, [55, с. 93-106].

## **БОБИ 2. Мавод ва методҳои тадқиқот**

### **2.1. Хусусиятҳои ҳоку иқлими водихои Ҳисор ва Вахш**

**Водии Ҳисор** - яке аз водихои барои боғдорӣ мусоидтарини Тоҷикистон аст. Худуди онро тӯли қаторкӯхҳои Ҳисор муайян мекунад. Водии Ҳисор дар байни кӯхҳо дар баландии аз 700 то зиёда аз 3000 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Микдори боришот аз 350-700 мм мебошад. Водӣ бо дарёҳои обаш ширини Ширкент, Қаратоғ, Варзоб ва Кофарниҳон бурида шуда аст, бо оби ин дарёҳо тамоми масоҳати ноҳия обёри карда мешавад. Ба водии Ҳисор ноҳияҳои Файзобод, Вахдат, Рӯдакӣ, Ҳисор, Шаҳринав, Турсунзода, ш. Душанбе ҳамчунин ноҳияҳои Саросиё, Дехнав, Шӯрчӣ ва Бойсуни Ҷумҳурии Узбекистон дохил мешаванд. Дар водӣ парвариши дарахтони мевадиханда, масалан себ, нок, бихӣ, олу, гелос, олуболу, шафтолу, хурмои шарқӣ, лиму, ангур хуб ба роҳ монда шудааст. Шароити иқлиму хоки водӣ имкон медиҳад, ки меваҳои болаззат парвариш карда шаванд. Истеҳсоли меваҷот асосан барои таъмини эҳтиёҷоти аҳолии шаҳрҳои саноатии водӣ, истеҳсол ва коркарди саноатии он, ҳамчунин барои содирот равона карда шудааст.


Дарозии водӣ 115 км-ро ташкил медиҳад. Иқлими ин минтақа континетали буда, бо таъсири нурҳои офтоб, раванди гардиши атмосфера ва бо қабати болои хок фарқкунанда аст. Таъсири чунин омилҳои ба иқлим таъсиркунанда дар ҳар як мавсим гуногун аст. Водии Ҳисор аз маҷмуи хуноқиҳои тарафи шимол хуб ғимоя шудааст. Ин имконияти зимистони гарм ва қабати ноустувори барфро фароҳам меорад. Давраи гармии ҳаво бо ҳисоби миёна 235-240 рӯзро ташкил мекунад. Ҷаъми ҳарорати ҳаво аз 0°C боло баробар ба 4900°C ва аз 10°C боло ба 4200 °C баробар аст. Баҳори ин водӣ гарм ва боришоти зиёд дорад. Боришоти миёнаи солона ба 500 -600 мм дар ҳамвориҳо ва дар баландиҳо то 1500 мм (Ҳоҷа оби гарм), мерасад. Фаъолияти циклонӣ дар баҳор бо боришоти пай дар пай, раду барқ ва жола ин минтақаро фаро мегирад. Дар моҳҳои март ва апрел шумораи зиёди боришот дида мешавад. Баъзе солҳо сардиҳои аввали баҳор ба

зироатҳои кишоварзӣ ҳисироти зиёд меорад. Тобистонаш гарм ва хушк, намнокии ҳаво рӯзона дар баъзе маврид нисбатан паст фаромада 18-25 % -ро ташкил медиҳад. Дар моҳи июл ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво 27 °C ва рӯзона то 36 °C баланд мешавад. Ҳамасола ҳарорати баланди ҳаво ба 40°C ва ниҳои он ба 43°C баробар мешавад, «Захираҳои агроиклими Тоҷикистон», [1, с. 216], ҳарорати миёнаи солони минтақаи тадқиқот дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

**Ҷадвали 2.1. - Ҳарорати миёнаи моҳонаи водии Ҳисор °C, дар солҳои тадқиқот (2016-2018)**

| 1                | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11  | 12  | миёна |
|------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| <b>Соли 2016</b> |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
| 1                | 3,7 | 8,4 | 14,7 | 20,0 | 24,9 | 28,1 | 26,6 | 21,7 | 15,5 | 9,3 | 4,3 | 14,8  |
| <b>Соли 2017</b> |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
| 2,0              | 4,0 | 10  | 13   | 20   | 26   | 29   | 27   | 23   | 16   | 9   | 4   | 15,2  |
| <b>Соли 2018</b> |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
| 1,5              | 0,5 | 6,8 | 12,8 | 17,5 | 21,8 | 25,1 | 24,2 | 19,8 | 12,9 | 5,6 | 0,3 | 12,4  |

Чӣ тавре, аз ҷадвали 2.1. мушоҳида карда мешавад, дар солҳои тадқиқот ҳарорати нисбатан баланд соли 2017 ба 15,2°C ва паст соли 2018 ба 12,4°C расид. Дар охири моҳи ноябри соли 2016 сардии кӯтоҳ муддат ба ниҳолҳои ҷавон таъсири манфӣ расонид. Боришот ва ҳарорати миёнаи моҳона дар солҳои тадқиқот дар водии Ҳисор дар диаграммаи 1 оварда шудааст.



**Диаграммаи 1-Нишондодҳои боришот ва ҳарорати миёнаи моҳонаи водии Ҳисор дар солҳои тадқиқот, (2016-2018)**

Чи гунае, ки дар диаграммаи 1 оварда шудааст, ҳарорати миёнаи моҳона дар солҳои тадқиқот нисбатан пасттар дар моҳи январ 4,4 ° С, феврал ва декабр 5,8 ° С, нисбатан баланд дар моҳи июл 28,9, июн 26,5 ва август 24,7 ба қайд гирифта шудааст.

Ҳарорати баланди минтақа дар моҳи июл мушоҳида мешавад, ба ҳисоби миёна дар баъзе ҳолатҳо то +41° С ва ҳато ниҳои он то +43 ° С мерасад. Сармо ва давраҳои хунукҳои сол асосан шабона ва саҳаргоҳон ба қайд гирифта мешавад, дар баъзе ҳолатҳо ҳарорат рӯзона мусбӣ ва яку якбора паст мешавад +15 - 18 ° С , ки ин гуна сардиҳо сабаби осеббинии растаниҳо мегардад. Сардиҳои охири баҳорӣ дар минтақаи водии Ҳисор даҳаи аввал ва сеюми моҳи март ва сардиҳои аввали тирамоҳ дар баъзе солҳо дар нимаи дуюми моҳи октябр ба қайд гирифта шудаанд. Дар баробари ҳарорати солоне миқдори боришоти солоне, низ ба рушду нумӯи хурмои шарқӣ таъсир расонда метавонад (ҷадвали 2.2.).

**Ҷадвали 2.2. -Чамъи боришоти солонеи шаҳри Ҳисор дар солҳои тадқиқот (с 2016-2018) мм. (тибқи маълумотҳои Агентии обуҳаво санҷии ш. Ҳисор)**

| 1                | 2     | 3     | 4    | 5    | 6    | 7  | 8 | 9   | 10   | 11   | 12   | солоне<br>мм |
|------------------|-------|-------|------|------|------|----|---|-----|------|------|------|--------------|
| <b>Соли 2016</b> |       |       |      |      |      |    |   |     |      |      |      |              |
| 84,6             | 18,5  | 118,5 | 80,1 | 59,4 | 1    | 14 | 0 | 0,5 | 9,8  | 2    | 96,5 | 485,5        |
| <b>Соли 2017</b> |       |       |      |      |      |    |   |     |      |      |      |              |
| 92,1             | 134,1 | 63,2  | 74,3 | 13   | 14,8 | 0  | 0 | 0,9 | 0    | 5,7  | 5,8  | 403,9        |
| <b>Соли 2108</b> |       |       |      |      |      |    |   |     |      |      |      |              |
| 13,7             | 76,6  | 8,9   | 55,8 | 85,4 | 2    | 0  | 0 | 0   | 60,3 | 92,1 | 33,2 | 428          |

Аз ҷадвали 2.2. бар меояд, ки боришоти зиёд дар водии Ҳисор дар моҳҳои апрел 70 мм, март 63,5 мм ва январ 63, 3 мм ва нисбатан кам дар моҳи август 0 мм, сентябр 0,4 ва июл 4,6, инчунин боришоти солоне дар соли 2016- 485,5 мм, соли 2017-403,9 мм ва соли 2018- 428 мм ба қайд гирифта шудааст. Боришот ва ҳарорати ба қайд гирифта ба рушду нӯмуи хурмои шарқӣ таҳдидунада набуда, дар ин минтақа метавонем ҳосили ниҳои ва меваҳои хушсифат ба даст оварем. Ҳарорати минтақаҳои таҷрибавӣ якхела набуда байни худ тафовут доранд (ҷадвали 2.3.)

**Чадвали 2.3.- Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳавои ноҳияи Ҷ. Балхӣ, °C  
(2016-2018)**

| Моҳҳо, °C                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
|---------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| I                         | II  | III  | IV   | V    | VI   | VII  | VIII | IX   | X    | XI  | XII | Сол. |
| 2016 сол                  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
| 3,9                       | 7,0 | 15,7 | 17,0 | 21,6 | 27,5 | 29,8 | 26,7 | 21,8 | 14,2 | 8,7 | 5,2 | 16,5 |
| 2017 сол                  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
| 5,4                       | 6,8 | 12,8 | 19,4 | 24,3 | 27,7 | 32,0 | 29,7 | 23,8 | 17,7 | 8,8 | 6,5 | 17,9 |
| 2018 сол                  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
| 3,8                       | 8,1 | 13,0 | 18,0 | 24,6 | 29,4 | 30,8 | 28,5 | 21,8 | 14,3 | 7,5 | 2,0 | 16,8 |
| Ҳарорати миёнаи бисёрсола |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
| 4,3                       | 7,3 | 13,8 | 18,1 | 23,5 | 28,2 | 30,8 | 28,3 | 22,4 | 15,4 | 8,3 | 4,5 | 17,0 |

Аз нишондоди чадвали 2.3. бар меояд, ки ҳарорати миёнаи соли 2017 назар ба соли 2016-1,4 дараҷа гарм, назар ба соли 2018-1,1 дараҷа гарм, вале назар ба ҳарорати миёнаи се солаи ҳавои ноҳия аз 0,9 дараҷа гармтар ифода ёфтааст.

Яке аз омилҳои таъсиркунанда ба рафти нашъу намо ва ҳосилнокии хурмои шарқӣ, ин таносуби гармии миёнаи моҳонаи ҳаво ва намнокии нисбии он, дар давраи нашъу нумӯ мебошад.

Мувофиқи нишондиҳандаҳои бисёрсола, ки аз маводи Агентии обуҳаво-шиносӣ бармеояд, ҳарорати миёнаи водии Вахш назар ба ҳарорати миёнаи ҷумҳури 2.2 °C гармтар аст. Зимистон ҳарорати миёнаи моҳи январ дар ин солҳо 0,9-1,0 °C дараҷа гармиро ташкил медиҳад. Нишондодҳои боришоти минтақаи водии Вахш аз водии Ҳисор дида фарқ мекунад (чадвали 2.4).


**Чадвали 2.4. -Миқдори боришоти солонаи ноҳияи Ҷ. Балхӣ, мм (2016-2018)**

| Моҳҳо     |      |      |      |      |     |     |      |    |     |      |     |       |
|-----------|------|------|------|------|-----|-----|------|----|-----|------|-----|-------|
| I         | II   | III  | IV   | V    | VI  | VII | VIII | IX | X   | XI   | XII | Сол.  |
| Соли 2016 |      |      |      |      |     |     |      |    |     |      |     |       |
| 6,3       | 21,5 | 16,8 | 59,8 | 18,6 | 4,9 | 0   | 0    | 0  | 1,5 | 25,3 | 1,2 | 155,9 |
| Соли 2017 |      |      |      |      |     |     |      |    |     |      |     |       |

**Идомаи ҷадвали 2.4.**

|                      |      |      |      |      |     |   |   |     |     |      |      |       |
|----------------------|------|------|------|------|-----|---|---|-----|-----|------|------|-------|
| 8,1                  | 18   | 24,0 | 30,3 | 16,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0   | 3,8 | 27,8 | 10,1 | 139,6 |
| <b>Соли 2018</b>     |      |      |      |      |     |   |   |     |     |      |      |       |
| 10,6                 | 39,2 | 21,0 | 87,6 | 13,5 | 0,3 | 0 | 0 | 4,9 | 0,5 | 27,6 | 22,3 | 227,5 |
| <b>Миёнаи сесола</b> |      |      |      |      |     |   |   |     |     |      |      |       |
| 8,3                  | 26,2 | 20,6 | 59,2 | 16   | 2,2 | 0 | 0 | 1,6 | 1,9 | 26,9 | 11,2 | 174,3 |

Чуноне ки дар ҷадвали 2.4. аён ҳаст, миқдори боришоти миёнаи соли 2016-155,9 мм: дар соли 2017 – 13,6 мм, соли 2018 - 227,5 мм-ро ташкил дода бошад, боришоти миёнаи сесола ба 174,3 мм баробар аст. Соли 2018 назар ба нишондиҳандаи миёнаи сесола 53,2,9 мм зиёд буд. Соли 2017 боришот ҳамагӣ 139,6 мм-ро ташкил карда бошад ин назар ба нишондиҳандаҳои миёнаи сесола 34,7 мм кам ва дар соли 2018 он ба 227,5 мм расидаст, ё ин ки 53,2 мм зиёд мебошад. Боришот ва ҳарорати миёнаи моҳҳои ноҳияи Ҷ. Балхӣ дар диаграммаи 2 оварда шудааст.



**Диаграммаи 2.- Боришот ва ҳарорати моҳонаи ноҳияи Ҷ. Балхӣ дар солҳои тадқиқот, (2016-2018)**

Дар моҳҳои июн ва август боришот 2,2 мм нишон дода шудааст ва ҳарорати миёнаи баланди ҳаво, ки 28,3 ва 30,8°C буда, назар ба минтақаи тадқиқотии води Ҳисор, ки боришот дар моҳҳои нишондода шуда, 10,5мм ва ҳарорат 26,5 ва 28,9 C° мебошад, ки дар ин ҳолат намнокии хок паст ва намнокии ҳаво низ дар баъзе солҳо ҳамагӣ 45.6-51.5%-ро ташкил

медиҳад.шуда, ба ҳосилнокии дарахтон аз он ҷумла, хурмои шарқӣ таъсири манфӣ мерасонад.

### **Тавсифи хоки водии Ҳисор**

Хоки минтақаҳои наздикухӣ ва кухӣ, ки аз рӯи Барномаи Ҳукумати дар он ҷойҳо бунёд намудани боғҳои саноатии пурсамар ба нақша гирифта шудааст, хокҳои барои шароити ҷумхурий хос мебошанд. Хоки ин минтақаҳо асосан хокҳои хокистарӣ ва қаҳваранги карбонати (хокистаранги муқарарӣ) буда, дар баландии аз сатҳи баҳр 600-900 м ба назар мерасад, В.Я. Кутеминский, Н.В. Леонтева, [60, с. 60-65].

#### **Ҷадвали 2.5. - Тавсифи хокҳои хоҷагии Сунбулаи водии Ҳисор**

| Намудҳои хоки хоҷагӣ<br>дар боғ  | Хусусияти кимиёвӣ<br>гумуснокии хок | Таркиби физикавӣ<br>хок % |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Хоки хокистарранг                | 1,3г/см <sup>2</sup>                | 61%                       |
| Хоки хокистарранги<br>сафедчатоб | 1,2г/см <sup>2</sup>                | 23%                       |
| Хоки хокистарранги марғзорӣ      | 1,4г/см <sup>2</sup>                | 13%                       |

Аз нишондоди ҷадвали 2.5. бармеояд, ки асоси хокҳои ин боғ хокистарранг буда, дар таркибашон моддаҳои ғизоӣ ба таври даркори мавҷуд нест, яъне на он қадар баланд аст. Микдори гумус дар хоки минтақаи таҷрибавӣ барои парвариши хурмои шарқӣ мувофиқ буда, рушду нумӯи дарахтон дар мӯқоиса бо дигар минтақаҳои хурмопарварӣ хуб баҳогузорӣ шуд. Дар ин асос таркиби физикавӣ хок ба инобат гирифта мешавад (ҷадвали 2.6.).

#### **Ҷадвали 2.6. -Таркиби физикавӣ хоки қитъаи таҷрибавӣ**

| Намудҳои хоки хоҷагӣ<br>дар боғ  | Намигузаронии<br>хок | Ҳавогузаронии<br>хок | Мавҷудият |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Хоки хокистарранг                | Миёна                | Хуб                  | Паст      |
| Хоки хокистарранги<br>сафедчатоб | Суст                 | Қаноатбахш           | Паст      |
| Хоки хокистарранги<br>марғзорӣ   | Миёна                | Хуб                  | Баланд    |

Солҳои охир барои баланд бардоштани ҳосилнокии хок, намигузаронӣ, ҳавогузронӣ ва баланд бардоштани таркиби он чораҳои лозими дида мешавад. Аз ҷиҳати таркиби физикавӣ (намигузаронӣ ва ҳавогузронӣ) хокҳо хубу миёна ба ҳисоб мераванд.

Аз ҷиҳати захирашавии нуриҳои нитрогенӣ, фосфор ва калий хело камбағаланд. Барои муайян кардани меъёри солони нуриҳои калийи, фосфорӣ ва нитрогенӣ ҳар сол таркиби хокро муайян менамоянд. Таркиби хокро бошад дар озмоишгоҳи таҷрибавӣ санчида дар асоси ҳамин нигоҳ карда ба замин миқдори лозимии нуриҳоро истифода бурда мешавад.

Хоки хокистаранг аз хоки хокистаранги равшан чандон тафовут надорад, барои бунёди боғи дарахтони мевадиханда мувофиқанд. Дар таркиби онҳо тақрибан 2-3% гумус мавҷуд буда, намнокии хушкшавиашон 8-10 %, намии онҳо 23-25 %, вазни хосашон 1,12-1,30 г/см<sup>3</sup> аст.(ташхиси хок дар Институти хокшиносӣ ва агрохимия гузаронида шудааст).

### **Иқлими водии Вахш.**

Иқлими ноҳияи Ҷ. Балхӣ субтропикии хушк (тағирёбанда) буда, барои парвариши зироатҳои субтропикӣ, себҳои барвақтӣ ва шафтолуҳои хушсифат хело мувофиқ аст. Ин минтақа дар баландии аз сатҳи баҳр 350-400 м ҷойгир буда, ҳарорати баланди ҳаво дар моҳҳои июн – август дар давраи ҳозира 40-48,5 °С мерасад, миқдори солони боришот 190-350 мм мебошад.

Водии Вахш дар самти шимол бо ноҳияи Ваҳдати водии Ҳисор дар шарқ бо собиқ вилояти Кулоб дар ғарб бо ноҳияи Рӯдакӣ водии Ҳисор ва ҷумҳурии Ўзбекистон ва дар ҷануб бо ҷумҳурии исломии Афғонистон ҳамсарҳад мебошад. Водии Вахш дар баландии 329м (Панҷи поён) ва 751м (н. Хуросон, Ганҷина) аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда бо самти меридионалӣ тавасути соҳилҳои рост ва чап ба поён ҷоришавии дарёи Вахш дар шимол ба он водии Ёвон, ки сарҳади онро дар шарқ

қаторқуҳҳои Тераклитов ва Қаратов дар шимол қаторқуҳҳои Рангон дар ғарб қаторқуҳи Оқтов ва дар ҷануб бо ҳамвориҳои регзорҳои дарёи Панҷ тӯл кашидааст. Микдори боришот 150-300 мм –ро ташкил медиҳад.

Ба водии мазкур микдори зиёди захираи гармӣ хос буда давраи ҳарорати ҳаво зиёда аз  $+10^{\circ}\text{C}$  аз 200 то 255 рӯз давом карда ҷамъи ҳарорати ҷаъоли ҳаво 4500-5800  $^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад, ки шароити хело фароҳам барои парвариши навъҳои зироатҳои ситрусӣ субтропикӣ аз онҷумла хурмои шарқӣ мувофиқ мебошад. Аммо баъзан солҳо фарорасии барвақтии ва ё дерии сармо ба мушоҳида расидааст [Владимров, 1982].

Дар водӣ меваҳои барвақтӣ – себ, олу, зардолу, шафтолу, олуболу, қулфинай ва растаниҳои субтропикӣ – лиму, афлесун, нораң, хурмо, анор, анҷир, бодом парвариш карда мешавад. Мақсад аз ривочи боғдорӣ таъмини аҳоли бо меваҳои тару тозаи барвақтӣ ва содирот ба хориҷи кишвар мебошад. Шароити иқлимӣ хусусан барои парвариши меваҳои субтропикӣ мувофиқ аст.

Боришоти нисбатан зиёд аз моҳҳои ноябр то март борида, қисми зиёди он ба моҳи феврал ва март рост меояд. Аз ҳамин нишондоди ками боришот то 200 мм ба водиҳои Вахш мансуб аст. Дар қисми зиёди аз ҳудудҳои ин води боришот аз 200 то 400 мм мебошад.

#### **Ҳоки минтақаи водии Вахш**

Ҳоки ҳокистаранги равшан-дар ҳамвориҳои доманакӯҳи ва нишебии адирҳои паст дар баландии аз сатҳи баҳр 300-500 м дучор шуда, гумуснокиаш 1-1,5 % мебошад. Микдори карбонатҳо 20% -ро ташкил медиҳад.

Ҳокҳои ҳокистаранги равшан захираи асосии пӯшиши ҳокҳои водиҳои Вахш, поёноби Қофарниҳон, Бешкент, назди Сирдарё ва доманакӯҳҳои пасти ихотакардаро дар бар мегиранд.

Дар айни замон нисбатан омӯхташуда ҳокҳои ҳокистаранги равшани водиҳо мебошанд, ки ҳама вақт ҳамчун фонди арзишманди

заминҳои фонди зироаткории обии ҷумҳурии ба ҳисоб рафта, дар гузаронидани тадқиқот ба онҳо диққати махсус дода мешавад.

Чӣ тавре, ки дар маълумотҳо оид ба тавсифи зертипҳои хокҳои хокистарранг (равшан, муқаррарӣ ва тира) қайд кардашуд, онҳо дар шароити норасоии зиёди намӣ ташаккул ёфтаанд, ки равиши муайяни равандҳои хокпайдошавиро дар ин хокҳо ба вуҷуд меорад.

Обёрии сунъии чунин хокҳо тавассути меъёрҳои калони обёрикунӣ куллан речаи обии онҳоро иваз намуда, ба тағйирёбии бевоситаи хосиятҳои физикию кимиёвӣ мусоидат мекунад. Дар ин вақт яке аз хосиятҳо тез тағйир ёфта, дигарашон бошад, хеле дуру дароз суръат мегирад.

Хокҳои хокистарранги равшани обёришавандаро мо ҳамчун зертип ҷудо намудем, ҳарчанд дар вақтҳои охир бисёре аз муҳаққиқон онҳоро ҳамчун типии мустақил ҷудо менамоянд.

Ташхисҳои хокҳои минтақаи парвариши дарахтони хурмои шарқӣ дар қитъаҳои тадқиқотӣ нишон дод, ки хоки ин минтақа барои парвариши дарахтони мевадиханда, аз он ҷумла хурмои шарқӣ мувофиқ мебошад, ташхиси хоки ноҳияи Ҷ. Балхӣ дар ҷадвали 2.7. оварда шудааст.

**Ҷадвали 2.7. - Хусусиятҳои агрохимиявии хоки қитъаи таҷрибавии ноҳияи Ҷ. Балхӣ дар солҳои тадқиқот (2016-2018)**

| Қабати хок,<br>см. | Миқдори умумӣ, % |          |        | Миқдори моддаҳои ғизогии дастрасшаванда барои растанӣ, мг\кг хок |                               |                  |
|--------------------|------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                    | гумус            | Нитроген | Фосфор | N <sub>03</sub>                                                  | P <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | K <sub>2</sub> O |
| 0-30               | 1,5              | 0,15     | 0,15   | 19,0                                                             | 16,0                          | 210              |
| 30-60              | 1,0              | 0,12     | 0,08   | 18,0                                                             | 13,0                          | 160              |

Аз ҷадвали 2.7. бар меояд, ки ҳосилхезии замин, ки дар қабати шудгоршаванда (0-60 см) ба ҳисоби миёна 1,0- 1,5 % гумус, фоизи ниҳоят пасти нитрогену фосфори умумӣ ва миқдори ками нитроген, фосфор ва

калий ба дарахт дастрасшаванда, аз ҳосилхезии пасти табиӣ хоки ин мавзеъ гувоҳӣ медиҳад.

## **2. 2. Минтақа, методика ва маводҳои корҳои илмӣ тадқиқот.**

Тадқиқотҳои илмӣ оид ба омӯзиши хусусиятҳои агробиологӣ ва селекционии хурмои шарқӣ дар хоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисор дар баландии 700 -800 м ва стансияи таҷрибавии зироатҳои субтропикӣ ва ситрусии Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ дар баландии 330м аз сатҳи баҳр гузаронида шудааст. Ин минтақаҳо барои парвариши навҳои гуногуни себ, нок, олу, гелос, ангур, зироатҳои субтропикӣ ва ситрусӣ, аз он ҷумла хурмои шарқӣ хело мувофиқ аст. Тадқиқотҳо соли 2016 оғоз гардида соли 2018 ба анҷом расонида шуд. Ҳарорати баланди ҳаво дар моҳҳои июн- август ба 40-43 °C баробар шуда, миқдори солони боришот ба 500-600 мм мерасад.

Корҳои илмӣ- тадқиқотӣ дар ду қитъаи таҷрибавӣ; - стансияи таҷрибавии зироатҳои субтропикӣ ва ситрусии ноҳияи Ҷ. Балхӣ ва хоҷагии таҷрибавии «Сунбула»- и шаҳри Ҳисор солҳои 2016-2018 гузаронида шуд. Дар қитъаҳои таҷрибавӣ давраҳои мушоҳидаҳои фенологӣ дар 8 навҳои хурмои шарқӣ, ки аз ҷиҳати экологӣ иқлимашон гуногун гузаронида шуд.



**Расм 1. Қитъаи таҷрибавӣ**

Нақшаи қитъаи таҷрибавӣ аз ҳар як навъи зерӣ омӯзиш қарор дошта, ва ду навъи назоратӣ 10-бехӣ дарахт интихоб карда, дар се вариант муддати се сол тадқиқотҳо идома ёфта, дар боғҳои коллексиони дарахтони хурмои шарқии соли 2010 ва 2013 бунёд ёфта, инчунин дар ниҳолҳои яқсола соли 2016-2018 сабзиши чашмакҳои пайванди дар тағпайвандҳои гуногун гузаронида шуд.

1. Тадқиқотҳо дар шароити озмоишгоҳ ва саҳрои мувофиқи методикаҳои дар боғдори қабулшуда «Барнома ва усулҳои омӯзиши навҳои дарахтони

мевадиханда, буттамевагиҳо ва чормағзиҳо» Орёл [127, с. 310] гузаронида шудааст.

2. Ба сармотобоварии навъу дурагаҳо дар шароти сахро ҳар сол зери таҳқиқот қарор гирифта аз рӯи ҷадвали 5-хола (0-5) баҳогузорӣ карда шуд.

3. Мушоҳидаҳои фенологӣ аз давраи варамкунии мӯғчаҳо сар шуда то ба итмомрасии ҳазонрез идома меёбад. Саршавӣ ва ба охиρрасии ҳар як давраи нашъунамо дар ҷадвал қайд гардид. Ба гарми ва хушкӣ тобоварии навъу дурагаҳо бо методи муайян кардани қобилияти обнигаҳдории барг бо ду такрор тадқиқот гузаронида мешавад.

4. Омӯзиши таъсири навъҳо бо пасту баландшавии ҳислати намакҳо, зиёдшави ё норасоии макро ва микроэлементҳо аз рӯи меъёри ташҳиси биометрӣ, морфологӣ, фенологӣ ва кимёвии муоинавӣ амалӣ мегардад.

5. Ба қайдгирии саҳроии устуворияти навъу дурагаҳо ба ҳашаротҳои зараррасону касалиҳо вобаста аз мутобиқати онҳо ба муҳити атроф бо тарзи назардид ба қайд гирифта шуд. Ба устуворияти навъҳо аз рӯи меъёри 0-5 ҳол ба ҳар намуди ҳашароти зараррасон ва касал дар алоҳидагӣ баҳогузорӣ гардид.

6. Ҳассосияти экологии навъу намунаҳо аз рӯи модели пешниҳод кардаи И. А. Драгевцева, [42, с.46] муайян карда шуд. Ҳосилнокии навъу дурагаҳо дар давоми се сол аз рӯи методи ба ҳисобгирии яклӯхт ҳамаи ниҳолҳои таҷрибавӣ аз рӯи ҷадвали 5-хола баҳогузори гардад. Дараҷаи ҳосилбандии ниҳолҳоро бо усули бо ҷашм аз 0 то 5 ҳол баҳогузорӣ кардем. Дар баробари ин ҳисоби бо тариқи тарозукаширо дар вақти ҷамъоварии ҳосил истифода бурда шуд.

-Сифати молии ҳар як навъ, зери омӯзиш қарор доштаре дар асоси нишондоди баҳши 9-уми «Барнома ва усулҳои омӯзиши навъҳои дарахтони мевадиханда буттамевагиҳо ва чормағзиҳо» Орёл [127, с. 310], омӯхтем.

Дар раванди чошнигирӣ (дегустация) сифати молии навъҳои меваи хурмои шарқӣ аз рӯи хусусиятҳои зерин ба инобат гирифта мешавад;

-чалби сохти зоҳирии мева (баҳои умумии ҳаҷм, шакл ва ранги мева, бо хол).

- ҳолати пухтарасӣ (меваҳои нопухта, наздик ба пухтан, пухтаи муътадил, пухта гузашта).

- тавсифи таъм (тумч, тумчи-ширин, ширини тумч, ширини паст, ширин, бемаза, таъми дигар).

- нақҳати мева (зиёд, миёна, суст, буи бегона).

- дараҷаи ғизлатнокӣ (дурушт, жиле монанд, жиле монанди суст, миёна, зич, резон, фораҷ, гардмонанд, риштамонанд ва ғ.).

- ширанокӣ лаҳми мева (бисёр ширадор, ширадор, камшира, хушк).

- ранги лаҳми мева аз зарди паст то қаҳваранги баланд, норинҷӣ

- баҳои умумии мева (аз рӯи ҷадвали 5- хола).

- тавсифи таъм ва дигар хусусиятҳои мева.

Таркиби химиявии мева дар шароити лаборатории –модаҳои хӯшк, пектин ва дигарҳо мувофиқи методикаҳои дар китоби «Усулҳои тадқиқоти биохимиявии растаниҳо» овардашуда, [44, с. 127] дар озмоишгоҳи КВД экспертиза ва озмоиши маҳсулоти фармасевтӣ ва тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд.

Баҳодиҳии иқтисодии навъу дурағаҳо дар асоси сатҳи даромаднокӣ маҳсулоти истеҳсолшударо муайян кардем. Онро ҳамчун фоизу таносуби даромади аз ҳар 1га боғ гирифташуда ва хароҷоти умумӣ барои парвариши маҳсулот, нигоҳдори ва фурӯши аз ҳамаи майдон ҳисоб кардем.

Таҳлили дисперсионӣ, маълумотҳои ҷамъшуда мувофиқи зербахши 1-2 –и III «Барнома ва усулҳои омӯзиши навъҳои дарахтони мевадиханда, буттамевагӣ ва чормағзгӣ» Орёл [129, с. 310] иҷро шудааст.

Баҳодиҳии иқтисодии натиҷаи таҷрибаҳо, аз рӯи методикаи «Институти умумироссиягии селекцияи технологияи боғдорӣ ва ниҳолпарварӣ» Кульиков, Косякин, [69, с. 26-27] ва натиҷаҳои коркарди тадқиқот бо методи «Омори биометрӣ» Б. А. Доспехов, [36, с. 351],

гузаронида ва истифода аз барномаи компютерӣ Microsof Exsel 2010 санҷида шудааст.

Ба сифати маводҳои таҳқиқотӣ ду намуди тағпайванд хурмои кавказӣ (*Diospyros lotus*), хурмои виргинӣ (*Diospyros virginiana*) ва навъҳои зерини хурмо Тоҷикӣ, Шарқӣ, Ҳисорӣ, Вахш, Шоҳона, Ваҳдат ва навъҳои назорати Зенджи мару ва Хиакуме истифода шудаанд. Ҳамчунин дигар шаклҳои ба хуноки нисбатан тобовар, аз тарафи олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ АИКТ баровардаанд истифода шудаанд. Навъҳои Шарқӣ ва Шоҳона соли 2020 ва Ваҳдат соли 2022 ба комиссияи давлатии озмоишӣ ва муҳофизати навъи назди Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудем ва дар санҷиш қарор доранд. Ба сифати маводи тадқиқот навъи намунаҳои зерини хурмои шарқӣ интихоб гардида, тавсифи мухтасари онҳо оварда шудааст.



Расми 2 наъи хурмои шарқӣ Зенджи мару

*Зенджи мару*- наъи назоратӣ, дар Япония рӯёнда шуда, соли 1949 ба Тоҷикистон ворид карда шудааст. Дар минтақаҳои водии Вахш Ҳисор парвариш карда мешавад.

Дарахташ миёнақад, шохсораш курашакл. Баргаш содда, калони тухмшакл. Мевааш майда, гирд ё лунда; меваҳои бетухмаш дарозрӯя мешаванд. Ранги мевааш норанҷии гандумранги мумпардаи кабудча дорад. Гӯшти меваҳои тухмдораш чигарии баланд, ширин, сершира, ба халво менамояд. Меваҳои бетухмаш то дами мулоим шуданашон таъми мг/фоиз витамини С, 0,03 фоиз моддаҳои даббоғӣ мавҷуд аст. Навъи серҳосил мебошад. Ҳамасола ҳосил медиҳад. Меваашро тару тоза истеъмол мекунанд ва мехушконанд. Ба сармо тоб меорад. Ҳангоми шамоли саҳт гулу ғӯрааш мерезад. Ниҳолаш соли 3–4 пас аз шинонидан бор меорад (расми.2).

**Хиакуме** – навъи назоратӣ, навъи японӣ буда, соли 1949 ба



Расми 3 навъи хурмои шарқӣ Хиакуме

Тоҷикистон ворид шудааст. Дар минтақаҳои Дарахташ қадбаланд, шохсораш гунбазшакл. Баргаш содда, калон, тухмшакл. Дар водихои Вахш, Ҳисор ва вилояти Судғд низ парвариш меёбад. Мевааш мунаввар калон, нӯгаш қадре дароз, рангаш норанҷии кушод мебошад. Таъми меваҳои бетухмаш тумч (данд) буда, рангашон норанҷии паст аст, дар ҳолати мулоим шудан,

ширин мешаванд.

Гӯшти меваҳои тухмдораш чигарии баланд. Навъи серҳосил аст ва қариб ҳар сол мева мебандад. Меваашро тару тоза истеъмол мекунанд. Меваи сахташро нигоҳ доштан ва ба дигар ҷойҳо кашондан мумкин. Дарахташ дар мавриди наздик будани обҳои зеризаминӣ ҳосили кам медиҳад. Ба сармо тобоварияш баланд мебошад. Гулаш фақат модина буда, навъи хурмои Зенчи-мари беҳтарин гардолудкунандаи он аст. Ниҳолаш соли 3-4 пас аз шинондан самар меорад. (расми 3.)



Расми 4 навъи хурмои шарқӣ «Шарқӣ»

**Шарқӣ** – навъи ояндадори дерпаз тағирёбанда, (варирующий) серҳосил мебошад. Аз тарафи олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ дар натиҷаи гардолудшавии озод солҳои 90-уми асри гузашта бароварда шудааст. Гулҳояш фақат модина мешаванд. Дар ҳолати ба таври

мӯътадил гардолуд шудани гул меваҳои хушсифати ширин мешаванд. Мевааш ҳаҷман миёна (120–160 г), зарди норанҷӣ, онро муддати зиёд нигоҳ доштан мумкин. Дарахташ миёнақад, шоху навдааш мустаҳкам. Дер ба ҳосил медарояд (соли 6-7 баъд аз шинондан пурра ба ҳосил медарояд). Дар 10-12 солаги аз ҳар бех дарахт то 400 кг мева медиҳад (расми 4).



**Расми 5 навъи хурмои шарқӣ Шоҳона**

**Шоҳона** —навъи ояндадор буда, мевааш тағирёбанда пешпазак аст, аз тарафи олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ дар натиҷаи гардолудшавии озод солҳои 90-уми асри гузашта бароварда шудааст. Давраи пухтарасиаш ба охири моҳи

сентябр ва аввали моҳи октябр рост меояд, дарахташ як хонаги гулҳояш нарина ва модина дар як дарахт мебошад. Ба сифати гардолудкунанда дар боғҳои хурмо низ шинонида мешавад. Дарахташ миёнақад, шохсораш курашакли сершох. Баргаш содда, калони тухмшакл. Мевааш миёна, вазнаш аз 120 то 180 г. гирд ё лунда мешаванд. Ранги мевааш норанҷии баланд, мумпардаи кабудча дорад. Гӯшти мевааш ҷигарии баланд, ширин, сершира мебошад (расми 5).

**Ваҳдат**-навъи ояндадорӣ, миёнапаз, мевааш тағирёбанда буда, аз тарафи олимони дар Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ дар натиҷаи гардолудшавии озод солҳои 90-уми асри гузашта бароварда шудааст.



**Расми 6 навъи хурмои шарқӣ Ваҳдат**

Охири моҳи октябр ва аввали моҳи ноябр мепазад, дарахташ як хонагӣ, гулҳои нарина ва модина дар як дарахт дида мешавад мешаванд. Мевааш тухмшакл, рангаш норанҷии баланд, гӯшти мевааш қаҳваранг, вазнаш 90-110 г.- ро ташкил медиҳад. Барои хушконида мувофиқ аст. Дарахташ миёнақад аҳромшакл дар соли 3-4 пас аз шинонидан ба ҳосил мебарояд (расми 6).

**Ваҳш**- навъи ояндадорӣ аз ҳама серҳосил буда. аз тарафи олимони Тоҷикистон (Б. Розанов, Н. Ширяева, Б.Л. Массовер.) дар Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ дар натиҷаи гардолудшавии озод солҳои 90-уми асри гузашта бароварда шудааст.



**Расми 8. Навъи хурмои шарқӣ Вахш**

Ҳамчун навъи ояндадор, дар Ҷумҳурии Ўзбекистон аллақай ноҳиябандӣ шудааст. Аз ҳар га боғоти он 30 т ҳосил гирифтани мумкин. Гулаш фақат модина мешавад. Мевааш норанҷӣ, вазнаш миёна (120–180 г), хушсифат. Дар ҳолати хуб гардолуд шудани гул гушти мева чигарии тира мешавад. Меваашро дар ҷои салқин то моҳи феврал нигоҳ доштан мумкин аст (расми 8).

Навъҳои дар боло овардашуда ҳамчун навъҳои ояндадор аз ҷиҳати хусусиятҳои хоҷагидорию биологияшон аз дигар навъҳо фарқ мекунанд. Хусусиятҳои хоси онҳо ба сармо тобоварӣ, муҳлати нигоҳдорӣ, ҳосилнокии баланд, сифати хуби мева ва ба хушккуни мувофиқ буданашон мебошад. Навъҳои ояндадори барои ин хусусиятҳояшон дар истеҳсолоти ҷорӣ намудан ба хоҷагидорон ва дигар боғдорону боғпарварони ҷумҳуриамон, вобаста ба шароити маҳал, ки барои парвариши хурмои шарқӣ шароит фароҳам аст пешниҳод карда мешавад.



**Расми 7 навъи хурмои шарқӣ Гошо -гаки**

**Гошогаки** –навъи баровардаи олимони Япония буда, соли 1949 ба Тоҷикистон ворид карда шудааст. Дар минтақаҳои водии Вахш, Ҳисор ва ноҳияҳои водигии вилояти Суғд парвариш карда мешавад. Дарахташ миёнақад, шохсораш аҳромшакли сирак, мевааш ҳаҷман миёна, гирдаи паҳн.

Пусти мевааш ғафс, рангаш норинҷии баланд; мумпарда дорад. Гушти меваҳои бетухмаш норинҷии кушод, меваҳои тухмдораш чигарии баланд. Таъми меваи тухмдораш ширину гуворост. Таъми меваҳои бетухмаш данд (тумч) мебошанд. Дар таркибаш 17,3 Ҷоиз қанд, 37,2 мг/Ҷоиз витамини С, 0,65 Ҷоиз моддаҳои даббоғӣ мавҷуд аст. Дарахташ серҳосил ва солбар аст. Меваашро тару тоза истеъмол мекунанд. Дар ҷойҳои шамолпаноҳ ва хоки ҳосилхез нағз мева медиҳад.

Ба камобӣ хассос аст. Шоҳу навдааш ба шамолҳои саҳт тоб наоварда мешиканад. Гулаш фақат модина буда, навъи Зенджи-мару беҳтарин гардолудкунандаи он аст. Ниҳолаш соли 3–4 пас аз шинондан самар меорад (расми 7).

**Тоҷикӣ**- ин навъ мевааш дерпаз буда, гулаш танҳо модина аст. Мевааш паҳн, вазнаш миёна (150–170 г), то пурра мулоим шудан таъмаш данд (тумч) мебошад. Онро то моҳи январ нигоҳ доштан ва интиқол додон ба чойҳои дур мумкин. Дарахташ баланд намешавад, шохсорааш мустаҳкам аст.

**Ҳисорӣ** – ин навъ барои навҳои хурмои Тоҷикӣ ва Шарқӣ гардолудкунандаи гул мебошад. Сармобардор аст. Дар ноҳияҳои марказии Тоҷикистон ба хунокии кӯтоҳмуддати 25°C тоб меорад. Таркиби мева ва интиқол бобии он ба мисли навъи хурмои Зенджи мару аст.



Дар баробари ин дар коллексияи хоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисор навъҳои Королёк, Туракӣ, Хиромон ва Хубон, ки дар натиҷаи гардолудшавии озод солҳои 2000 аз тарафи олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ бароварда шудаанд парвариш шудаистодаанд ва дар оянда низ ин наъҳои хурмои шарқӣ омӯхта мешаванд.

## 2. 4. Гузаронидани тадқиқот дар қитъаҳои таҷрибавӣ



**Расми 13. Рафти гузаронидани таҷрибаҳо**

Дар қитъаҳои таҷрибавӣ аз рӯи 15 навъҳои хурмои шарқӣ корҳои илмӣ таҳқиқотӣ иҷро карда шудааст, ки аз байни онҳо 4-навъи ояндадор аз рӯи хусусиятҳои хоси хоҷагию- биологикашон ҷудо карда шудааст. Дар коллексияҳо 2 навъи назоратӣ Хиакуме, Зенджи мару, ва 6 навъу намунаҳои ба сармо тобовари офаридаи олимони тоҷик Вахш, Тоҷикӣ, Ҳисорӣ, Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат ва шаклҳои парваришбанда Кулча хурмо, Батумская, Нилуфар, Хиромон ва ғайра, ки ҳамаи онҳо бо роҳи гардолудкунии озод ба вучуд оварда шудаанд, маҳфуз нигоҳ дошта ҳамчун боғҳои модарӣ аз ҷиҳати хусусиятҳои хоси хоҷагию биологӣ навъҳои ояндадор интихоб карда шуда, ба комиссияи давлатии омӯзиши ва муҳофизати навъии назди Вазорати Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудаанд..

Дар коллексияҳои мазкур навъҳое, ки зери омӯзиш қарор доранд, дар муқоиса ба навъҳои назорати интихоби тағпайванд, ба сармо тобоварӣ, давраҳои нашъу нумӯ, устуворияти навъу намунаҳо ба касалиҳою ҳашаротҳои зараррасон, ҳосилнокӣ, сифат, таркиби химиявии мева, хушккунӣ, нигоҳдорӣ ва даромаднокии иқтисодии онҳо омӯхта шуд. Аз байни навъу намунаҳо, ки дорои сифатҳои зикршуда мебошанд, навъҳои Шарқӣ, Шоҳона соли 2020 ва Ваҳдат соли 2022, ба комиссияи давлатии озмоиши навъҳо ва муҳофизати навъии назди Вазорати Кишоварзӣ пешниҳод намуда, дар омӯзиш қарор доранд. Дар қитъаи таҷрибавӣ аз давраи бунёди боғи хурмо ҳамаи қоидаҳои агротехникӣ пура иҷро гардид. Барои шинондан ниҳолҳои решаашон нағз инкишофёфта ҷудо карда, решаҳои шикаставу осебёфта ро бурида,

шоҳу навдаҳои ниҳолҳоро кӯтоҳ кардем (то нисф ё аз 1/3 ҳисса). Баъзе



Расми 15. Дарахтони 3 солаи хурмои шарқӣ

ниҳолҳое, ки шоҳа наронда буданд, пас нӯги онро 50 см болотар аз гарданаи реша буридан лозим омад. Ниҳолҳои хурмои шарқиро пеш аз шинонидан ба шарбатхок, ки аз ду сатил об як бел поруи тар ва ду бел хок тайёр карда мешавад, решаи ниҳолҳоро ба он гузошта муддати 3 соат нигоҳ дошта, баъд шинонидем. Ниҳолҳое, ки мо барои таҷриба интихоб кардем аз давраи шинонидан бо нақшаи 6x5, дар чуқричаҳои кофташуда барои онҳо 4-5 кг поруи пӯсида ва 150 г суперфосфат андохта шуда буд. то ба ҳосил даромадан, ниҳолҳо бо миқдори 20 тон нуриҳои органикӣ дар ду- се сол як бор, ҳар сол бо миқдори моддаҳои таъсиркунанда 120 кг нуриҳои азоти, 90 кг фосфори ва 60 кг калийгӣ дар як гектар таъмин мешуд. Меъёри обмони низ як хел, 600-650 м<sup>3</sup>/га. дар як обмони, то 8 маротиба обёри шудаанд.

Дар вақти шинонидани ниҳол ҳама гуна қоидаҳои ниҳолшинонӣ тибқи талаботҳои дар ниҳолшинони қабул шуда, риоя карда шуд. Дар ҳар қатор баъди даҳ ниҳол як навъи гардолудкунанда (Зенджи- мару ё Шоҳона) шинонида шуд. Ҳатман ниҳолҳоро бо об таъмин намуда, дар ҳолати ҳаво хушку бебориш баъди ҳар 10 рӯз ниҳолҳо бо об таъмин карда мешуд. Чӯякҳо аз пояи ниҳол дар масофаи 30–40 см гирифта мешаванд. Соли аввали шинонидани ниҳолҳо афзоишашон паст буд. Бинобар ин, мақсади асосӣ дар ин давра зиёд кардани шоҳу навдаҳои иловагӣ мебошад. Аз ҳамин сабаб нӯги ниҳолро бурида ва имкон додем, ки хуб шоҳаронӣ кунанд. Хоки байни қатори ниҳолҳои хурмои шарқии навбунёдро бо усули шудгори дам додашуда нигоҳ медоштем. Яке аз тадбирҳои нигоҳубини ниҳолҳо пиростани онҳо аст, ки ин корро мо ҳар сол муназам иҷро намудем. Дар давраи ба ҳосил дарои дарахтон ба шакли тоқа- тоқои сирак шакл дода шуд. Шоҳу навдаҳои хушкида, шикаста ва ё аз сармо осебдидаи дарахтон бурида мешуд.

### БОБИ 3. Натиҷаҳои аз тадқиқот бадастомада

#### 3.1. Интихоби тағпайванд ба рушд ва афзоиши навъҳои хурмои шарқӣ.

Решаи хурмо бар фарқи решаи дигар дарахтони мевадор сиёҳ аст (сахт мебошад). Соли аввал тирреша инкишоф ёфта, минбаъд шоха меронад ва ба хок хеле чуқур меравад. Тарзи ҷойгиршавии реша ба таркибу сохтори хок вобаста аст. Решаҳои дарахти хурмо дар сини 8-10 солагӣ дар заминҳои серҳосил то чуқурии 90-100 см ва решаҳои асоси бошад то чуқурии 15-40 см мераванд.

Дар хокҳои структурашон вазнин то чуқурии 10-30 см мераванд. Дар ҳама ҳолат қутри паҳншавии уфуқии реша ба қутри шохсори дарахт баробар аст. В. А. Колесников, [64, с. 233].

Пӯстлохи навдааш сӯфта, хокистарранги паст ё сиёҳтоб. Баргаш содда, бедандона, тухмшакл, сабзи баланд, рӯяш ҷилдор. Барги хурмо тирамоҳ қабл аз хазон шудан, сурх ё норинҷӣ мегардад. Муғчаҳои нашти охири феврал - аввали март бедор мешаванд. Давраи сабзиши аввалини навдаҳо бо оғозёбии гулшукуфт ба итмом хоҳад расид; давраи дуҷуми сабзиши онҳо моҳи июн - июл оғоз хоҳад ёфт. Дар фасли тобистон ду давраи сабзиши онро баръало дидан мумкин аст.

Дар шароити иқлими водии Ҳисор ва ба ин монанд тухмии зери қум хобондашудаи гузаронидаи хурмои кавказӣ моҳи март шинонида мешавад. Дар шароити водии Вахш бошад ба моҳи феврал рост меояд. Чуноне гуфта шуд тухми хурморо то зимистон бе зери қум хобони шинонидан мумкин нест. Ин кор дар водии Вахш ба мақсад мувофиқ меояд, чунки то гармиҳои сол ниҳолҳо боқуват шуда ба шароити иқлими маҳал тобовар мешаванд. Таҷрибаҳо нишон доданд, ки дар шароити водии Ҳисор сабзиши тухмиҳои кошта шуда, дар ҳарду муҳлат дар як вақт аввали моҳи май баробар ба назар мерасад, Б.Л. Массовир, [87, с. 3-20].

Дар таҷрибаҳои гузаронидаи мо оид ба интихоби тағпайвандҳо дар шароити иқлими водии Ҳисор ва Вахш бартарии тағпайванди навъҳои хурмои Кавказӣ чунин арзёби мегардад:

- шумораи умумии сабзиши чашмакҳои пайвандӣ қаноатбахш буда дар, тағпайванди хурмои Кавказӣ 80% ва дар тағпайванди хурмои Виргинӣ 51%-ро ташкил доданд.

-дарозии навдаҳои хурмои шарқӣ дар тағпайванди хурмои Кавказӣ 93,8см, хурмои Виргинӣ 63,8см,

- ҳосилнокӣ мутаносибан дар дарахтони 3-5 солаи хурмои шарқӣ аз як дарахт 11,7кг ва 7,9 кг, яъне 3,8кг аз як дарахт ба ҳисоби миёна ҳосилнокӣ дар тағпайванди хурмои Кавказӣ зиёд мебошад.

Усули кишти тухмӣ, барои дарахтони мевадиханда дар майдонҳои нисбатан хурд ба кор бурда мешавад. Масалан байни қаторҳо 60-70 см ва масофаи байни растаниҳо дар қатор 5-8 см гузошта мешавад. [Ф. Урунов, 2008].

Кишти дуқатора барои ҳамаи дарахтони мевадиханда мувофиқ буда, кишти се ва чор қатора барои дарахтони меваи донакдор истифода мебаранд. Дар ин усул масофаи байни хатакҳо 10-20 см ва байни қаторҳо 40-70 см мебошад. Барои истифодаи техника кишти аз рӯи нақшаи дуқатора 60-70 x15-20 см гузаронидан лозим аст, С.Н. Степанов, [155, с. 24-35].

Таҷрибаҳои мо дар шароити хоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисори Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ АИКТ гузаронида нишон доданд, ки тухми хурмои кавказӣ, ки як моҳ (моҳи январ) зерӣ кум гузашта буд, моҳи феврал кошта шуд ва пайдошавии ниҳолҳои аввал 15-уми моҳи апрел мушоҳида шуд. Технологияи тайёр кардани замин барои ниҳолистони хурмои кавказӣ чунин аст, ки ин ба дигар ниҳолҳои дарахтони мевадиханда тавсия дода мешавад.

Ба корҳои таҷрибавӣ ва илмие, ки аз тарафи дигар олимон дар бораи усулҳои афзоиши технологияи парвариш, муҳлатҳои кишти хурмои кавказӣ ва нақшаи коштани тухми шинос шуда, дар шароити иқлим ва хоки минтақаи водии Ҳисор таҷриба гузаронидем. Ба хоҳири сарфа кардани майдони кишт дар ниҳолистон, аз ҳисоби такмил додани

нақшаи кишт ва зичии ниҳолҳо дар 1га. ба корҳои пешин гузаронида шуда, навигарӣ ва иловаҳо ворид намудем.

Таъсири зичии ниҳолҳо ба ғафсии тана, баланди ва шумораи сабзиши онҳо дар қитъаи таҷрибавӣ дар ҷадвали 3.1 оварда шудааст.

**Ҷадвали 3.1. - Таъсири зичии ниҳолҳо ба қутр, баландӣ ва шумораи сабзиш онҳо дар солҳои тадқиқот (2016-2018), ба ҳисоби миёна**

| Зичии тухми | Баланди см. | Қутр, см  | Шумораи тухмиҳои кошта, ҳазор адад | Шумораи ниҳоли сабзида (ҳазор), адад |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 70x15       | 125-135     | 1,13-1,25 | 95,2                               | 85,3                                 |
| 60x15       | 135-140     | 1,15-1,25 | 111,1                              | 97,7                                 |
| 60x10       | 130-140     | 1,15-1,25 | 166,6                              | 150                                  |

Чуноне ки аз ҷадвал 3.1 бар меояд, то имрӯз нақшаи муқаррар шуда, аз тарафи Б.Л. Массовир [88, с.31-32], нақшаи 70 x 30 дутогӣ растанӣ дар як чукрича, ё нақшаи 70x15 яктогӣ растани дар як чукрича, яъне аз ҳисоби зичии 95,2 ҳазор ниҳол дар 1га. тавсия дода шуда буд. Аз миқдори нақшавӣ (95,2 ҳаз. дона) дар таҷрибаи онҳо 85,3 ҳазор ниҳол дар 1га. сабзонида шуда буд, ки 81%-ро ташкил мекард. Инчунин дар се варианти интиҳобшуда баландӣ ва ғафсии тана қариб як хел сабзиш кардаанд, ин ба талаботи стандартӣ барои тағпайванд мувофиқ мебошад.

Мо ба мақсади сарфа намудани майдони кишт дар ниҳолхонаҳо аз ҳисоби зичии байни онҳо нақшаи 60x15 ва 60x10 см-ро илова кардем, ки дар натиҷа дар 1га аз ҳисоби нақшаи 60x15, 111,1ҳаз. ниҳол ва дар нақшаи 60x10 см, 166,6 ҳазор ниҳол дар 1га. ба нақша гирифта шуд.

Чуноне дар ҷадвал нишон дода шудааст, аз миқдори нақшавӣ дар варианти 2 –юм 97,7ҳаз. ниҳол ё ин ки 88%, дар варианти 3-юм 150ҳаз. ё ин ки 90% ниҳол сабзонида шуд. Мо сабаби зиёдтар сабзидани тухмиҳоро дар варианти 3 (90%) дар зичи ва мусоидаи ин зичи ба

бартараф кардани сафолаки хок дар давраи аввали сабзиши тухмиҳо мебинем, ки ба миқдори умумии ниҳолҳо мусоидат кард.

Ғафсии тана ва баландии қади ниҳолҳо вобаста аз таъсири зичи онҳо кам шавад ҳам, то зичии 60x10 аксари ниҳолҳо аз ҷиҳати ғафсии тана барои пайванд мувофиқ мебошанд. Мо барои санҷиши нақшаи 60x10 бо ду растани низ дар як ҷуғрича, санҷида дидем, ки ин меёри (333,3 ҳаз. ниҳол дар 1га.) шинонида аз ҳад зиёд буда, ниҳолҳо то давраи пайванд тайёр намешаванд. Ғафсии танайи ниҳолҳо 0,65 см-ро ташкил кард.

Чуноне, ки аз таҷриба бар меояд дар варианти 2, нақшаи 60x15 назар ба нақшаи то имрӯз тавсия дода шуда 70x15см 12,4 ҳаз. ва бо нақшаи 60x10 см- 64,7ҳаз. ниҳоли хасакӣ дар 1га. зиёдтар ниҳол сабзонидан мумкин аст. Ин миқдори ниҳолҳо ҳамчун тағпайванд барои навъҳои хурмои шарқӣ мувофиқ буда, ба талаботи стандарти ҷавобгу мебошанд.

Тарзи коштани тухмӣ аз он иборат аст, ки ҷӯякҳои байнашон 70-(60) x30; 70(60) x15 ва 60x10 кашида дар тегаи онҳо дар ҷуғрии 3-4см тухмиҳо кошта мешавад. Дар шароити водии Ҳисор аз ҳама муҳимаш ҳар ҳафта об мондан лозим. То 6-8 барги асоси пайдо шудан намнокии хоки ниҳолистон бояд муътадил бошад.

Охири моҳи июн ва аввали моҳи июл нурии нитрогенӣ аз ҳисоби 60кг моддаи таъсиркунанда дар 1га. дода шуд. Мисол нурии селитраи амоний 34% ҳисоби 176 кг, мочевина -130 кг. массаи физикавӣ лозим аст. Ин миқдори нуриро то 2-3 маротиба ба атрофи дарахтон ворид карда шуд. Хоки байни ҷӯякҳо доимо нарм ва аз алафи бегона тоза карда, корҳои агротехникӣ тибқи талабот риоя шуд, то ки, то давраи пайванди тобистона ё баҳорӣ зичии муътадили ниҳолҳо ва тайёр кардани онҳо барои гузаронидани пайванд.

**Ҷадвали 3.2. - Таъсири зичии тағпайвандҳо ба часпиши муғчаҳои пайванди дар солҳои тадқиқот (2016-2018)**

| Нақшаи зичии<br>ниҳолҳо см. | Шумораи ниҳолҳои<br>ба пайванд омода<br>дар 1га (ҳаз) | Ҷоизи<br>часпиши<br>муғчаҳо % | Шумораи<br>ниҳолҳои<br>пайванди дар<br>1га. (ҳаз) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 70x15(назорати)             | 85                                                    | 86                            | 73,3                                              |
| 60x15                       | 97                                                    | 88                            | 86,0                                              |
| 60x10                       | 150                                                   | 90                            | 136                                               |

Чуноне ки дар ҷадвали 3.2. дида мешавад то як андоза зичии ниҳолҳо ба часпиши ниҳолҳои пайванди таъсири мусбӣ мерасонанд. Дар таҷриба мо ба варианти пеш тавсияшуда 70x15см. нақшаи 60x15 ва 60x10- ро илова намудем, аз ҳисоби зичии ниҳолҳо дар як гектар теъдоди онҳоро нисбат ба варианти муқаррарӣ аз 12,7 то 61,7 ҳаз. ниҳол дар 1га. зиёд кардем. Риоя намудани технологияи парвариши ниҳол имконият медиҳад, ки то 80-90% ниҳолҳои стандартӣ истехсол шавад.

Дар шароити водии Ҳисор ва ба ин минтақа монанд, дар Тоҷикистон тарзи коштани тухмӣ ё донаки дарахтони мевадиханда гуногун мебошад. Оид ба зичии коштани тухмиҳои хурмо бо тарзҳои гуногун таҷриба гузаронида шудааст. Дарахти хурмо аз зироатҳои мебошад, ки ба об эҳтиёҷи калон дорад, Аз ҳамин лиҳоз нақшаи пешниҳод намудаи мо 60x10 см назар ба нақшаҳои пешина 70x15 ва 60x15 аз ҷиҳати афзоиш, шумора, часпиши муғчаҳои пайвандӣ ва шумораи ниҳолҳои пайвандӣ бартарӣ дорад. Сабаби асоси рушди ниҳолҳои аз тухмӣ кошта ин зичии ниҳолҳо мебошад, яъне дар ҳолати зичии ниҳолҳо бухоршавии об кам шуда, намии хок нигоҳ дошта мешавад.

**3.2. Сабзиш ва қадкашии ниҳоли навъҳои хурмои шарқӣ, вобаста аз тағпайванд**

Бо мақсади зиёд намудани навъу намунаҳои дурнамои дарахтони мевадиханда ва ба даст овардани ҳосили фаровону сифати хуби мева доштаро бо роҳи нашвӣ, аз пайвандкуни истифода мебаранд. Н.Г.

Ширяева, Б. С. Розанов, [171, с. 12-13]. Аз ҳамин лиҳоз, барои гузаронидани пайванд тағпайвандҳои мувофиқ ва дурнаморо барои минтақаҳои дилхоҳ интихоб намудан муҳим аст. Дар парвариши зироатҳои субтропикӣ, аз он ҷумла хурмои шарқӣ низ тағпайванд нақши асосиро мебозад. Ба сифати тағпайванд ниҳолҳои хурмои Кавказӣ— *Diospyros Iotus I* ва баъзан ниҳолҳои хурмои Виргиниро *Diospyros Viriniana I* истифода мебаранд, Б.Л. Массовер, [84, с. 7-8].

Ниҳолҳои хурмои кавказӣ –шохаҳои хурду решаҳои хуб инкишофёфта доранд, дар аснои шинондан дар ҷойҳои доимӣ нашъу нумуъи беҳтар доранд, ниҳолҳои хурмои виргинӣ бошанд, бо решаҳои худ фарқ мекунад, ва ба хушкию сармо устуворияти хуб дорад С. М. Животинская, [45, с.7-8].

Барои муайян кардани таъсири тағпайвандҳо ба сабзиши мугчаҳои пайвандӣ ва нашъу нумӯи ниҳолҳои навъҳои хурмои шарқӣ, ду намуди тағпайванд хурмои кавказӣ ва виргиниро истифода кардем. Дар ҳоҷагии таҷрибагии Сунбулаи шаҳри Ҳисори Институти боғпарварию сабзавоткории АИКТ, тухмиҳои хурмои кавказӣ ва виргиниро дар шароити яхела ва дар як муҳлат 10.02 то 06.04 зери қум хобонда баъд аз ду моҳ дар таърихи 10-уми. апрел дар қитъаи таҷрибавӣ, бо нақшаи 60 см x 20 см дар ду қатор, бо микдори 100 –донагӣ кишт намудем. Баъд аз як моҳ дар таърихи 10 май аз ҳок дар як вақт тухмиҳои кавказӣ ва ҳам виргинӣ неш зада баромаданд. Муҳлати гузаронидани кишти тухмиҳо ва дараҷаи сабзиши ниҳолҳои хасак дар ҷадвали 3.3. нишон дода шудааст.

**Ҷадвали 3.3. - Нишондодҳои сабзиши тухмиҳои хурмои кавказию виргинӣ дар солҳои тадқиқот, (2016-2018)**

| Тухмӣ   | Майса задани тухмӣ | Баландии ниҳол |       | Баланди ва қутри ниҳол |       |      |
|---------|--------------------|----------------|-------|------------------------|-------|------|
|         | сана               | сана           | см    | сана                   | h.см  | d.мм |
| Кавказӣ | 10/05              | 25.06          | 3,5-4 | 1.10                   | 35-40 | 5-7  |
| Виргинӣ | 10,11/05           | 25.06          | 3,5   | 1.10                   | 35-37 | 4-6  |


Аз ҷадвали 3.3. бармеояд, аз хок неш зада баромадан ва қадкашии тағпайвандҳои хурмоҳои кавказӣ ва виргинӣ қариб, ки аз якдигар фарқе надорад. Натиҷаи омӯзиши раванди қадкашии нишон дод, ки то охири давраи нашъунамо қадҳои ниҳолҳо мутаносибан ба 35-40 ва 35-37 см расид ва қутри тана ба 0,6-0,7 см баробар шуд. Барои гузаронидани пайванд дар тағпайвандҳои парваришкарда, қаламчаҳоро аз Стансияи таҷрибавии зироатҳои субтропикӣ ва ситрусии Институти боғпарварию сабзавоткорӣ АИКТ дар водии Вахш, н. Ҷ. Балхӣ буда, дастрас намуда, дар таърихи 21-22-уми апрели соли 2016 аз 8 навъу намунаҳо пайванд гузаронидем. Шумора ва натиҷаҳои муғчаҳои пайвандӣ, муғчаҳои сабзида ва фоизи сабзиши муғчаҳо дар ҷадвали 3.4. оварда шудааст.

**Ҷадвали 3.4. - Сабзиши чашмакҳои пайвандии навъҳои хурмои шарқӣ дар тағпайвандҳои хурмои кавказӣ ва виргинӣ дар солҳои тадқиқот(2016-2018)**

| Навъҳо             | Тағпайванди хурмои кавказӣ |                          |                | Тағпайванди хурмои виргинӣ |                          |                |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
|                    | муғчаҳои пайвандӣ, шумора  | муғчаҳои сабзида, шумора | Фоизи сабзиш % | муғчаҳои пайвандӣ, шумора  | муғчаҳои сабзида, шумора | Фоизи сабзиш % |
| Хиакуме (наз.)     | 10                         | 8                        | 80             | 10                         | 5                        | 50             |
| Зенджи-мари (наз.) | 10                         | 9                        | 90             | 10                         | 6                        | 60             |
| Шарқӣ              | 10                         | 10                       | 100            | 10                         | 7                        | 70             |
| Шоҳона             | 10                         | 10                       | 100            | 10                         | 7                        | 70             |
| Ваҳдат             | 10                         | 9                        | 90             | 10                         | 6                        | 60             |
| Вахш               | 10                         | 9                        | 90             | 10                         | 6                        | 60             |
| Тоҷикӣ             | 10                         | 6                        | 60             | 10                         | 4                        | 40             |
| Ҳисорӣ             | 10                         | 7                        | 70             | 10                         | 4                        | 40             |
| <b>Миёна</b>       | <b>80</b>                  | <b>65</b>                | <b>85</b>      | <b>80</b>                  | <b>44</b>                | <b>56,2</b>    |

Аз нишондодҳои ҷадвали 3.4. бар меояд, ки навъҳои хурмои шарқӣ дар омӯзиш қарордошта дар муқоиса бо навъҳои назоратӣ дар тағпайванди хурмои кавказӣ қобилияти часпиш ва сабзиши муғчаҳои пайвандӣ зиёд аст. Аз ҳар як навъ 10-тоғӣ муғча пайванд гузаронида, дар натиҷа сабзиши муғчаҳои пайвандӣ дар тағпайванди хурмои кавказӣ дар навъҳои омӯзишӣ 90-100 дар навъҳои назоратӣ 80-90% дар тағпайванди хурмои виргинӣ 60-70, мутаносибан 50-60%- ро ташкил кард. Баъд аз

гузаронидани пайванд ҳамаи чорабиниҳои агротехникӣ сари вақт таъмин карда шуда, ниҳолҳои пайвандкардашуда аз касалию зараррасонҳо ҳифз, карда шуд. Пас аз 25-28 рӯзи пайвандкунӣ тасмаҳои полиэтиленӣ пайвандро кушода, ба ҳисобгирии натиҷаи муғчаҳои сабзида гузаронида шуд. Шумораи умумии сабзиши муғчаҳои пайвандӣ қаноатбахш буда, дар тағпайванди хурмои кавказӣ 80% ва дар тағпайванди хурмои Виргини 51%-ро ташкил доданд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тағпайванди хурмои кавказӣ, ба сифати тағпайванд дар навъҳои омузишии хурмои шарқӣ дар минтақаҳои шароити водӣҳои Вахш ва Ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон бартарии зиёд дорад. Часпиши муғчаҳои пайвандӣ дар навъҳо (диаграммаи 3.1).



**Диаграммаи 3 1. - Сабзиши чашмакҳои пайвандӣ дар тағпайвандҳои гуногуни навъҳои хурмои шарқӣ( %)**

Аз диаграммаи 3.1. аён аст, ки сабзиш ва часпиши чашмакҳои пайванди дар тағпайванди хурмои кавказӣ бештар дар навъҳои Шарқӣ, Шоҳона 100 %, ва Зенчи- мари Ваҳдат ва Вахш 90% ҳамин нишондиҳанда дар тағпайвандӣ хурмои виргинӣ дар навъҳои Шарқӣ, Шоҳона 70 %, Зенчи- марӣ ва Ваҳдат 60 % нишон дода шуд. Дар умум навъу намунаҳо часпиши чашмакҳо дар тағпайванди хурмои кавказӣ 85% дар тағпайванди хурмои виргинӣ 56,2 %- ро ташкил дод. Аз ин бар меояд, ки

навъҳои омӯзиши ба тағпайванди хурмои кавказӣ мувофиқ мебошанд. Интихоби ин тағпайванд махсус барои минтақаҳои водии Ҳисор ва Вахш ва тавсия дода мешавад.

**Ҷадвали 3.5. -Сабзиш ва қадкашии навдаҳои навъҳои хурмои шарқӣ дар тағпайвандҳои хурмои кавказӣ ва виргинӣ, миёнаи (2016-2018)**

| Навъу намунаҳои хурмои шарқӣ | Қадкашии навдаҳои пайвандии хурмои шарқӣ, см |                                | Фарқи байни дарозии навдаҳо, см, + - |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                              | Дар тағпайванди хурмои Кавказӣ               | Дар тағпайванди хурмои Виргинӣ |                                      |
| Хиакуме                      | 85,0                                         | 80,0                           | -5,0                                 |
| Зенджи Мару                  | 80,5                                         | 53,0                           | -27,5                                |
| Шарқӣ                        | 100                                          | 50,0                           | -50                                  |
| Шоҳона                       | 92,0                                         | 67,0                           | -25                                  |
| Ваҳдат                       | 102,5                                        | 63,0                           | -41,5                                |
| Вахш                         | 80,2                                         | 60,6                           | -19,7                                |
| Тоҷикӣ                       | 75,0                                         | 68,0                           | -7,0                                 |
| Ҳисор                        | 55,0                                         | 53,5                           | -1,5                                 |
| Бо ҳисоби миёна              | 93,8                                         | 69,8                           | -24,0                                |

Чуноне аз ҷадвали 3.5. бармеояд, дар хурмои кавказӣ баландии ниҳолҳо аз 55 (навъи Ҳисор) то 102,5 см (навъи Ваҳдат) ва дар тағпайванди хурмои Виргинӣ аз 50,0 (Шарқӣ) то 68,0 см (навъи Тоҷикӣ) расида аст. Қадкашии навъҳои Ваҳдат, Шарқӣ, Шоҳона, Зенджи-мари, Хиакуме ва Вахш дар хурмои Кавказӣ нисбат ба хурмои Виргинӣ 20-50 см зиёдтар аст. Ин мувофиқати навъҳоро ба тағпайванд нишон медиҳад.

Сабзиши муғчаҳои пайвандӣ дар тағпайванди хурмои кавказӣ нисбат ба хурмои виргинӣ бартарии зиёдеро нишон дод, сабзиши муғчаҳои пайвандкардашуда 40% ва қадкашии навдаҳо ба ҳисоби миёна 20 см зиёд мебошад. Хурмои кавказӣ решаи серпанча дошта, ба сабзиши ҳуби ниҳолҳои пайвандӣ дар вақти шинонидан дар ҷои доимӣ мусоидат менамояд. Нашъунамои ниҳолҳо барвақт сар шуда, дер ба анҷом мерасад. Ин ба пура тайёршавии узвҳои нашвӣ барои гузаштан ба давраи оромӣ мусоидат мекунад. Он ҳамчун тағпайванд барои парвариши ниҳоли хурмо дар водии Ҳисор тавсия карда мешавад.

### 3.3. Муқоисаи ҳосили дарахтон хурмои шарқӣ вобаста аз тағпайванд

Барои муайян кардани таъсири тағпайвандҳо ба нашъу нумӯ ва ҳосилнокии ниҳолҳои навъу намунаҳои хурмои шарқӣ дар ду тағпайванд хурмои Кавказӣ ва Виргинӣ пайвадкардашуда истифода карда шуд. Дар хоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисори Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ АИКТ, дар 8 навъу намунаҳои хурмои шарқӣ; Хиакуме, Зенджи мару, Вахш, Шоҳона, Шарқӣ, Тоҷикӣ, Ҳисорӣ ва Ваҳдат, ки соли 2013 бо нақшаи 6x5 боғ бунёд шуда буд, таҷриба гузаронида шуд.

Дар таҷриба аз ҳар навъ 10- тоғӣ ниҳоли хурмои шарқӣ интиҳоб карда шуд, 80 дарахт дар тағпайванди хурмои кавказӣ ва 80 дарахт дар тағпайванди хурмои Виргинӣ чамъ дар 160 дарахти хурмои шарқӣ таҷриба гузаронида, натиҷаҳои он дар муҳлати се сол 2016-2018 чамъбаст карда шуд. Ниҳолҳое, ки мо барои таҷриба интиҳоб шуда буд бо нақшаи 6x5, дар чуқричаҳои кофташуда барои онҳо 4-5 кг поруи пӯсида ва 150 г суперфосфат андохта шуда буд. Ҳар сол то ба ҳосил даромадан, ниҳолҳо бо миқдори 120 кг нуриҳои азоти, 90 кг фосфори ва 60 кг калийги ба ҳисоби дар як гектар моддаи таъсиркунанда бо нуриҳои минералӣ таъмин мешуд. Меъёри обмони низ як хел, 600-650 м³/га. дар як обмони, то 8 маротиба обёри шудаанд. Решаи серпанҷаи хурмои кавказӣ, ки қобилияти хуби ҷабиши модаҳои органикию маъданӣ ва обро дорад, ба сабзиш ва ҳосилнокии хурмои шарқӣ мусоидат мекунад. Аммо вобаста ба тағпайванд ҳосили дарахтон тағйир меёбад (ҷадвали 3.6.).


**Ҷадвали 3.6. - Муқоисаи ҳосили дарахтони 3-5 солаи навъҳои хурмои шарқӣ вобаста аз тағпайванд, миёнаи (2016-2018)**

| Навъҳо             | Муқоисаи ҳосили ниҳолҳо               |                                       | Фарқи байни ҳосилнокӣ вобаста аз тағпайвандҳо кг +, - |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                    | тағпайванди хурмои кавказӣ, кг/дарахт | тағпайванди хурмои виргинӣ, кг/дарахт |                                                       |
| Хиакуме (наз.)     | 10,0                                  | 7,0                                   | 3,0                                                   |
| Зенджи –мару(наз.) | 11,5                                  | 7,5                                   | 4,0                                                   |
| Шарқӣ              | 15,2                                  | 10,2                                  | 5,4                                                   |
| Вахш               | 12,3                                  | 9,0                                   | 3,3                                                   |

**Идомаи ҷадвали 3.6.**

|                 |      |      |     |
|-----------------|------|------|-----|
| Ваҳдат          | 14,0 | 10,0 | 4,0 |
| Шоҳона          | 13,4 | 8,0  | 5   |
| Тоҷикӣ          | 9,0  | 6,0  | 3,0 |
| Ҳисорӣ          | 8,5  | 6,0  | 2,5 |
| Ба ҳисоби миёна | 11,7 | 7,9  | 3,8 |

Аз ҷадвали 3.6. мушоҳида мешавад, ки навъҳои омӯзиши вобаста аз тағпайванд дар тағпайвандҳои кавказӣ ва виргинӣ ҳосили онҳо низ тағйир меёбад; тағпайванди кавказӣ дар навъҳои Шарқӣ- 15,2, Ваҳдат- 14,0 ва Шоҳона 13,4кг, навъҳои номбурда дар тағпайванди виргинӣ -10,2 -10,0, ва 8,0 кг-ро ташкил дод (диаграммаи 3.2.).



**Диаграммаи 3.2. - Ҳосилнокии дарахтони хурмои шарқӣ вобаста аз тағпайванд, (кг) дарахтони 3-5 сола, (2016-2018)**

Аз нишондодҳои диаграммаи 2 бар меояд, ки ҳосилнокии навъҳои омӯзишӣ дар тағпаванди хурмои кавказӣ аз 12,3 (навъи Шоҳона) то 15,2кг (навъи Шарқӣ) дар навъҳои назоратӣ 10 (Хиакуме) ва 11,2 кг (Зенджи-мару) ба қайд гирифта шуд. Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки дар тағпайванди хурмои кавказӣ назар ба тағпайванди хурмои виргинӣ ҳосилнокӣ аз ҳар дарахт ба ҳисоби миёна дар се соли таҷриба 3,8 кг. ё 48% зиёд ба қайд гирифта шуд. Ин аз бартарии тағпайванди хурмои кавказӣ дар парвариши навъҳои хурмои шарқии дар омӯзиш қарордошта далолат медиҳад.

Инчунин нашъунамои ниҳолҳои дар ин тағпайванд барвақт саршуда, дер ба анҷом мерасад. Ин ба пура тайёршавии узвҳои нашвӣ барои гузаштан ба давраи оромӣ мусоидат мекунад. Тағпайванди мазкурро барои парвариши ниҳоли хурмо дар шароити водии Ҳисор тавсия карда мешавад.

### 3.4. Давраҳои гузариши фазаҳои фенологӣ

Дар шароити имрӯза таъмини амнияти ғизоӣ масъалаи муҳими рӯз дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки дар таъмини он истеҳсоли маҳсулоти мевагӣ мавқеи хоса дорад. Барои таъмини он зарур аст, ки роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва сифатнок гардонидани мева омӯхта ва такмил дода шавад.

Ҳосили дарахтони мевадиханда натиҷаи кори мураккаби барг ва реша мебошад. Бинобар ин дар дарахтони мевадиханда, ҳарсола пайдошавии навдаҳои дароз, ки бояд дар оянда ҳосил диҳанд зарур аст, Қадкашии навдаҳо дар давраҳои нашъу нумӯи солоне, ки қисми тартиби рушди инкишофи пурраи дарахтони мевадихандаанд мегузарад, А.Г. Миников, [92, с. 80]., А.С. Кутузова [75, с. 88]., А. Х. Мухамедов, Г. Дадожанов [99, с. 276].

Саршавӣ ва давомнокии фазаҳои фенологӣ вобаста ба хусусияти ирсии авлод ва навъ, шароити иқлими маҳал ва сатҳи гузаронидани чорабиниҳои агротехникӣ дар майдони боғ вобаста мебошад, В. А.-Колесникова, [66, с. 152], С.М. Животинская, [45, с. 7-8].

Хурмои шарқӣ, гарчанде дар шароити Тоҷикистон таърихи наҷандон дароз дошта бошад ҳам, яке аз меваҳои талаботи рӯз гаштааст. Лекин оид ба хусусиятҳои биологӣ ва вобаста ба онҳо гузаронидани чорабиниҳои агротехникӣ ва гирифтани ҳосили баланд маълумотҳо каманд. Аз ин рӯ дар давоми солҳои 2016-2018 дар қитъаи таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисор давраҳои қадкашии 8 навъу намунаҳои хурмои шарқӣ мувофиқи методикаи дар боғдорӣ қабулшуда зерин омӯзиш қарор доштанд, «Барнома ва усулҳои навъомӯзии дарахтони мевадиханда, буттамевагиҳо ва чормағзиҳо» – Орёл, 1999, [129, с. 310].

Баҳори соли 2013 дар хоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисор коллексияи 12 навъу намунаҳои хурмои шарқӣ дар тағпайванди хурмои кавказӣ пайванд шуда, аз рӯи нақшаи 6x5м бунёд карда шуд. Чорабиниҳои агротехникӣ (нармакунии беҳи дарахтон, шудгори байни каторҳо, шаклдихӯи шохбурӣ, ғизодиҳӣ, обмонӣ ва мубориза бар зидди касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон) мувофиқи технологияи парвариш, ҳар сол сари вақт гузаронида шуд.

Натиҷаи омӯзиши 3-сола нишон дод, ки таассури навъҳои хурмои шарқӣ ба обу ҳавои маҳал як хел набуда, байни худ тафовут доранд. Хурмои шарқӣ растании гармидӯст буда, ҳангоми ҳарорати шабонарӯзӣ аз 11 °C боло шудан афзоишаш сар мешавад. Дар охири моҳи феврал ва аввали моҳи март вобаста ба минтақа ва навъҳо варамкунии муғчаҳо ба назар намоён ва мушоҳида шуд. Гулкунии хурмо дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзии 19-20° C аз аввали моҳи май сар шуда, то охири даҳаи дуюми моҳи июн идома ёфт. Дергулкунии хурмо ин хусусияти фарқкунандаи арзишнок мебошад, чунки ба сабаби ин дарахтон аз хунокиҳои охири зимистону аввали баҳор бе осеб мебароянд. Санаҳои гулшукуфӣ ва пухтарасии мева низ вобаста аст аз ҳарорати сол, шароити иқлим ва навъҳо. Аз охири даҳрӯзаи аввал ва дар давоми 10 рӯзаи дуюми моҳи март кушодашавии муғчаҳо оғоз гардид (ҷадвали 3.7.) .

**Ҷадвали 3.7. Мушоҳидаҳои фенологии дарахтони 3-5 солаи навъҳои хурмои шарқӣ дар хоҷагии Сунбулаи шаҳри Ҳисор, миёнаи (2016-2018).**

| Навъҳои намунаҳо   | Аз оромӣ баромадан | гулшукуфӣ |        | Пухтани мева сана | Ҳазон-рез сана |
|--------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------|----------------|
|                    |                    | аввал     | охир   |                   |                |
| Хиакуме (наз.)     | 20.03              | 09.05.    | 20.05. | 03.11.            | 27.11.         |
| Зенджи мару (наз.) | 16.03              | 06.05.    | 19.05. | 11.10.            | 22.11.         |
| Шарқӣ              | 23.03              | 09.05.    | 21.05. | 30.10.            | 25.11.         |
| Шоҳона             | 16.03              | 03.05.    | 16.05. | 09.10.            | 17.11.         |
| Ваҳдат             | 17.03              | 05.05.    | 18.05. | 17.10.            | 18.11.         |
| Ваҳш               | 19.03              | 08.05.    | 20.05. | 29.10.            | 26.11.         |
| Тоҷикӣ             | 21.03              | 07.05.    | 19.05. | 29.10.            | 30.11.         |
| Ҳисорӣ             | 17.03              | 02.05.    | 15.05. | 19.10.            | 19.11.         |

Вобаста ба ин давраи аз оромӣ баромадани навъу намунаҳо дар се соли мушоҳидаҳо аз 16.03. дар навъҳои Зенджи- мару, намунаи Шоҳона ва дар навъҳои Хиакуме - 20.03, намунаи Тоҷикӣ 21.03. ва намунаи



**Расми 16. гулҳои наринаи хурмои шарқӣ**

Шарқӣ -23.03. мушоҳида карда шуд. Пухтарасии меваи дар намунаҳои Шоҳона- 09.10., навъи Зенджи мару 11.10. то дар навъҳои Шарқӣ - 30.10. ва Хиакуме 03.11. идома меёбад. Баъд аз як моҳ баъди пурра пухтарасии мева хазонрезӣ сар мешавад.

Аз натиҷаи тадқиқотҳои дар ҷадвали 3.7.

оварда шуда, маълум мегардад, ки навъу намунаҳои дар омӯзиш қарор дошта дар дарахтони 6-8 сола аз ниҳолҳои аз 3 - 5- сола аз 1 то 3 рӯз фарқ мекунанд. Навъу намунаҳои дар омӯзиш қарор дошта ба монанди навъҳои назоратӣ дар даврае аз оромӣ мебароянд (16-23.03.) ва гул мекунанд (03-20.05), ки сардихони таҳдидкунандаи баргарданда ба онҳо таъсири манфӣ намерасонад. Бо назардошти ин парвариши хурморо мо метавонем дар минтақаҳое, ки боришоти зиёд доранд ва сармои таҳдидкунанда, ба растанӣ осеб намерасонад баракси дарахтони шафтолу ва зардолу дар минтақаи Ҳисор тавсия диҳем.

Муғчагулҳо дар навдаҳое, ки дар шохчаҳои порсола сабзидаанд, пайдо мешаванд. Дарахти хурмо моҳҳои апрел-май гул мекунад. Гулҳо ба тавассути занбӯри асал ё дигар ҳашароти ба он монанд гардолуд мешаванд. Хурмои шарқӣ растаниест, ки дар навдаҳои соли чорӣ ташаккулёфта бор меоварад, ҳар як шохча одатан як бор навдаҳои мевадиханда медиҳад. Ин навдаҳо асосан дар қисми болоии шохҳои яксола, ки дарозии миёнашон 10-25 см аст пайдо мешаванд.

Гулҳои модина калон буда, одатан тоқа–тоқа баъзан гурӯҳ–гурӯҳ чой мегиранд. Косабаргаш калони гуногуншакл, рангаш сабз. Гулбаргаш ғафс, чигариранг. Гардбаргааш 6–15-то, нағз инкишоф

ёфтааст. Гӯрааш калон, 4 лона дорад. Гулҳои нарина нисбат ба гулҳои модина хурдтаранд. Онҳо маъмулан 3–5-тоӣ гурӯҳ-гурӯҳ ҷой мегиранд. Дар баъзе мавридҳо дар бағали ҳар барг яктоӣ низ ҷойгир шуданашон мумкин аст. Гулбаргаш сафеди зардтоб. Тухмдонаш инкишоф наёфтааст. Гардбаргаш 16–24-то буда, гарднайчаи инкишофёфта дорад.



**Расми 17. Гулҳои модинаи хурмои шарқӣ**

Гулҳои дучинса аҳён-аҳён дучор меоянд. Дар мобайни тӯдаи гулҳои нарина ҷойгир мешаванд.

Дар як дарахт фақат гулҳои модина ё нарина ва дар дарахти дигар ҳам гулҳои модина ва ҳам гулҳои нарина ба назар мерасанд. Меваи хурмо калон буда, 90-100 то 250-300 г ва зиёда аз он вазн дорад. Рӯи мева ҳамвор, дар бисёр мавридҳо бо мумпарда пӯшида шудааст. Пӯсти тунук ё гоҳо ғафс дорад. Меваи пухта расида зарди паст, сурх ва сурхи баланд мешавад. Гӯшти меваи хом саҳт аст. Гӯшти меваҳои пухтарасида полуда мемонад; рангаш зард, сурх ва ҳатто сиёҳтоб. Тухмаш паҳн, ҳар мева аз 1 то 8–10 дона тухм дорад. Меваҳои бетухм низ ҳастанд. Баъзе навъҳои хурмо бидуни гардолудшавӣ ҳосил медиҳанд (бо роҳи партенокарпӣ). Навъҳои хурмои гулашон гардолудшаванда (масалан, Хиакуми, Зенджи мару) нафақат ҳосили хуб медиҳанд, балки сифати меваашон низ баланд аст. Меваҳое, ки аз гули гардолудшуда ташаккул ёфтаанд, бармаҳал хӯрданбоб шуда, гӯшташон тираранг ва ҳатто сиёҳтоб мегардад. Навъҳои хурмои гӯшти меваашон сиёҳтоби ширинро «хурмои шоколадӣ» меноманд.

### **3.5. Омӯзиши муқоисавии фенологияи навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити минтақаҳои водиҳои Ҳисор ва Вахш**

Иқлими мусоид на танҳо ягона сабаби дар Тоҷикистон парвариши хурмои шарқӣ мебошад, инчунин он дорои микро, макро элементҳо ва витаминҳои зиёди фойданок мебошанд, ки онро духтури воқеии табиат меноманд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, хурмои шарқӣ амалан аз

сабаби дер гул карданаши дар муқоиса бо дарахтони зардолу ва шафтолу аз сардиҳои баҳорӣ, ё ин ки баргарданда осеб намебинад. ва даромаднокиаш бо муқоиса аз меваҳои себ ва нок дар як зина меистад. Дертар пухта расидан ва навъҳое, ки муҳлати нигохдориашон нисбатан дароз аст ҳамчун манбаи арзишманди ашеи хом барои саноати консервакунонӣ мебошад. Солҳои охир дар натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ тарзҳои гуногуни хушконидавро, аз навъу намунаҳои мувофиқ ба хушкунонӣ ба роҳ монда шуд, ки ин ҳам як даромади аз ҷиҳати иқтисоди арзанда мебошад.

Кушодашавии мугчаҳои хурмо дар даҳаи авали апрел дар баробарӣ 54° гармии умумии ғоиданок сар шуда ва дар даҳаи дуюми апрел тамош мешавад. Баргҳои наврустаи ҷавон дар миёнаҳои моҳи апрел кушодашавиро оғоз менамоянд (16.04.). Асоси пайдошавии баргҳо ба 18-апрел рост меояд. Гулҳои хурмо нарина, модина ва дучинса мешаванд. Гулшукуфии хурмо охири моҳи май дар ҳолати гармии умумии ғоиданок 298° оғоз ёфта дар миёнаи моҳи июн ба анҷом мерасад. Давраи гулшукуфи 15 рӯз давом мекунад. Гулшукуфии аввал 10-май ва аз ҳама дер 10 июн мушоҳида шудааст, П. М. Бушин, К.В. Василев ва дигарон, [12, с. 114].

Давраи оромии дарахти хурмо дуру дароз аст, бинобар ин ба хунокии дароз муддати 8–10 °C ва сармои кӯтоҳмуддати 18–20 °C низ тобовар аст.

Бинобар дер гул карданаши хунокиҳои охири баҳор ба хурмо зарар намерасонанд.

Зироатҳои субтропикӣ анор, хурмои шарқӣ дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзии наздики 20 °C гул мекунад, О.П. Кульков, С.М.Животинская, [70, с. 26], аммо баъзе намудҳои растаниҳои арктикӣ дар ҳарорати миёнаи 2,0- 2,5 C°, В. Ф. Шамурин, [169, с. 26].

Аз тарафи олим И. А. Бобиев [9, с. 8-10], муқоисаи давраҳои гузариши фенологии ду минтақа водии Вахш ва Ҳисор дар хурмои кавказӣ, ки бо хурмои Шарқӣ ҳамавлод мебошанд дар қори илмӣ-

тадқиқоти худ нишон додааст. Давраи пухтарасии меваи хурмои кавказӣ дар шароити ноҳияи Панҷ аз 15 октябр то 10 ноябр, дар боғи марказии ш. Душанбе аз 25 октябр то 15 ноябр дар шароити стансияи кӯҳии боғи ботаникии Варзоб аз 1 то 20 ноябр идома меёбад. Дарозии наваҳои яксолаи хурмо 55-85 см ташкил медиҳад. Дар давраи шаклгирии ва ғунчабандии мева ҳарорати ҳаво то 30 °C мерасад

Боғҳои коллексионе, ки мушоҳидаҳои муқоисавии фенологӣ гузаронида шудааст дар стансияи зироатҳои субтропикӣ ва ситрусии Ҷ. Балхӣ ва хоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисор соли 2010 бунёд шуда буд.

Тибқи мушоҳидаҳо варамкунии муғчаҳои хурмои шарқӣ вобаста аз навъу намунаҳо дар давраҳои солҳои тадқиқот ба ҳисоби миёна дар шароити водии Вахш Стансияи таҷрибавии зироатҳои субтропикӣ ва ситрусии ноҳияи Ҷ. Балхӣ аз 07-08. дар навъҳои Шоҳона ва Зенджи -мари то 14 март дар навъи Шарқӣ ва дар хоҷагии таҷрибавии «Сунбула»-и шаҳри Ҳисор дар навъҳои номбурда аз 18 то 25- юми март, дар ҳарорати миёнаи 10-12 °C ба қайд гирифта шуд. Кушодашавии муғчаҳои хурмои шарқӣ дар шароити Стансияи зироатҳои субтропикӣ н. Ҷ. Балхӣ аз 18.03. то 06.04. ва дар хоҷагии таҷрибавии Сунбула аз 01.04. то 11.04. қайд карда шуд. Баъд аз 5-6 рӯзи кушодашавии муғчаҳо баргҳо пайдо шуданд. Аз 25 то 10 апрел дар хоҷагии таҷрибавии Сунбула баъди аз 2-3 ҳафтаи кушодашавии баргҳо варамкунии муғчаҳои гули (бутоны) пайдо мешаванд.

Гулшукуфии хурмои шарқӣ дар шароити н. Ҷ. Балхӣ аз 25-юми апрел навъи Шоҳона то 13 –юми май навъи Шарқӣ ва дар хоҷагии таҷрибавии Сунбула (ХТС) дар навъҳои номбурда аз 05 то 23-уми май мушоҳида шуд. Авҷи гулшукуфии гулҳои модина 5-6 рӯз ва гулҳои нарина 2-3 рӯз пеш аз гулҳои модина шукуфта авҷи онҳо 10-12 рӯз идома меёбад.

Ҳарорати муътадил барои гулкунии хурмо 20- 22 °С, шумораи рӯзҳо аз варамкунии муғча то гулшукуфӣ 45-50 рӯзро ташкил намуда, ҷамъи ҳарорати ғоиданок 750-850 °С мебошад.

Давраи пухтарасии мева дар солҳои таҳқиқот дар шароити н. Ҷ.Балхӣ вобаста ба навъу намунаҳо аз 30-юми сентябр то 20-уми октябр ва дар х/т «Сунбула» бошад аз 10 октябр то 05 ноябр идома меёбад.

Давраи зардшавии баргҳои хурмои шарқӣ (D. kaki) аз охири моҳи ноябр то даҳаи якуми моҳи декабр идома меёбад. Дар ҳарорати 11,5 °С хурмои шарқӣ ба давраи оромӣ меравад (ҷадвали 3.8.).

Таҳқиқотҳои мо нишон доданд, ки рушду нумӯи дарахтон вобаста аз ҳоку иқлими минтақа гуногун мебошанд. Аз нишондодҳои давраҳои тақвими дар боло нишондодашудаи навъҳои гуногуни хурмои шарқӣ бар меояд, ки рушду нумӯи онҳо дар водии Вахш назар ба водии Ҳисор дида 10-11 рӯз барвақтар оғоз меёбад. Давраҳои нашъунамо дар водии Вахш ба ҳисоби миёна 265рӯз ва дар водии Ҳисор 245-250 рӯзро ташкил медиҳад.

Инчунин муайян карда шуд, ки нашъу нумӯ ва давраҳои фенологии дарахтони хурмо аз хусусиятҳои биологии навъҳо ва муҳити парвариши онҳо вобастаги дорад. Дарахти хурмо худ зироати гармидӯст буда, дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ 11-12° °С аз оромӣ баромада, айнан дар ҳамин ҳарорат ҳазонрезии дарахтон низ оғоз меёбад. Водии Вахш, ки нисбатан ҳарораташ ба водии Ҳисор гарм аст раванди бедоршавии дарахтон ва пухтарасии меваҳои хурмои шарқӣ барвақт оғоз меёбад.

Ҳадаф аз гузаронидани чунин таҳқиқот боз як бори дигар дар давраи дигаргун шудани иқлим аниқтар муайян намудани давраҳои фенологӣ, аз он ҷумла муҳлати гулкунӣ, давомнокии он дар водихои Вахш ва Ҳисор мебошад. Дар ҳамин асос мо метавонем вобаста ба давраҳои тақвими рафти корҳои селекионӣ, технологияи парвариш ва ҷорабиниҳои агротехникии хурмои шарқиро сари вақт тибқи талаботҳои дар боғдорӣ қабулшуда гузаронем.

**Чадвали 3.8. - Муқоисаи мушоҳидаҳои фенологӣ дар водиҳои Вахш ва Ҳисор дар солҳои тадқиқот  
даррахтони 6-8 сола, миёнаи (2016-2018)**

| Навъҳо                     | минтақа | Варамкунии<br>муғча | Кушодашавии<br>муғча |        | Гулшукуфӣ |        | пухтарасӣ | хазонрез |
|----------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
|                            |         |                     | аввал                | охир   | аввал     | охир   |           |          |
|                            |         |                     |                      |        |           |        |           |          |
| Хиакуме<br>(назоратӣ)      | Вахш    | 12.03.              | 26.03.               | 05.04  | 01.05.    | 13.05  | 20.10.    | 05.12.   |
|                            | Ҳисор   | 22.03.              | 06.04.               | 16.04  | 11.05.    | 22.05. | 05.11.    | 27.11    |
| Зенджи- мару<br>(назоратӣ) | Вахш    | 08.03.              | 20.03.               | 30.03. | 29.04.    | 09.05. | 02.10.    | 28.11.   |
|                            | Ҳисор   | 18.03.              | 31.03.               | 10.04. | 09.05.    | 20.05. | 12.10.    | 25.11.   |
| Шарқӣ                      | Вахш    | 14.03.              | 27.03.               | 6.04.  | 01.05.    | 13.05. | 16.10.    | 4.12.    |
|                            | Ҳисор   | 25.03.              | 08.04.               | 16.04. | 11.05.    | 23.05  | 01.11.    | 30.11    |
| Шоҳона                     | Вахш    | 07.03.              | 18.03                | 24.03. | 25.04.    | 08.05. | 30.09.    | 23.11.   |
|                            | Ҳисор   | 18.03.              | 29.03.               | 08.04. | 05.05.    | 18.05. | 10.10.    | 18.11.   |
| Ваҳдат                     | Вахш    | 08.03.              | 21.03.               | 29.03. | 27.04.    | 10.05. | 08.10.    | 22.11.   |
|                            | Ҳисор   | 18.03.              | 01.04.               | 09.04. | 07.05     | 20.05. | 18.10     | 18.11    |
| Вахш                       | Вахш    | 11.03.              | 24.03.               | 03.04. | 29.04.    | 11.05. | 17.10     | 30.11.   |
|                            | Ҳисор   | 21.03.              | 05.04.               | 14.04. | 10.05.    | 21.05. | 31.10.    | 26.11    |
| Тоҷикӣ                     | Вахш    | 13.03               | 25.03.               | 04.04. | 30.04.    | 10.05  | 18.10.    | 06.12.   |
|                            | Ҳисор   | 23.03               | 04.04.               | 14.04  | 09.05.    | 21.05. | 02.11     | 30.11.   |
| Ҳисорӣ                     | Вахш    | 09.03.              | 22.03.               | 31.03  | 25.04.    | 06.05. | 07.10     | 26.11    |
|                            | Ҳисор   | 19.03               | 01.04.               | 10.04. | 04.05.    | 16.05. | 20.10.    | 20.11.   |

Аз натиҷаи тадқиқотҳо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки баландшавии ҳарорати солонии ҳаво, хусусан дар водии Вахш дар давраи нашъу намо ба ташакулёбии мева монеъа мешавад. Дар водии Ҳисор бошад ҳаррати ҳаво назар ба водии Вахш пастар буда, боришоташ нисбатан ба ин водӣ зиёд мебошад. Дарахтони хурмо, ки барои афзоиш ва рушдашон шароит мусоид буд, мунтазам ҳар сол ҳосили дилхоҳ медиҳанд. Аз ҳамин лиҳоз барои хурмои шарқӣ шароити водии Ҳисор, назар ба водии Вахш мусоидтар мебошад.

Вобаста аз баландшавии ҳарорати солони аз таҳқиқотҳои солҳои пешин нишондодашуда, ки варамкуни муғчаҳои хурмои шарқӣ дар солҳои 1999- 2001 дар водии Вахш аз 15 то 22 март ва дар водии Ҳисор аз 23 март то 2 апрел бошад, Б. Л. Массовир., [82, с. 21-22], С. Ҳ. Раҳматов, [147, с. 28-31]. дар солҳои тадқиқоти мо дар водии Вахш аз 07 то 14-март ва дар водии Ҳисор аз 18 то 25 март ба қайд гирифта шуд. Яъне аз давраи ороми баромадани хурмои шарқӣ солҳои 2016-2018 назар ба солҳои пешин нишондодашуда, ба ҳисоби миёна 8 рӯз барвақтар фаро мерасад.

Инчунин барои гузаронидани корҳои селекционӣ давраҳои гулкунӣ, давомнокӣ ва фарқи гулҳои модина ва нарина ҳатми мебошад, чунки дар дурагакунии байни навъҳо ё намудҳо ин бениҳоят зарур аст.

### **3.6. Афзоиш ва рушди дарахтони навъҳои хурмои шарқӣ, вобаста ба минтақа дар водии Ҳисор ва Вахш**

Рушду нӯмуи дарахтони мевадиҳанда ва сифати меваи онҳо, хусусан хурмои шарқӣ вобастаги дорад аз нақшаи шинонидан, шароити маҳал ва минтақаи парвариш.

Муайян карда шудааст, ки дарахтони хурмо дар синни 25-солагӣ андозаи решаҳо ба дарозии то 770 см мерасанд, вале зиёда аз 70% (қисми асосии) решаҳо дар масофаи 200-250 см ҷойгир мешавад, А. П. Драгавцев, [41, с. 52-54].

Аз ҳамин лиҳоз мо нақшаи шинонидани дарахтони хурмо дар нақшаи 6x5 м, ки соли 2010 бунёд шудааст дар 8- навъ интиҳоб намуда,

дар ду минтақаи аз ҷиҳати хоку иқлим гуногун рушду нумӯи дарахтонро мушоҳида намудем. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки даҳсолаҳои охир вобаста ба тағйирёбии иқлим хурмои шарқӣ дар минтақаҳои иқлимашон субтропикии хушк рушду нумӯъ ва ҳосилнокиашон паст шуда истодааст. Баландии дарахтон ва қутри тана вобаста ба минтақаи парвариш дар ҷадвали 3.9. нишон дода шудааст.

**Ҷадвали 3.9. -Баландӣ ва қутри танай дарахтони хурмои шарқӣ вобаста аз минтақаи парвариш, дарахтони 6-8 сола, миёнаи (2016-2018)**

| Навъ                         | Минтақа | Баландии дарахт, м |      |      |       | Қутри тана, см |      |      |       |
|------------------------------|---------|--------------------|------|------|-------|----------------|------|------|-------|
|                              |         | 2016               | 2017 | 2018 | миёна | 2016           | 2017 | 2018 | миёна |
| Хиакуме<br>(назоратӣ)        | Вахш    | 2,74               | 2,95 | 3,30 | 3,00  | 14,1           | 16,3 | 19,8 | 16,7  |
|                              | Ҳисор   | 3,87               | 4,44 | 4,45 | 4,34  | 26,8           | 32,9 | 41,7 | 33,8  |
| Зенджи<br>мару<br>(назоратӣ) | Вахш    | 3,07               | 3,27 | 3,60 | 3,30  | 17,8           | 19,5 | 22,2 | 19,8  |
|                              | Ҳисор   | 3,89               | 4,33 | 4,62 | 4,28  | 25,4           | 32,4 | 39,3 | 32,4  |
| Шарқӣ                        | Вахш    | 2,54               | 2,80 | 3,10 | 2,80  | 14,6           | 16,3 | 18,4 | 16,4  |
|                              | Ҳисор   | 3,91               | 4,47 | 4,81 | 4,40  | 25,7           | 33,0 | 40,3 | 33,0  |
| Ваҳдат                       | Вахш    | 2,88               | 3,09 | 3,30 | 3,10  | 21,2           | 23,7 | 27,6 | 24,1  |
|                              | Ҳисор   | 4,09               | 4,65 | 4,96 | 4,60  | 26,9           | 33,6 | 41,7 | 34,1  |
| Шоҳона                       | Вахш    | 3,17               | 3,30 | 3,45 | 3,30  | 16,3           | 17,5 | 20,2 | 18,0  |
|                              | Ҳисор   | 3,66               | 4,21 | 4,50 | 4,12  | 23,4           | 29,4 | 37,3 | 30,03 |
| Вахш                         | Вахш    | 2,62               | 2,81 | 3,22 | 2,88  | 12,1           | 14,3 | 17,8 | 14,73 |
|                              | Ҳисор   | 3,71               | 4,35 | 4,46 | 4,17  | 22,8           | 30,9 | 39,7 | 31,13 |
| Тоҷикӣ                       | Вахш    | 3,11               | 3,24 | 3,40 | 3,25  | 13,5           | 14,3 | 17,5 | 15,1  |
|                              | Ҳисор   | 3,45               | 4,18 | 4,40 | 4,01  | 23,8           | 29,9 | 39,7 | 31,13 |
| Ҳисорӣ                       | Вахш    | 3,0                | 3,11 | 3,38 | 3,16  | 19,5           | 21,3 | 25,4 | 22,06 |
|                              | Ҳисор   | 3,27               | 4,18 | 4,32 | 3,92  | 23,9           | 31,3 | 39,5 | 31,56 |

Чуноне, ки аз чадвали 3.9. бар меояд ченкунии биометрӣ дар дарахтони навъу намунаҳои хурмои шарқӣ дар стансияи таҷрибавии зироатҳои субтропикӣ ва ситрусии ноҳияи Ҷ.Балхӣ, баландии дарахт дар навъи Шарқӣ 2,8 м, Зенджи-мару 3,3 м ва хоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисор, навъи Шарқӣ 4,4 м, Зенджи мару 3,3 м; қутри тана мутаносибан дар хоҷагии таҷрибавии Сунбула навъи Шарқӣ 16,4 см, навъи Ваҳдат 27,6 см, дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ навъи Зенджи мари 32,4 см, навъи Ҳиакуме 33,8 см-ро ташкил медиҳад. Шароити минтақаи водии Ҳисор аз сабаби зиёд будани миқдори боришоти солона ва ҳарорати муътадил имконият медиҳад, ки дар баробари баландии дарахтон ва қутри тана, шохсор ва дарозии навдаҳои солона афзоиш ёбанд, Чадвали 3.10.

**Чадвали 3.10. - Қутри шохсор ва дарозии навдаҳои яқсолаи дарахтони 6-8 солаи навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисору Вахш, миёнаи (с. 2016-2018)**

| Навъҳо                            | минтақа | Паҳноии шохсор, м |      |      |       | Дарозии навдаҳои яқсола, см |      |      |       |
|-----------------------------------|---------|-------------------|------|------|-------|-----------------------------|------|------|-------|
|                                   |         | 2016              | 2017 | 2018 | миёна | 2016                        | 2017 | 2018 | миёна |
| <b>Ҳиакуме<br/>(назоратӣ)</b>     | Вахш    | 2,06              | 2,25 | 2,59 | 2,30  | 31,2                        | 20,0 | 34,0 | 28,1  |
|                                   | Ҳисор   | 3,01              | 3,59 | 3,95 | 3,52  | 51,6                        | 55,0 | 28,0 | 44,9  |
| <b>Зенджи-мару<br/>(назоратӣ)</b> | Вахш    | 2,54              | 2,75 | 3,04 | 2,80  | 24,7                        | 20,0 | 28,2 | 24,3  |
|                                   | Ҳисор   | 2,90              | 3,37 | 3,54 | 3,27  | 39,3                        | 49,0 | 23,0 | 37,1  |
| <b>Шарқӣ</b>                      | Вахш    | 1,79              | 2,03 | 2,35 | 2,10  | 39,0                        | 23,8 | 32,1 | 31,3  |
|                                   | Ҳисор   | 3,12              | 3,32 | 3,70 | 3,38  | 45,7                        | 54,0 | 31,7 | 43,8  |
| <b>Ваҳдат</b>                     | Вахш    | 2,49              | 2,71 | 2,96 | 2,70  | 23,4                        | 21,7 | 24,3 | 23,1  |
|                                   | Ҳисор   | 2,98              | 3,49 | 3,83 | 3,43  | 54,3                        | 45,3 | 25,8 | 41,8  |
| <b>Шоҳона</b>                     | Вахш    | 2,40              | 2,65 | 2,95 | 2,66  | 24,7                        | 20,0 | 28,2 | 24,3  |
|                                   | Ҳисор   | 2,70              | 3,60 | 3,40 | 3,23  | 39,3                        | 49,0 | 23,0 | 37,1  |
| <b>Вахш</b>                       | Вахш    | 2,49              | 2,71 | 2,96 | 2,72  | 23,4                        | 21,7 | 24,3 | 23,1  |
|                                   | Ҳисор   | 2,98              | 3,49 | 3,83 | 3,43  | 54,3                        | 45,3 | 25,8 | 41,8  |
| <b>Тоҷикӣ</b>                     | Вахш    | 1,05              | 1,80 | 2,25 | 1,70  | 39,0                        | 23,8 | 32,1 | 31,6  |
|                                   | Ҳисор   | 2,80              | 3,15 | 3,60 | 3,18  | 45,7                        | 54,0 | 31,7 | 43,8  |
| <b>Ҳисорӣ</b>                     | Вахш    | 1,15              | 1,68 | 2,20 | 1,67  | 37,0                        | 26,8 | 29,1 | 30,9  |
|                                   | Ҳисор   | 2,65              | 2,90 | 3,30 | 2,95  | 42,0                        | 51,2 | 28,5 | 40,5  |

Аз чадвали 3.11. аён аст, ки дарозии навдаҳои яксола дар водии Вахш навъи Вахдат 23,1 см, навъи Шарқӣ 31,3 см ва дар водии Ҳисор навъи Ҳиакуме 44,9 см, навъи Вахдат 41,8 см-ро таъкил медиҳад. Дар таҷрибаи мазкур нишондодҳои беҳтарин, новобаста аз навъ дар водии Ҳисор ба қайд гирифта шуд. Аз ҳамин лиҳоз барои бунёди боғҳои хурмои шарқӣ хусусан навъҳои дар омӯзиш қарор дошта Шарқӣ, Шоҳона, Вахш ва Вахдат рушду нумӯи дарахтони хурмои шарқӣ дар минтақаи водии Ҳисор беҳтар ҳисобида мешавад, чунки барои заминагузоштани муғчаҳои гули маҳз дарозии навдаҳо бояд 30-50 см-ро таъкил диҳад. Мувофиқи хусусиятҳои биологӣ хурмои шарқӣ дар сини 6-7 солаги дар навъҳои, ки ҳосилшон кам аст, навдаҳои 30-35 см-ро бисёр кӯтоҳ кардан тавсия дода намешавад. Дар ҳолати баракс кӯтоҳ кардани навдаҳо ҳосилнокӣ паст мегардад ва дар дарахтони ҷавон камҳосили мушоҳида мешавад, Н. Г. Закиров, [75, с. 28].

**Сабзиш ва қадкашии навдаҳои солони.** Дар хурмои шарқӣ ба монанди дигар дарахтони мевадиханда ду давраи сабзиш ва қадкашии навдаҳои солони мушоҳида мешавад. Афзоиши навдаҳо яке аз нишондиҳандаҳо мебошад, ки аз марҳилаҳои алоҳидаи мавсимӣ вобаста мебошад. Чуноне, ки Д.П. Семаш аз натиҷаи тадқиқотҳои худ маълумот медиҳад, вақте ки дарахтон ба ҳосилдихӣ шурӯъ мекунанд, чи қадаре, ки мӯҳлати давраи нашъунамои навдаҳо дарозтар шавад, ҳосил ҳамон қадар зиёд мешавад, М.Д. Семаш, [152, с. 163].

Динамикаи нашъунамои навдаҳо бештар ба шароити обу ҳаво вобаста аст, на ба мавҷудияти намии хок қайд намудааст олим В.А. Колесников, [65, с. 190], лекин М. Д. Мокаин, [94, с. 140], гуфтааст, ки ғизои маъданӣ ва намӣ барои баланд бардоштани нашъунамо ва ҳосилнокии дарахт шароити мусоид фароҳам меорад. Дар тадқиқот дарахтони 6-8 сола нишон дода шудааст, дарахтон дар давраи ҳосилдихӣ мебошанд. Дар ҳамаи растаниҳо хусусан дар дарахтони мевадиханда ду

давраи сабзиши навдаҳо дар мавсими рушду нумӯи онҳо мушоҳида мешавад.


Пас аз пайдо шудани баргҳои аввал қадкашии якуми навдаҳо сар шуда, то гулшукуфӣ давом мекунад. Ин давра 6-7 ҳафтаро дар бар мегирад. Пас аз 20-25 рӯзи кушодашавии мугчаҳо гунчабандии гул оғоз гардида, гулшукуфӣ аз 10 то 22- 23 май давом мекунад, ки бо саршавии гулшукуфӣ қадкашии аввали навдаҳо қатъ мегардад (ҷадвали 3.11.).

**Ҷадвалии 3.11.- Сабзиш ва қадкашии навдаҳои солони навиҳӯиҳурмон шарқӣ дар шароити водии Ҳисор дар солҳои тадқиқот, дарахтони 6-8 сола миёнаи, (2016-2018)**

| Навиҳу намунаҳо | Давраи аввали сабзиш |                        | Давраи дуюми сабзиш |                   |
|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|                 | Оғози сабзиш, сана   | Қатъшавии сабзиш, сана | Оғози сабзиш сана   | Охири сабзиш сана |
| Ҳиакуме         | 19.03                | 01.05                  | 08.07               | 03.10             |
| Зенҷи мару      | 17.03                | 11.05                  | 09.07               | 14.10             |
| Шарқӣ           | 24.03                | 13.05                  | 09.07               | 13.10             |
| Шоҳона          | 25.03                | 8.05                   | 02.07               | 12.10             |
| Вахш            | 24.03                | 10.05                  | 06.07               | 02.10             |
| Ваҳдат          | 16.03                | 5.05                   | 07.07               | 0 4.10            |
| Тоҷикӣ          | 16.03                | 9.05                   | 30.06               | 30.09             |
| Ҳисорӣ          | 23.03                | 4.05                   | 08.07               | 06.10             |

Аз маълумотҳои ҷадвали 3.11. бар меояд, ки қадкашии навиҳӯи хурмон шарқӣ дар давраи якум 41-55 рӯз давом карда, ба ҳисоби миёна навдаҳо аз 21,5 то 30,5 см қад кашидаанд.

Қадкашии давраи дуюм дар навиҳӯ аз 2-уми моҳи июл (Шоҳона ) ва 6-уми июл (Вахш) сар шуда, то 13.10. (Шарқӣ) ва 14 октябр (Зенҷи-мару) давом мекунад, ки ин давра 91 рӯз дар навиҳи (Вахш) ва 113 рӯз (Зенҷи мару)-ро ташкил мекунад, инчунин дарозии навдаҳои солони вобаста ба навиҳӯ гуногун аст (диаграммаи 3.3).



**Диаграммаи 3.3.- Дарозии навдаҳои солони навҳои хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисор дар солҳои тадқиқот, миёнаи (2016-2018), см**

Чи гунае, ки дар диаграммаи 3 давраи 1-уми қадкашии навдаҳо аз (кушодашавии муғчаҳо) 9.03 сар шуда, дар давраи гулшукуфӣ қатъ мегардад. Давраи 2-юм аз 10 рӯзи 3-юми моҳи июн сар мешавад. Дар маҷмӯъ навҳо дар давраи нашъу нумӯ ба ҳисоби миёна аз 23,5 то 55,2 см қад кашидаанд, ки барои ҳосилшавии муғчаҳои ҳосилдиханда кифояанд. Дарахтон дар давраи қадкашии навдаҳо ба ғизо ниёз доранд, яъне қадкашии аввали навдаҳо кушодашавии муғчаҳо ва давраи дуум бошад даҳаи сеюми моҳи июн мебошад.

### **3.7. Устуворияти навҳои хурмои шарқӣ ба ҳарорати пасти ҳаво.**

Ба сармотобоварии навъу намунаҳо дар шароти саҳро ҳар сол зерӣ тадқиқот қарор гирифта аз рӯи чадвали 5-хола (0-5) баҳогузорӣ карда мешавад.

Ба сармоҳои беаҳали аввали баҳорӣ навдаҳои мевагии бо об таъмин набуда, тобоварии худро паст мекунад. Агар намӣ кофӣ бошад, муғчаҳо тобавар шуда, ба гул ва пусти растанӣ камтар таъсир мерасонад, В.К. Смыков, [154, с. 26].

Дар тадқиқоти М.А.Соловьев, Ф.Кобель ва як қатор дигар олимон муқаррар карда шудааст, ки речаи дурусти обёрӣ дар майдони боғ, тобоварии дарахтонро ба сармо зиёд намуда, ба сари вақт гузоштани ташаккули хуби растанӣ ва мева мусоидат мекунад. Онҳо зарурияти

дифференсиатсияи объёриро нишон медиҳанд, ки дар он нимаи аввали мавсим, нашъунамои ниҳолҳо каме баландтар ва дар дуюм бошад каме паст, вобаста аз намии замин таъмин карда мешаванд М.А. Соловьева [158, с. 8-11]., Ф. Кобель, [63, с. 374].

Давраи оромии дарахти хурмои шарқӣ дуру дароз аст, бинобар ин вай муддати дароз ба хунукии  $8-10^{\circ}\text{C}$  тоб оварда, ба сармои кӯтоҳмуддати  $18-20^{\circ}\text{C}$  низ бардошт мекунад. Навъҳои дар Тоҷикистон ноҳиябандишуда Хиакуме, Гошо-гаки ва Зенджи мару мебошанд. Дар водиҳо дар баъзе ноҳияҳое, ки ҳарорати ҳаво аз  $-18-20^{\circ}\text{C}$  паст мешавад ин навъҳо ба хунуки тоб намеоранд. Бо ҳамин мақсад ин навъҳоро дар нишебҳои аз шамол паноҳ ва аз хунукиҳои саҳт эмин шинонидан лозим аст, Госагропром Таджикский ССР, [27, с. 3].

Дарахтони субтропикӣ анор ва хурмои шарқӣ дар ҳарорати миёнаи рӯзонаи гармии  $20^{\circ}\text{C}$  ба гулшукуфӣ оғоз менамояд, ки ин ба аввали моҳи май ва аввали моҳи июн рост меояд. Бинобар дер гул кардани хунукиҳои охири баҳор ба хурмои шарқӣ зарар намерасонанд.

Меваҳои хурмои шарқӣ барои саломатии инсон аҳамияти калон доранд. Парвариши дарахтони хурмо барои минтакаи субтропикии намнок хело ҳам самаранокии хуб дорад.

Дар минтақаҳои хушк дорои иқлими континенталӣ ва хушксолии тобистон, хурмо ба об эҳтиёҷи зиёд дорад. Ба сармо тобовар будани хурмои шарқӣ ба ғайр аз хусусиятҳои биологӣ, инчунин ба чорабиниҳои агротехники, аз ҷумла, таъмин намудани намии хок вобаста аст. Дар шароити заминҳои обӣ омили намии замин комилан дар дасти одам аст. Ин омил дар парвариши навъҳои ба сарди тобовар ва дарахтони мевадиҳанда аҳамияти калон дорад. Хурмои шарқӣ дар соли шинонидан, махсусан дар 2-3 моҳи аввали мавсими обёрии фаровонро талаб мекунад. Дар солҳои минбаъда бо инкишофи системаи решаи растаниҳо микдори обёрӣ то андозае кам мешавад, аммо барои таъмини

нами торафт меъёри обмони зиёд гашта шуморааш кам мегардад, Б. Л. Массовер, В.П Буряков, [82, с. 21-22].

Баъзе олимони нишон медиҳанд, ки иқтидори баланди обнигоҳдорӣ яке аз омилҳои зимистонгузаронӣ дар дарахтон мебошад, С. Товкач, [159, с. 151].

И. В.Мичурин нишон дод, ки ҳатто дар шароити замини хуб бо ғизо таъминшуда, аммо бо роҳи танзими намнокии замин наваҳои ба сармотобоварро ба вуҷуд овардан мумкин аст. Имконияти васеи танзими речаи об ҳангоми парвариши ниҳолҳо барои тобоварӣ ба сардӣ бояд ба назар гирифта шавад ва васеъ истифода шавад, А.М. Кормилицин, [67, с. 76].

Дар асоси ин таҳлилҳо мо таъсири намнокии хокро ба сармотобоварии ниҳолҳои хурмои шарқӣ омӯхта, хулоса бароварда шуд, ки яке аз омилҳои ба сармо устувор будан дар даври зимистон таъмини намнокии хок дар давраи афзоиш мебошад.

Дар давраи нашъунамо ба ниҳолҳо 12 маротиба бо варианти якум об дода шуд, меъёри обёри 600-650 м³ - ро ташкил дод. Дараҷаи зарар бо истифода аз усули ҳолгузорӣ аз 0-5 баҳо дода шуд.

Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, ки дар шароити водии Ҳисор речаи обёрии 12 маротиба бо меъёри 600-650 м³/га ниҳолҳои наваҳои гуногуни хурмои шарқӣ бомуваффақият ва баробар нашъунамо меёбанд. Намии хок бо «тензиометр» чен карда шуд. Дар таҷрибаи варианти якум дар қитъаи обёришаванда дар тамоми дарози (бо чуқурии 0-40 см) дар моҳҳои июн, июль ва август ақрабаки тензиометр намнокии муътадили хокро 100 — 350 hPa (18-25 %) нишон дод, ки чунин намнокӣ барои ниҳолҳо натиҷаи беҳтарин медиҳанд. Дар давраи оромӣ низ намнокии хоки қитъаи таҷрибавӣ ниҳолҳо муътадил буд.


Басармотобоварии хурмои шарқӣ аз речаи обмонӣ дар давраи афзоиш вобастагии калон дорад, таҷриба дар ду вариант гузаронида шуд, дар варианти 1-ум, дар давраи афзоиш намнокии хок муътадил буд, яъне 12 -маротиба ва дар варианти 2-юм 4- маротиба обёри карда шуд.

Дар ин чуқурии хок нами дар моҳҳои июнь, июль ва август кифоя набуд, аз руи ҷадвали тензиометр намии хокро 350 — 450 hPa (9-12 %) нишон дод. Дар зимистони солҳои 2016-2017, бо сардиҳои кӯтоҳмуддат 12-13 °С, ниҳолҳои варианти дуюм назар ба варианти якум бисёртар осеб دیدанд. Чунон ки мушоҳида карда шуд намнокии хок дар вариантҳо тағйир меёбад, байни намнокии муътадил ва норасоии нами дар хок. Ин мутаносибан ба давраи равандҳои афзоиш дар растаниҳо таъсир мерасонад (ҷадвали 3.12.).

**Ҷадвали 3.12. - Меёри, миқдори обёри, устуворияти ниҳолҳои навъҳои хурмо шарқӣ ба сардиҳои кӯтоҳмуддат, миёнаи (2016-2018) ниҳолҳои 3-5 сола**

| Навъҳо               | Варианти 1                             |            | Варианти 2                             |            | Баҳои навъҳо, дараҷаи зарар, ҳол миёна |
|----------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                      | Меёри ва шумораи обмони. 500-600 м³/га | миёна, ҳол | Меёри ва шумораи обмони. 500-600 м³/га | миёна, ҳол |                                        |
| Хиакуме (наз.)       | 12                                     | 1,7        | 4                                      | 3,3        | 2,5                                    |
| Зенджи мару (наз.)   | 12                                     | 1,5        | 4                                      | 3,0        | 2,2                                    |
| Шарқӣ                | 12                                     | 0,25       | 4                                      | 2,0        | 1,1                                    |
| Шоҳона               | 12                                     | 1,25       | 4                                      | 2,5        | 1,8                                    |
| Вахш                 | 12                                     | 0,4        | 4                                      | 2,15       | 1,2                                    |
| Ваҳдат               | 12                                     | 0,5        | 4                                      | 2,25       | 1,3                                    |
| Тоҷикӣ               | 12                                     | 1,7        | 4                                      | 4          | 3,6                                    |
| Ҳисор                | 12                                     | 0,4        | 4                                      | 3,8        | 2,1                                    |
| <b>дар вариантҳо</b> | <b>12</b>                              | <b>0,9</b> | <b>4</b>                               | <b>2,8</b> | <b>1,8</b>                             |

Аз ҷадвали 3.12. бармеояд, ки устуворияти навъҳо ба сармо дар варианти 1-ум, дар давраи афзоиш, ки намнокии хок дар сатҳи 70-75 % намиғунҷоиши хок буд, яъне 12 маротиба обёри дар давраи сарди зимистон 10-11°С, дараҷаи зарари ин вариант 0,9 ҳол, дар варианти 2-юм, ки 4- маротиба обёри шуда, буд дараҷаи зарар 2,8 ҳол-баҳогузорӣ шуд. Дараҷаи зарари навъҳои хурмои шарқӣ дар алоҳидагӣ ба ҳисоби миёна дар диаграммаи 3. 4.



**Диаграмаи 3.4.- Дараҷаи осеббинии навъҳои хурмои шарқӣ аз сармо (2016-2018)**

Аз диаграммаи 3.4. бар меояд, ки осеби камтар аз сармо дар умум аз навъҳо дар ҳар ду вариант навъҳои Шарқӣ-1,1, Ваҳш -1,2 ва Ваҳдат - 1,3 навъҳои Хиакуме-2,5, Зенджи мару -2,2 ҳол баҳогузори гардид, ки ин ба сармо тобоварии навъҳои омӯзиширо исбот менамояд.

Дар варианти дуюм ба ниҳолҳо дар давраи нашъунамо ба меъёри камтар 500-600 м³/га 4 маротиба об дода шуд. Норасоии об дар қитъаи камобъёришаванда махсусан дар давраи нашъунамо равшан зоҳир мегардад, ки дар чуқурии хок (0-40 см), ки қисми асосии реша дар он ҷойгир аст, бештар мушоҳида шуд.

Омӯзиши речаи бо об таъмин намудани ниҳолҳои навъу намунаҳои хурмои шарқӣ гувоҳи аз он медиҳад, устуворияти онҳоро ба сарди баланд бардорем. Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, таъмин намудани речаи обмонӣ дар баробари нашъунамои ниҳолҳо ба сармо тобовар будани онҳоро таъмин мекунад. Намнокии муътадили хок ба зимистонгузаронии ниҳолҳо дар давраи сармоҳои кӯтоҳмуддат мусоидат мекунад. Дарахтони ба ҳосил даромадаи хурмои шарқӣ навъҳои ноҳиябанди шуда, ба ҳарорати пасти дуру дарози - 15-17°C бе осеб мебароянд. Дар ҳарорати пасти -18-20°C наваҳои яқсола ва баъзан бисёрсола аз хунукӣ осеб мебининд. Сардиҳои таҳдидкунанда ба ин навъҳо -21-22 °C мебошад. Навъу намунаҳои олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзаваоткорӣ АИКТ бароварда, аз он ҷумла Ваҳш, Ҳисорӣ, Тоҷикӣ, Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат ва ғайра мебошанд, ки то ба сардиҳои кӯтоҳмудати -24-25°C тобовар буда, ба ҳосилнокии онҳо низ таъсир мерасонад.

Дар боғи коллексионӣ, ки соли 2010 бунёд шуда, буд, дараҷаи аз сармо осеббинии навъҳо дар се соли нишондодашуда, дар зимистони соли 2016-2017 фақат аз хунукиҳои моҳи ноябр осеб диданд. Дар ин муҳлат дарахтон пурра ба оромӣ нагузашта буданд, сардии ҳаво бошад аз -10 то -13°C омада расид, (ҷадвали 3.12.).

**Ҷадвали 3.13. - Дараҷаи аз сармо осеббинӣ ва таъсири он ба ҳосили навъҳо дар хоҷагии Сунбулаи шаҳри Ҳисор, миёнаи (2016-2018).**

| Навъҳо              | Дараҷаи зарар аз сармо ва ҳосилнокӣ | Солҳои мушоҳида ва сину соли дарахтон |        |        | Миёна |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-------|
|                     |                                     | 2016                                  | 2017   | 2018   |       |
|                     |                                     | 6 сола                                | 7 сола | 8 сола |       |
| Хиакуме (наз.)      | хол                                 | 3,2                                   | 0      | 0      | 1,1   |
|                     | кг/дарахт                           | 20                                    | 41     | 48     | 36,3  |
| Зенджи- мару (наз.) | хол                                 | 3,5                                   | 0      | 0      | 1,1   |
|                     | кг/дарахт                           | 18                                    | 38     | 55     | 37    |
| Шоҳона              | хол                                 | 3,2                                   | 0      | 0      | 1,0   |
|                     | кг/дарахт                           | 10                                    | 45     | 62     | 39    |
| Вахш                | хол                                 | 3,2                                   | 0      | 0      | 1,01  |
|                     | кг/дарахт                           | 24                                    | 45     | 57     | 42    |
| Шарқӣ               | хол                                 | 3                                     | 0      | 0      | 1,0   |
|                     | кг/дарахт                           | 22                                    | 42     | 63     | 42,3  |
| Ваҳдат              | хол                                 | 3                                     | 0      | 0      | 1,0   |
|                     | кг/дарахт                           | 21                                    | 48     | 50     | 39,6  |
| Тоҷикӣ              | хол                                 | 4                                     | 0      | 0      | 1,3   |
|                     | кг/дарахт                           | 20                                    | 40     | 47     | 35,0  |
| Ҳисорӣ              | хол                                 | 4                                     | 0      | 0      | 1,3   |
|                     | кг/дарахт                           | 8                                     | 38     | 56     | 34    |
| Дар ҳамаи навъҳо    | хол                                 | 3,3                                   | 0      | 0      | 1,1   |
|                     | кг/дарахт                           | 17,8                                  | 42,1   | 54,7   | 38,2  |

Дар ҷадвал 3.13. дараҷаи осеббинӣ, яъне устуворияти баланд ба сармо навъҳои Шоҳона-1,0, Шарқӣ -1,0, ва Ваҳдат 1,0, нисбатан пасттар Ҳисорӣ ва Тоҷикӣ 1,3 хол муайян шуд. Ҳосилнокӣ аз ҳар дарахт ба ҳисоби миёна дар навъҳои Шарқӣ 42 кг, Вахш 42 кг, Ваҳдат 39,6, Шоҳона 39 нисбатан пасттар навъҳои Тоҷикӣ 35кг ва Ҳисорӣ 34 кг-ро ташкил доданд. Дарахтон дар ин давраи афзоиш устуворияташон ба хунукӣ ниҳоят паст мешавад, наваҳои яқсола пурра аз хунукӣ осеб дида хушк шуданд. Дар натиҷаи гузаронидани чораҳои агротехникӣ дар давраи афзоиш дарахтон аз нав нава бароварда ба қадри имкон ҳосил доданд.

## **БОБИ 4. Таъсири омилҳои обу иқлим ба сифат, ҳосилнокии ва таркиби мева**

### **4.1. Таъсири ҳарорати баланд ба сифати мева**

Гармии ғаёл барои хурмои шарқӣ 3000-3500<sup>o</sup>C мебошад. Дар гармии 17-18<sup>o</sup>C наждаҳои хурмои шарқӣ нағз инкишоф ёфта, дар 20-22<sup>o</sup>C гарми бошад ба гулшукуфи сар мекунад А.Д. Микаладзе, [91, С.288].

Аз меёр баланд будани ҳарорат низ ба дарахту буттаҳои мева таъсири манфӣ мерасонад. Дар ин ҳолат меваҳо нобаробар калон ва муҳлати пухтарасиашон гуногун, тағрез ва хурди бадтаъм шуда рангу бўяшон тағйир меёбад. Ҳангоми муддати дароз боқи мондани ҳарорати баланд 35-40<sup>o</sup> C бофтаҳо тафсида, мева пӯсти нажда ва шоху танаи дарахт захмдор мешавад. Ҳарорати муътадил барои инкишофи хуб 20 то 30<sup>o</sup>C мебошад Ф. Урунов, С.М. Гулов, [162, С.36-37].

Дар бисёре аз дарахтони мевадиханда, пайдошавии муғчаҳои гулӣ, бештар дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзии аз 15-20<sup>o</sup> C боло сар мезанад, лекин ҳарорати аз меёр баланд, (аз 35<sup>o</sup>C боло) дар ин раванд таъсири манфӣ мерасонад. Ҳарорати муътадил барои ин раванд 18-25<sup>o</sup> C мебошад Б.Л. Витковский [14, С. 207]. Мисол дар ноҳияҳои водигӣ – бештар дар вилоятҳои Қурғонтеппа ва ҷануби Кӯлоб (ҳозира вилояти Хатлон) ҳарорати ҳаво дар ҳолати мудати тӯлонӣ то 40<sup>o</sup> C баробар шудан, нашъу намои растаниҳо паст шуда, ҷамъшавии қанд дар мева боз меистад А.Ф. Брудная [11. С.18].

Барои хурмои шарқӣ ба монанди дигар растаниҳо, шароит барои нашъу нумуи муътадил ва маҳдуд вучуд дорад, ки инро аз хусусиятҳои биологии навъ ва таъсири муҳити беруна муайян карда мешавад. Наждаҳои хурмои шарқӣ максимум то ҳарорати 25-35<sup>o</sup>C дароз шуда, аз 8<sup>o</sup>C поён шудан боз меистад, аз 40<sup>o</sup> C баланд шудан дар наждаҳо пажмурдашавӣ ба назар мерасад, И. А. Загребельный, [49, С.18-21].

Яке аз тарафҳои муҳиме, ки ҳолати шидатнокро дар растаниҳо муайян мекунад, таносуби пигментҳои сабз ба каротиноидҳо мебошад - чӣ қадаре ки он паст бошад, растанӣ ҳамон қадар зарба меҳурад, зеро

таркиби каротиноидҳо мустақиман аз гармонҳои стресс - кислотаи абсизи вобаста аст В.В. Полевой, [128, С.464].

Дар бисёре аз дарахтони мевадиханда, пайдошавии мугчаҳои гули, бештардар дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзии аз 15-20 ° С боло сар мезанад, лекин ҳарорати аз меёр баланд, (аз 35°C боло) дар ин раванд таъсири манфӣ мерасонад. Ҳарорати муътадил барои ин раванд 18-25 ° С мебошад Б.Л Витковский, [14, С. 207]. Мисол дар ноҳияҳои водигӣ – бештар дар минтақаҳои Қурғонтеппа ва Кӯлоб (ҳозира вилояти Хатлон) ҳарорати ҳаво дар ҳолати мудати тӯлонӣ то 40° С баробар шудан, нашъу намои растаниҳо паст шуда, чамъшавии қанд дар мева боз меистад А.Ф Брудная, [11. С.18].

Натиҷаи омӯзиши 3-сола нишон дод, ки таассури навъҳои хурмои шарқӣ ба обу ҳавои маҳал як хел набуда, байни худ тафовут доранд. Дар ҳар ду минтақа, водии Ҳисор ва Вахш ҳангоми ҳарорати шабонарӯзӣ аз 11 С ° боло шудан афзоишаш сар мешавад. Азбаски хурмои шарқӣ меваи субтропикӣ мебошад, ба намнокии зиёд эҳтиёҷ дорад, аз ҳамин лиҳоз барои ҳосили ниҳои ба даст овардан, мо дар ду минтақаи аз ҷиҳати ҳарорат ва миқдори солони боришот гуногун корҳои илмӣ – тадқиқотӣ гузаронидем.

Тибқи мушоҳидаҳо дар солҳои тадқиқот 2016-2018, баландшавии ҳарорати ҳаво ва боришоти кам дар давраҳои рушду нумӯи дарахтон назар ба солҳои пешин дида ба қайд гирифта шуд. Шумораи обёрии дарахтони хурмои шарқӣ дар ин солҳо зиёдтар карда шуд. Дар қитъаи таҷрибавии ноҳияи Ҷ. Балхӣ резиши меваҳо, инчунин вазни меваҳо кам гаштанд, бо назардошти ин ҳосилнокӣ низ кам шуд. Дар водии Ҳисор аз он ҷумла дар қитъаи таҷрибавии «Сунбула» аз сабабе, ки дар давраҳои афзоиши дарахтон то даҳаи дуюми моҳи апрел боришот ба қайд гирифта шуда буд ва ҳарорати ҳаво нисбатан пастар будан дар муқоиса бо ноҳияи Ҷ. Балхӣ вазну ҳаҷми меваҳо ва ҳосилнокӣ тағйир ёфт.

#### 4.2. Сабабҳои рехтани меваҳои хурмои шарқӣ ва чораҳои пешгирии он



**Расми 18. аз меъёр зиёди обмонӣ**

То имрӯз дар Тоҷикистон зиёда аз бист навъу намунаҳои хурмои шарқӣ, ки дорои хусусиятҳои гуногуни биологӣ ва истеҳсоли мебошанд парвариш карда мешаванд. Навъҳои то ҳарорати манфии – 24 C° ба сармо тобовар, аз ҷумла навъҳои баровардаи сермахсули олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ: Шарқӣ, Тоҷикӣ, Хисор, Вахш, Шоҳона ва ғайра мебошанд. Боғдорон боварӣ доранд, ки бо нигохубини хуб хурмо бояд ҳар сол ҳосили баланд диҳад. Сабабҳои рехтани хурмо ҳам табиӣ, ва ҳам ногаҳонӣ мешаванд. Мушкилотро на танҳо дар рехтани меваҳо, балки дар набудани меваҳо низ ифода кардан мумкин аст ва сабабҳо низ метавонанд якхела бошанд. Сабабҳои эҳтимоли: хатогихо дар идоракунии кишоварзӣ, набудани гардолудкунанда, тағирёбии ногаҳонии ҳарорат, бемориҳо, ҳашароти зараррасон ва обдиҳӣ.



**Расми 19. Таъсири гармӣ ва беоби ба сифати мева**

Микдор ва сифати гарди як навъ, ба ҳолати дарахт вобаста буда, сол то сол фарк мекунад. Пас аз як соли ҳосили фаровон додан на танҳо гулҳои занона, балки гулҳои нарина низ шумораашон кам мешаванд. Гардҳо дар аввали гулкунӣ самараноктаранд. Барои таъмин намудани гардолудкунии хушсифати дарахтон тавсия дода шудааст, ки дар боғҳои саноати бо таносуби навъҳои асосӣ 75-80 дарахт 20-25% навъҳои гардолудкунанда шинонда шаванд.

Дар солҳои 3-5-ум ҳангоми ҳосилбандии аввалин ба ҳар як дарахт соле як маротиба нуриҳои маъданӣ (массаи физикӣ) 300 гр азот, 200 гр

фосфор, 120 гр калий ва 8-10 килограмм нуриҳои органикӣ ворид карда шуд.

Пас аз боронгариҳои баҳорӣ, обдиҳии мунтазами боғҳои хурмои шарқӣ бояд анҷом дода шавад (1- маротиба дар май, 3- маротиба дар моҳҳои июн, июл ва август, 2 – маротиба дар моҳи сентябр) О.П. Кульков, [68, С.26-27].

Тадқиқотҳои С.М. Животинская муқаррар кардааст, ки дар шароити Ўзбекистон дар хурмо гулу ғураҳо рехта хеле кам мешавад. Одатан, дар як дарахти 7-10-сола 5-10 ҳазор гул ба вучуд меояд, ки аз он 1 - 30% мемонад. Баъзан дар сурати кам будани гул, ҳосили мева ба 80-90% мерасад. Ҳамин тавр, дар ноҳияи Денави вилояти Сурхандарёи Ҷумҳурии Ўзбекистон 80—90%-и гул дар навъи Хиакуме, дар навъи Зенджи мару 30—60% мерезанд. Муаллиф қайд мекунад, ки дар вилояти Намангон гулҳои самаровар дар навъи Хиакуме қариб 20 фоизро ташкил медиҳад ва гулҳо бисёртар дар моҳи май мерезад. Асосан рехтани ғураҳо дар моҳҳои июн - июл ва мавҷи дуюм бошад дар моҳи август рух медиҳад. Гулҳо ва ғурахое, ки нашъунамояшон суст аст, инчунин дарахтоне, ки миқдори зиёди гулу мева доранд, хеле мерезанд С. М. Животинская, [45, С.7-8].

Тавсия дода мешавад, ки дар боғҳо шинонидани якчанд навъҳои гардолудкунанда (аз ҷумлаи навъҳои аз чихати биологи ба шароити маҳал бештар мутобиқшуда) ба мақсад мувофиқ буда, исбот шудааст, ки рехтани ғураҳо кам гашта ҳосилнокӣ баланд мегардад, Б. Л. Массовер, [84, С.7-8].

Дар давраи хушксолии тобистон ва набудани намӣ дар хок, меваҳои нопухтаи хурмо аз моҳи июн то август ва ҳатто дар моҳи сентябр мерезад, хусусан агар меваҳо бе гардолудшавӣ пайдо шуда, бошанд Г.Т.Гутиев, [35, С.164].

Хурмои шарқӣ, ба хурмои кавказӣ пайванд карда шуда, ба хушкӣ нисбатан тобовар аст. Дар соли 1957 дар давраи хушксолии шадиди

баҳору тобистон, ки 160 рӯз давом кард, зарари ночизе дид, ки бо андаке рехтани баргҳо ва тухмдонҳо ифода мешуд, дар ҳоле ки дигар зироатҳои субтропикии он сол хеле зарар дида, ҳосили паст доданд, А.С. Мосияш, [95, С. 98-100].



**Расми 20. Намнокии муътадил дар дарахтони хурмои шарқӣ**

Хурмои кавказӣ, ки системаи решааш хело хуб инкишофёфта ва дорои муяккешаҳои зиёд мебошад барои хокҳои сабук ё санглох дар нишебиҳо мувофиқтар аст. Хусусиятҳои номбурда дар хурмои виргинӣ дида намешавад, тиррешааш рост буда, решаҷаҳои паҳлуиаш ба осонӣ нобуд мешаванд, ки ин дар хокҳои вазнин ва намнок бештар мувофиқ меояд.

Аммо хурмои шарқӣ ба намии зиёдатӣ тобовар набуда, боиси бармаҳал рехтани меваҳо мегардад ва вақте ки оби зери замини баланд мешавад, дарахт хушк мешавад, С. М. Животинская, [45, С.7-8].

Маълум аст, ки калий тургории (пураги, таъмини намӣ) ҳуҷайраи растаниро таъмин мекунад. Норасоии калий боиси гум шудани он мегардад. Транспирация зиёд мешавад, тобоварӣ ба хушкӣ кам мешавад. Аломатҳои зардшавии байни рағҳои барг ва доғҳои зарду қаҳваранг дар баргҳои поёни инчунин, дар канори баргҳо ва нуг-нуғи онҳо хлороз пайдо мешавад, «Барнома ва усулҳои навъомӯзии дарахтони мевадиханда, буттамевагиҳо ва чормағзиҳо» [129, С.310].

Тадқиқотҳо давоми се сол (2016-2018) дар хоҷагии таҷрибавии Сунбулаи шаҳри Ҳисор гузаронида шуд. Дар тағпайванди хурмои кавказӣ 8 навъу намунаи хурмои шарқӣ (Хиакуме, Зенжи-мару, Ваҳдат, Шарқӣ, Вахш, Шоҳона, Тоҷикӣ ва Ҳисорӣ) аз 8 навъ 10 дарахти интихоб шуда, дар 80 бех ҳосилнокӣ ва ғоизи рехтани ғураҳо муайян карда шуд. Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, ки варианти бехтарини истифодаи 11 обёрӣ бо меёри 850—1000 м³/га, дар заминаи ворид намудани

нуриҳои органикию минералӣ бо навъи гардолудкунандаи Зенджи - мару мебошад, ки дар он рехтани меваҳо 8-15 % ташкил дод. маълумоти тадқиқот дар ҷадвал оварда шудаанд.

Тағйирёбии якбораи ҳарорати ҳаво низ яке аз сабабҳои ҳосили пасти дарахти хурмо, рехтани мева ё умуман ғураҳо мегардад. Аз ин рӯ ниҳолҳо бояд дар ҷойҳои офтобруя аз шамол паноҳ ва заминҳои обёришаванда шинонида шавад (ҷадвали 4.1.).

Аз ҷадвали 4.1. бармеояд, ки дар варианти якум дар сурати 10 маротиба об додан рехтани мева 8-15 %-ро ташкил дод, дар варианти дуюм-аз кам шудани обёрӣ (4 маротиба) рехтани меваҳо то 50-70 фоиз афзуд, дар варианти сеюм аз зиёд шудани обмонӣ (15-маротиба), рехтани меваҳо 30-50 фоизро ташкил дод. Инчунин аз баландшавии ҳарорати ҳаво рехтани меваҳо дар ҳолати норасоии об мушоҳида шуд. Аз тадқиқотҳои гузаронидаи мо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки навъҳои зери омӯзиш қарор дошта, яке аз сабабҳои рехтани меваҳо ин гардолуд нашудан, норасоии ғизо ва аз ҳама асос ин норасоии об дар давраи ташакулёбии мева мебошад. Бояд қайд кард, ки обёрии аз меёр зиёд ҳам сабаби рехтани меваҳои хурмои шарқӣ мегардад.

Дар ҳамаи вариантҳо соли 2017 дар водии Ҳисор ҳарорати миёнаи ҳаво нисбатан баланд аз 1-уми апрел то 1 -уми октябр ҳарорати миёнаи моҳона 22 ° С-ро ташкил дод, ки рехтани меваҳо аз 5 то 10% нисбати солҳои дигар зиёд буд.

**Ҷадвали 4.1. - Меъёри обёрӣ, нуриҳои минералӣ ва органикӣ, ҷамъи ҳарорат, ҳосил ва ғоизи рехтани меваҳои хурмои шарқӣ дарахтон 3-5 сола, дар солҳои тадқиқот (с2016-2018).**

| Ғизо ва обёрӣ                            | I-вариант     |             |               | II-вариант    |             |               | III-вариант   |             |               |
|------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                          | 2016          | 2017        | 2018          | 2016          | 2017        | 2018          | 2016          | 2017        | 2018          |
| Меъёри обмонӣ,<br>м³/ га                 | 850-1000      | 850-1000    | 850-1000      | 850-1000      | 850-1000    | 850-1000      | 850-1000      | 850-1000    | 850-1000      |
| Шумори обмонӣ                            | 10            | 10          | 10            | 4             | 4           | 4             | 15            | 15          | 15            |
| нитроген, кг/га                          | 110-120       | 110-120     | 110-120       | 110-120       | 110-120     | 110-120       | 110-120       | 110-120     | 110-120       |
| Фосфор, кг/га                            | 90-110        | 90-110      | 90-110        | 90-110        | 90-110      | 90-110        | 90-110        | 90-110      | 90-110        |
| Калий, кг/га                             | 50-60         | 50-60       | 50-60         | 50-60         | 50-60       | 50-60         | 50-60         | 50-60       | 50-60         |
| Нуриҳои органикӣ,<br>кг/дарахт           | 8-10          | 8-10        | 8-10          | 8-10          | 8-10        | 8-10          | 8-10          | 8-10        | 8-10          |
| Ҷамъи ҳар. миё. аз<br>1.04.то 1.10. °C,  | 151<br>(21,5) | 154<br>(22) | 134<br>(19,1) | 151<br>(21,5) | 154<br>(22) | 134<br>(19,1) | 151<br>(21,5) | 154<br>(22) | 134<br>(19,1) |
| Ҳосилнокӣ ба<br>ҳисоби миёна,<br>кг/дар. | 3,5           | 18          | 25            | 2             | 8           | 12            | 5             | 10          | 15            |
| Рехтани меваҳо,<br>%                     | 8-10          | 10-15       | 8-10          | 55-65         | 60-70       | 50-60         | 30-40         | 30-40       | 35-50         |

Дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти худ мо тавсия медиҳем, ки барои нигоҳ доштани ҳосили хурмо тадбирҳои зерини агротехникӣ истифода бурда шавад.

- маҳдуд кардани қувваи афзоиши дарахтони ҷавон, ки бо афзоиши босуръати навдаҳо хосанд.

- бинобар ин, дар 3 соли аввал нашъунамои навдаҳои солоне зиёд мешаванд.

Ин барои зиёд шудани массаи сабз ва тезонидани воридшавӣ ба марҳилаи мевадиҳӣ кӯмак мекунад. Пас аз 3-4 соли чунин амалҳо, хурмо ба ҳосил медарояд.

- дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани намии хок. Азбаски аксари навҳои хурмо дар давраи гулшукуфӣ ва ҳосилбандии он (июль-август) ба хушксолии хуб тобовар нестанд, обмонии фаровонро талаб мекунанд.

- Барои пешгирии аз хушк шудани хок, аторфи танаи дарахтро бо қабати ғафси (10 см) аррамайда, хошоки растанӣ ё поруи пӯсида рӯйпуш (мулчи) кардан лозим аст.

#### **4.3. Ҳосилнокии ва сифати меваи навҳои хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисор ва Вахш**

Маҳсулотнокии хурмои шарқӣ дар ду води; - Ҳисор ва Вахш ба қайд гирифта шудааст. Дар водии Вахш дар стансияи зироатҳои субтропикӣ дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ ҷойгир буда, дар водии Ҳисор бошад дар хоҷагии таҷрибавии «Сунбула»- шаҳри Ҳисор, ки аз маркази шаҳри Душанбе 30 км дар тарафи ғарб ҷойгир аст. Чорабиниҳои агротехникӣ дар ҳар ду қитъаҳои таҷрибавӣ якхела (нармакунии беҳи дарахтон, шудгори байни қаторҳо, шаклдиҳию шохбурӣ, ғизодиҳӣ, обмонӣ ва муборица бар зидди касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон) мувофиқи технологияи парвариш, ҳар сол сари вақт гузаронида шудаанд.

Меваи хурмо пас аз бордоршавӣ ҳаҷм ва вазнашон зиёд мешавад. Ду давраи афзоиши ҳаҷми меваи хурмо вучуд дорад: даврае, ки афзоиши мева суст (июн-июл), ки афзоиши ҳаҷми мева ночиз буда, дар як семоҳа

ба 61x72 см<sup>3</sup> баробар аст ва афзоиши интенсивӣ (август-октябр) афзоиши ҳаҷми мева, дар семоҳаи дигар, вобаста ба навъ 123 x 284 см<sup>3</sup> – ро ташкил медиҳад Н.Г. Загиров, 47, С.28].


Хурмои шарқӣ, гарчанде ба касалиҳо ва зараррасонҳо устуворияти баланд дошта бошад, дар солҳои тадқиқот муайян карда шуд, ки дар давраи ташакулёбии мева аз норасоии нами, хусусан дар моҳҳои май-июл меваҳо то андозае хурд мешаванд. Соли 2017 аз сабаби кам будани боришот ва ҳарорати баланд назар ба солҳои 2016, 2018 меваҳои дарахтон нисбати солҳои нишон додашуда, ҳаҷмашон хурд шуданд, аз ҳамин ҳисоб ҳосилнокӣ низ паст шуд. Вазн ва шумораи мева ба монанди дигар зироатҳо аз шароит барои нашъу нумуи муътадил, хусусиятҳои биологӣ навъ ва таъсири муҳити беруна вобастаги дорад. Бо назардошти ин ҳаҷм ва шумораи мева дар минтақаҳои тадқиқот якхела набуда нишондиҳандаҳои гуногун ба қайд гирифта шуд (ҷадвали-4.2.).

**Ҷадвали 4.2. - Вазн ва шумораи мева дар як дарахти хурмои шарқӣ вобаста аз навъ ва минтақа ба ҳисоби миёна дар дарахтони 8-сола, (2016-2018)**

| Навъ                   | Вазни як мева, г. |      |      |      |       | Шумораи мева дар дарахт, дона |      |      |       |
|------------------------|-------------------|------|------|------|-------|-------------------------------|------|------|-------|
|                        | минтақа           | 2016 | 2017 | 2018 | миёна | 2016                          | 2017 | 2018 | миёна |
| Хиакуме (назоратӣ)     | Вахш              | 180  | 143  | 230  | 184,3 | 158                           | 135  | 140  | 144   |
|                        | Ҳисор             | 196  | 156  | 241  | 197,6 | 245                           | 186  | 361  | 264   |
| Зенджи-мару (назоратӣ) | Вахш              | 92   | 81   | 101  | 91,3  | 300                           | 151  | 304  | 251   |
|                        | Ҳисор             | 99   | 89   | 110  | 99,3  | 280                           | 262  | 362  | 301   |
| Шарқӣ                  | Вахш              | 168  | 135  | 186  | 163   | 221                           | 54   | 206  | 160   |
|                        | Ҳисор             | 177  | 144  | 195  | 172   | 303                           | 186  | 517  | 335   |
| Шоҳона                 | Вахш              | 168  | 81   | 191  | 146   | 165                           | 139  | 162  | 155   |
|                        | Ҳисор             | 159  | 90   | 200  | 149   | 270                           | 266  | 375  | 303   |
| Ваҳдат                 | Вахш              | 131  | 116  | 146  | 131   | 188                           | 120  | 208  | 172   |
|                        | Ҳисор             | 140  | 125  | 155  | 140   | 393                           | 264  | 552  | 403   |
| Вахш                   | Вахш              | 115  | 105  | 124  | 115   | 262                           | 236  | 306  | 268   |
|                        | Ҳисор             | 124  | 114  | 135  | 124   | 431                           | 443  | 460  | 444   |
| Тоҷикӣ                 | Вахш              | 158  | 144  | 191  | 164   | 184                           | 66   | 154  | 134   |
|                        | Ҳисор             | 168  | 155  | 200  | 174   | 203                           | 133  | 168  | 168   |
| Ҳисорӣ                 | Вахш              | 68   | 60   | 105  | 78    | 360                           | 178  | 303  | 280   |
|                        | Ҳисор             | 75   | 67   | 102  | 81    | 410                           | 352  | 374  | 378   |

Чи тавре аз чадвали 4.2. маълум мегардад дар ҳама навъҳои хурмои шарқӣ вазн ва шумораи онҳо дар як дарахт вобаста аз минтақа гуногун аст. Вобаста ба минтақа навъҳои омӯзишии мо дар водии Вахш дар навъҳои Вахш -268, Шарқӣ -167 мева дар як дарахт ва дар водии Ҳисор ин нишондод дар навъҳои мазкур мутаносибан ба 444-335мева дар як дарахт мебошад, ки барои дарахтони 6-8 сола кифоя аст. Вазн ва шумораи меваҳо дар навъҳои дар омӯзиш қарор дошта Шарқӣ, Шоҳона, Вахш ва Ваҳдат ҳам дар водии Ҳисор ва Вахш фарқияти мусбӣ доранд, лекин дар минтақаи водии Ҳисор, ки шароити обу ҳавояш барои парвариши хурмои шарқӣ мувофиқ мебошад, назар ба водии Вахш дида бартарӣ дорад.

Ҳисоби миёнаи вазни меваи навъҳои хурмои шарқӣ дар диаграммаи 4.1. оварда шудааст.



**Диаграммаи 4.1. - Вазни меваи навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисор ва Вахш, г. (2016-2018),**

Аз нишондоди диаграммаи 4.1 маълум мегардад, ки вазни навъҳои хурмои шарқӣ вобаста аз шароити иқлими маҳал гуногун мебошад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки навъҳои дар омӯзиш қарордошта, вазни миёнашон, навъи Вахш дар водии Вахш -115г дар водии Ҳисор-124 г ва навъи Шарқӣ 163 ба172 г буда, ба талаботи бозор ҷавобгӯӣ мебошанд.

Натиҷаи омӯзиши 3-сола нишон дод, ки таассури навъҳои хурмои шарқӣ ба обу ҳавои маҳал як хел набуда, байни худ тафовут доранд. Хурмои шарқӣ растании гармидӯст буда, дар ҳар ду минтақа, водиҳои Вахш ва Ҳисор ҳангоми ҳарорати шабонарӯзӣ аз 11 ° С боло шудан афзоишаш сар мешавад. Хурмои шарқӣ, ки меваи субтропикӣ мебошад, ба намнокии зиёд эҳтиёҷ дорад, аз ҳамин лиҳоз барои маҳсулотнокии ниҳои ба даст овардан, мо дар ду минтақаи аз ҷиҳати ҳарорат ва миқдори солони боришот гуногун корҳои илмӣ – тадқиқотӣ гузаронидем.

Ниҳолҳои пайвандии хурмои шарқӣ қисми онҳо соли дуюм ва қисми дигарашон соли сеюм, баъд аз шинонидан дар боғ ба мевадихӣ оғоз намудаанд. Ҳаҷми меваҳо дар давраи ҷамъоварӣ дар водиҳои Ҳисор нишондодҳои зерин доштанд: навъи Шарқӣ -309 см³, Шоҳона -261см³, Вахш -244 см³ ва навъи Зенджи мару -200 см³, дар водиҳои Вахш мутаносибан ин нишондод Шарқӣ-280 см³, Шоҳона-241 см³, Вахш-223 см³ ва Зенджи мару-180 см³- ро ташкил дод. Ҳосилнокии навъу намунаҳои хурмои шарқӣ аз як дарахт ва аз як гектар вобаста ба минтақа низ гуногун мебошад (ҷадвали 4.2.).


**Ҷадвали 4.3. -Муқоисаи ҳосилнокии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисору Вахш, дарахтони 6-8 сола (2016-2018)**

| Навъҳо                    | Минта-қа | Ҳосилнокӣ аз 1 дарахт,<br>кг, |      |       |       | Ҳосилнокӣ аз 1 га,<br>тонна, |      |       |       |
|---------------------------|----------|-------------------------------|------|-------|-------|------------------------------|------|-------|-------|
|                           |          | 2016                          | 2017 | 2018  | миёна | 2016                         | 2017 | 2018  | миёна |
| Ҳиакуме<br>(назоратӣ)     | Вахш     | 28,5                          | 19,3 | 32,3  | 26,7  | 9,49                         | 6,42 | 10,75 | 8,88  |
|                           | Ҳисор    | 48,0                          | 29,0 | 87,0  | 55,0  | 15,98                        | 9,65 | 28,97 | 18,31 |
| Зенджи-мару<br>(назоратӣ) | Вахш     | 27,6                          | 12,3 | 30,8  | 23,5  | 9,2                          | 4,11 | 10,27 | 7,83  |
|                           | Ҳисор    | 35,8                          | 29,4 | 52,9  | 39,3  | 11,9                         | 9,7  | 17,6  | 13,0  |
| Шарқӣ                     | Вахш     | 37,1                          | 7,3  | 38,4  | 27,6  | 12,35                        | 2,43 | 12,78 | 9,19  |
|                           | Ҳисор    | 53,8                          | 26,8 | 100,9 | 60,5  | 17,94                        | 8,95 | 33,63 | 20,1  |
| Шоҳона                    | Вахш     | 27,7                          | 11,3 | 30,9  | 23,3  | 9,22                         | 3,76 | 10,28 | 7,75  |
|                           | Ҳисор    | 43,0                          | 24,0 | 75,0  | 47,0  | 14,31                        | 7,99 | 24,97 | 15,6  |

**Идомаи ҷадвали 4.3.**


|               |              |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Ваҳдат</b> | <b>Вахш</b>  | 24,69 | 14,06 | 30,49 | 23,08 | 8,22  | 4,6   | 10,15 | 7,69  |
|               | <b>Ҳисор</b> | 55,0  | 33,0  | 85,5  | 57,8  | 18,31 | 10,98 | 28,47 | 19,25 |
| <b>Вахш</b>   | <b>Вахш</b>  | 30,1  | 24,8  | 38,0  | 30,9  | 10,02 | 8,25  | 12,65 | 10,28 |
|               | <b>Ҳисор</b> | 53,5  | 50,6  | 62,2  | 55,5  | 17,81 | 16,88 | 20,74 | 18,48 |
| <b>Тоҷикӣ</b> | <b>Вахш</b>  | 29,1  | 9,6   | 29,6  | 22,8  | 9,65  | 3,12  | 9,82  | 7,53  |
|               | <b>Ҳисор</b> | 34,2  | 20,7  | 33,7  | 29,5  | 11,38 | 6,91  | 11,24 | 9,85  |
| <b>Ҳисорӣ</b> | <b>Вахш</b>  | 24,5  | 10,7  | 31,9  | 22,3  | 8,16  | 3,57  | 10,63 | 7,45  |
|               | <b>Ҳисор</b> | 30,8  | 23,6  | 38,28 | 30,9  | 10,25 | 7,85  | 12,75 | 10,28 |
| <b>КФМ05</b>  | <b>Вахш</b>  | 1,5   | 2,1   | 1,1   | 1,0   | 0,5   | 0,7   | 0,3   | 0,35  |
| <b>КФМ05</b>  | <b>Ҳисор</b> | 4,7   | 3,7   | 9,9   | 3,8   | 1,55  | 1,1   | 3,2   | 1,2   |

Тибқи нишондоди ҷадвали 4.3. дар солҳои тадқиқот соли 2017-дар ҳамаи навъҳо ҳосили дарахтони хурмои шарқӣ паст назар ба солҳои 2016 ва 2018 дар навъҳои назорати аз як дарахт дар водии Вахш навъи Хиакуме 19,3 кг дар водии Ҳисор 29,0 кг дар навъи омӯзиши Шарқӣ дар водии Вахш 7,3 ва водии Ҳисор 38,0 кг-ро ташкил дод. Соли 2018 ҳосилнокӣ ҳам аз дарахт ва ҳам аз гектар зиёд гардид. Дар навъи назоратӣ аз як дарахт навъи Хиакуме 32 дар водии Вахш ва 87,0 кг дар водии Ҳисор, дар навъҳои омӯзиши бошад ин нишондод мутаносибан ба 38,4 ва 100,9 кг расид. Ҳосилнокии навъу намунаҳои хурмои шарқӣ ба ҳисоби миёна аз як дарахт (диаграммаи 4.2.).



**Диаграммаи 4.2- Ҳосилнокии навъҳои хурмои шарқӣ аз як дарахт, кг, миёнаи (2016-2018)**

Чуноне ки дар диаграммаи 4.2. нишон дода шудааст дарахтони 6-8 сола вобаста ба минтақа, дар водии Вахш назар ба водии Ҳисор ҳосилнокӣ нисбатан кам аст. Дар водии Вахш аз як дарахт дар навъҳои Вахш-30,9, Шарқӣ -27,6, ва Ҳиакуме 26,7 кг /дарахт. Дар водии Ҳисор мутаносибан навъҳои Шарқӣ- 79,0 Вахдат-64,0 ва Вахш-55,0 кг аз як дарахт. Ҳосилнокии нисбатан кам аз як дарахт дар водии Вахш дар навъҳои Ҳисорӣ-22,3, Тоҷикӣ- 22,8 кг ва дар водии Ҳисор навъҳои номбурда 30,3 ва 29,6 кг –ро ташкил дод. Ҳосилнокӣ аз як гектар ба ҳисоби миёна дар солҳои тадқиқот 2016-2018 дар диаграммаи 4.3. оварда шудааст.



**Диаграммаи 4.3. - Ҳосилнокии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисор ва Вахш аз як гектар тонна**

Аз натиҷаҳои мушоҳидаҳои дар диаграммаи 4.3. оварда шуда, дар водии Вахш аз гектар ба ҳисоби миёна ҳосилнокии баланд дар навъҳои Вахш-10,28, Шарқӣ -9,19, ва Ҳиакуме -8,8т /га дар водии Ҳисор бошад навъҳои Шарқӣ- 20,1, Вахдат- 19,2 ва Вахш-18,4 т/га, нисбатан кам дар водии Вахш навъҳои Тоҷикӣ - 7,5 ва Ҳисорӣ -7,4 т/га ва дар водии Ҳисор навъҳои номбурда, 9,8 ва 10,2 тонна аз як гектар ҳосилнокиро ташкил дод. Ҳосилнокӣ навъҳои хурмои шарқӣ бартари зиёд дар ҳар ду минтақа дар навъҳои омӯзиши Шарқӣ, Шоҳона, Вахдат ва Вахш ба ҳисоб гирифта шуд.

Мевахое, ки аз гули гардолудшуда ташаккул ёфтаанд, бармаҳал хӯрданбоб шуда, лаҳми тираранг ва ҳатто сиёҳтоб мегардад. Навъҳои хурмои гӯшти меваашон сиёҳтоби ширинро «хурмои шоколадӣ» меноманд. Ҳосили хурмо моҳҳои октябр –ноябр пухта мерасад. Онро ҳангоми чиданбоб шуданашон ғундошта мегиранд. Меваи хурмо хеле нозук аст, бинобар ин, онро эҳтиёткорона бояд чидан лозим аст. Баҳогузори сифати молии навъу намунаҳои меваҳои хурмои шарқӣ тибқи чошнигири дар (чадвали 4.4).

Чуноне ки дар чадвали 4.4. дида мешавад, баҳои нисбатан баланд аз рӯи ҳол (0-5) ба навъҳои Шарқӣ-4,4, Шоҳона-4,4, Ваҳдат -4,3, Вахш-4,2 ва баҳои паст ба навъҳои Тоҷикӣ-3,7 Ҳисорӣ- 3,5 гузошта шуд. Баҳогузори аз рӯи таъми онҳо, ки дар баъзе навъҳо моддаҳои дабӯғӣ аз он ҷумла танин, ки сабаби данд (тумч) мева мегардад низ ҳисоб карда шуд. Баҳои умумӣ аз рӯи хусусиятҳои ҳоси хоҷагию биологии навъҳо ва органолептикӣ, ҳаҷм, сифат, таъм, сохти зоҳирии меваҳо, итиқолдиҳӣ ва нигоҳдорӣ гузошта шуд.

Аз дарахт афшондани он қатъиян манъ аст. Меваҳои латхӯрдаву осебёфтаи хурмо зуд мепӯсанд. Қуттиҳое, ки дар онҳо меваи хурморо мегиранд, бояд ҳамвор бошанд. Ба қабати ҳар қатори меваҳои дар қуттӣ чидашуда коғаз гузошта шуда дар ҳарорати нисбатан мувофиқ барои нигоҳдории хурмо  $0+3^{\circ}\text{C}$  аст. Камбудии хурмои шарқӣ ин муҳлати нигоҳдорӣ, интиқолдиҳӣ ва меваҳои данд (тумч) он мебошад.

**Ҷадвали 4.4. - Баҳодиҳии тибқи чошнигирии (дегустиация) меваҳои хурмои шарқӣ  
миёнаи (2016-2018)**

| навъҳо                   | Ҷалби сохти<br>зоҳирӣ<br>мева, ҳол | Ҳолаги<br>пухтарасии<br>мева | Тавсифи<br>таъми мева | Накҳати<br>мева | Дараҷа<br>ғизлагнокии<br>Лаҳми мева | Ширанокии<br>Лаҳми мева | Ранги лаҳми<br>мева) | Баҳои умумии<br>мева | Тавсифи таъм<br>ва дигар<br>хусусияти<br>мева |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Хиакуме<br>(наз.)        | 4,3                                | 3,5                          | 3,7                   | 3,5             | 4,0                                 | 3,8                     | 4,2                  | 3,8                  | Калон ҳаҷм<br>тағирёбанда                     |
| Зенджи<br>мару<br>(наз.) | 4,2                                | 3,5                          | 3,8                   | 3,5             | 3,7                                 | 4,5                     | 4,5                  | 3,9                  | Ширин<br>пешпаз                               |
| Шарқӣ                    | 4,8                                | 4,5                          | 4,0                   | 3,5             | 4,6                                 | 4,8                     | 4,8                  | 4,4                  | Ширин, барои хушккунӣ                         |
| Шоҳона                   | 4,6                                | 4,5                          | 4,2                   | 3,5             | 4,8                                 | 4,8                     | 4,8                  | 4,4                  | Ширин<br>дуҷинса                              |
| Ваҳдат                   | 4,5                                | 4,5                          | 4,0                   | 3,5             | 4,0                                 | 4,8                     | 5,0                  | 4,3                  | Ширин,<br>барои хушккунӣ                      |
| Ваҳш                     | 4,5                                | 4,0                          | 4,5                   | 3,5             | 4,0                                 | 4,0                     | 5,0                  | 4,2                  | Ширин<br>нигоҳдории хуб                       |
| Тоҷикӣ                   | 3,7                                | 3,7                          | 3,0                   | 3,0             | 3,8                                 | 4,0                     | 3,5                  | 3,5                  | Барои нигоҳдорӣ<br>номувофиқ                  |
| Ҳисорӣ                   | 3,8                                | 3,2                          | 3,0                   | 3,0             | 3,6                                 | 3,8                     | 4,0                  | 3,4                  | Барои нигоҳдорӣ<br>номувофиқ                  |

Меваи хурмои шарқӣ вобаста ба навъ ва шароити иқлим аз 90 то 400 г дар шароити Тоҷикистон вазн дорад. Рӯи мева ҳамвор, дар бисёр мавридҳо бо мумпарда пӯшида шудааст. Пӯсти тунук ё гоҳо ғафс дорад. Меваи пухта расида зарди паст, сурх ва сурхи баланд мешавад. Лаҳми меваи хом саҳт аст. Лаҳми меваҳои пухтарасида полуда (желе)-ро мемонад; рангаш зард, сурх ва ҳатто сиёҳтоб мешаванд. Навъҳои хурмои гулашон гардолудшаванда, масалан, Хиакуме, Зенджи мару, Шарқӣ, Шоҳона, Вахш ва Ваҳдат нафақат ҳосили хуб медиҳанд, балки сифати меваашон низ баланд аст.

#### 4.4. Сифати меваи хушки хурмои шарқӣ



Расми 18. Меваи хушк,  
навъи Ваҳдат

Яке аз тарзҳои коркарди техникий меваи хурмо ин хушккунии мева ба ҳисоб меравад. Бо мақсади муайян кардани динамикаи вазни меваи хушк ҳангоми хушккунии маҳсулоти хом ва тарзҳои хушккунӣ аз тарафи мо ба қайд гирифта шуд, талаф ёфтани оби мева, давомнокии хушккунӣ, ба даст овардани маҳсулти тайёр ва баҳодиҳи ҳангоми чошнигирӣ

(дегустация). Хушккунӣ дар иморати тирезаҳояш кушода, дар даҳаи сеюми моҳи октябр дар ду вариант гузаронида шуд, дар ин маврид ҳарорати ҳаво аз 15 то 25 дараҷа гармиро ташкил медод ва муҳлати хушккунӣ 40 рӯз идома ёфт. Барои хушккунӣ меваҳои пухта ва саҳт аз навъҳои гуногун интихоб карда, дар варианти 1-ум бо шакли доира бурида, дар варианти 2-юм меваҳои бутун дар маҳлули дар 1 л 50 г шакар илова намуда, маҳлулро чушонида, меваҳои бурида ва бутунро ба маҳлул ба муддати 10-15 соня тар карда гирифта, дар риштаҳо кашида, овезон карда шуд. Дар тадқиқот аз 8 навъу намунаҳо барои хушккунӣ намунаҳо гирифта шуд.

**Чадвали 4.6. - Номгӯи навъҳои меваи хушккардашудаи хурмои шарқӣ ва баромади модаи хушк %, миёнаи (2016-2018)**

| Навъҳо            | Варианти 1   |                            | Варианти 2   |                            |
|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|                   | Модаи хушк % | Баҳои чашидан (дегустация) | Модаи хушк % | Баҳои чашидан (дегустация) |
| Хиакуме (наз)     | 19,3         | 2,8                        | 21,3         | 3,5                        |
| Зенджи мару (наз) | 21,0         | 3,0                        | 23,5         | 3,6                        |
| Шарқӣ             | 22,0         | 3,8                        | 24,5         | 4,8                        |
| Шоҳона            | 21,5         | 3,5                        | 24,0         | 4,5                        |
| Ваҳдат            | 22,3         | 4,0                        | 25,4         | 5,0                        |
| Вахш              | 23,0         | 3,8                        | 26,3         | 4,6                        |
| Тоҷикӣ            | 19,5         | 2,8                        | 21,5         | 3,5                        |
| Ҳисорӣ            | 18,8         | 2,8                        | 20,5         | 3,6                        |



**Расми 21. хушкмеваи нави Вахш**

Чи тавре, ки аз чадвали 4.6. бар меояд, хушккунӣ дар ҳавои кушод, дар ду вариант; 1-ум бо тарзи доирашакл буридан, 2-юм меваи бутун бо суроҳ кардан. Модаи хушк дар ҳар ду вариант бештар дар навъҳои Вахш- 23,0 х26,3, Ваҳдат 22,3х 25,4 Шарқӣ-

22,3х24,5 нисбатан кам навъҳои Ҳисорӣ 18,8х20,6, Ҳисорӣ 19,5х 21,5 баромад. Ҳангоми чошнгирӣ баҳои баланд дар ҳар ду вариант навъҳои Ваҳдат 4,0х5,0 хол, Шарқӣ 3,8-4,8 хол, нисбатан баҳои паст дар навъҳои Тоҷикӣ-2,8-3,5хол ва Ҳисорӣ- 2,8-3,6 хол гузошта шуд, ки нисбати навъҳои назоратӣ Хиакуме ва Зенджи – мару 1,0- 1,5 хол баланд мебошад.



**Расми 22. хушкмеваи нави Шарқӣ**

**Вариантҳои хушккунии меваи хурмо дар тафдони хушккунӣ**

1. Меваи бутун бо тарзи суроҳ кардани пуст
2. Меваи доирашакл буридаи ва ба чор қисм чудошуда.
3. Меваҳои доирашакл бурида ва қисм-қисм бо хокаи қанд пошидан.

4. Меваҳои пӯсташон суроҳ карда, ба ду қисмҷудо бурида

**Усулҳои хушккунии мева дар ҳавои кушод (тағи айвон)**

5. Меваи бутун бо суроҳкунии пӯст дар оби ҷуш тар намуда

6. Меваи бутун бо тарзи сӯроҳ кардан ва дар қандоб тар намудан (60 г. дар 10 л. об)

**Ҷадвали 4.7. -Тарзҳои хушккунии, баромади маҳсулоти тайёр ва баҳодиҳӣ тибқи ҷашидани (дегустация) меваи хушкӣ нави «Шарқӣ» миёнаи (2016-2018)**

| Вариантҳо      | давомнокӣ | Вазни мева кг. |                     | Баромади хушкмева, % | Ҷошнигирӣ ҳол |
|----------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                |           | То хушккунии   | Дар охири хушккунии |                      |               |
| 1-тафдон       | 36 соат.  | 0,570          | 0,198               | 34,8                 | 4,8           |
| 2-тафдон       | 36 соат.  | 0,517          | 0,119               | 23,0                 | 4,4           |
| 3-тафдон       | 36соат.   | 0,488          | 0,122               | 25,4                 | 4,2           |
| 4-тафдон       | 36 соат   | 0,464          | 0,123               | 26,5                 | 4,0           |
| 5- ҳавои кушод | 40 рӯз    | 0,756          | 0,148               | 19,6                 | 3,4           |
| 6- ҳавои кушод | 40 рӯз    | 0,657          | 0,171               | 26,0                 | 4,2           |

Маълумотҳои ҷадвали 4.7. нишон дод, ки баромади меваи хушк аз вариантҳо вобастагӣ дорад. Баромади меваи хушк дар варианти 1-ум дар



**Расми 23. хушкмеваи нави Шарқӣ**

шакли бутун суроҳ кардани пӯст, 34 % ва дар варианти 2-юм меваҳо бурида ба чор қисм ҷудо карда шуда, то 23%- ро ташкил дод. Баромади меваи хушк дар варианти 4-ум бо тарзи бутун, суроҳ кардан ва дар қандоб тар намудан дар тағи айвон баромади меваи хушк 26%-ро ташкил дод. Дар варианти 1-ум ва 4-ум сифати меваи хушк хуб баҳогузорӣ гардид.

#### 4.5. Таркиби биокимиёвии меваи хурмои шарқӣ

Интихоби навъҳои ояндадор дар қатори ҳосилноки, сифати мева, инчунин таркиби кимёвии меваи пухтаи хурмо, қандноки, сафедаҳои онҳо, кам будани кислота (турши), моддаҳои ҳалшавандаи дабоғӣ дар меваи хурмои шарқӣ аҳамияти муҳим дорад.

Мувофиқи маълумоти Н. М. Мурри, [97, с. 68] дар таркиби меваи хурмо 1,16- 1,61% протеин, 0,31 - 0,85% равған, 0,61 - 0,72% хокистар, 0,93 -2,90% ғоз мавҷуд аст. Қанди хурмо асосан глюкоза ва фруктоза мебошад. Меваи норасидаи хурмо дорои витамини С аст. Вобаста ба дараҷаи пухта расидани мева миқдори витамини С кам мешавад. Дар таркиби меваи норасида танинҳо бисёранд, бинобар ин вай данд (тумч) аст. Хурмои навъи Таненаши 0,13% ва Тсуру 1,54% танин доранд. Меваи пухта расидаи хурмо ширин ва гуворо аст.

Дар таркиби меваи тару тозаи хурмо 77,6-85,9 фоиз об, 14,1-22,4 фоиз моддаҳои хушк, 0,54-1,22 фоиз чавҳар, 13,1-20,5 фоиз қанд, 0,02-2,35 фоиз полифенолҳо, 6,4-43,5 мг/фоиз витамини С, 0,104-0,386 мг/ фоиз каротин мавҷуд аст. Меваи хурмо ҳамчунин дорои витаминҳои А, Р макро ва микро элементҳо мебошад С.М Гулов ва дигарон, [31, с. 27].

Таркиби меваи хурмои шарқӣ тибқи маълумотҳои Г. С. Юсупова ва И.Д. Кароматов 13,1-20,5 %-қанд, 14,1-22,4%-моддаҳои хушк, 0,30-1,2 % - моддаҳои дабоғӣ, 0,54-1,22 %- чавҳар, 49,7 мг/ % -йод, 15 мг/ % витамини С мавҷуд аст. Хурмои шарқӣ барои муолиҷаи бемориҳои гуногуни меъдаву рӯдаҳо, гулӯдард, камхунӣ, бемориҳои милки дандон муфид аст. Шарбати он хусусияти бактерисидӣ дорад. Меваи хурмои шарқӣро асосан тару тоза истеъмол меkunанд, вале аз он мураббо, мармелад, чем, павидло ва ғайра низ пухтан мумкин аст таркиби моддаҳои ғизоии хурмои шарқӣ дар ҷадвали 4.8., [174, с. 31-33].

Таркиби химиявии навъҳои таҳти омӯзиш қарор дошта, дар ҷадвали 4.8. оварда шудааст.

**Чадвали 4.8. -Таркиби биокимиёвии меваҳои хурмои шарқӣ таҳти  
омӯзиш қарордошта, миёнаи, (2016- 2018)**

| Навъҳо       | Моддаи<br>хушк, % | Қанд, % | Моддаҳои<br>дабоғӣ, г % | Чавҳар,<br>г/% | Витамини<br>С, мг% |
|--------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Хиакуме      | 18,5              | 14,3    | 0,48                    | 0,14           | 42,2               |
| Зенджи- мару | 23,5              | 18,5    | 0,45                    | 0,13           | 25,3               |
| Шарқӣ        | 25,0              | 20,0    | 0,39                    | 0,12           | 23,0               |
| Шоҳона       | 26,3              | 21,6    | 0,33                    | 0,14           | 22,2               |
| Ваҳдат       | 27,5              | 22,0    | 0,25                    | 0,13           | 19,8               |
| Вахш         | 25,3              | 21,5    | 0,31                    | 0,14           | 20,3               |
| Тоҷикӣ       | 18,4              | 13,4    | 0,60                    | 0,14           | 41,6               |
| Ҳисорӣ       | 21,0              | 16,0    | 0,58                    | 0,13           | 24,4               |

Чуноне, ки аз чадвали 4.8. бар меояд, моддаҳои хушк дар навъҳои Ваҳдат 27% Шоҳона -26 % Шарқӣ- 25%, Ваҳдат -24% ва нисбатан кам дар навъи Тоҷикӣ-18,4, қанднокӣ дар навъҳои Ваҳдат- 22%, Вахш-21% ва Шарқӣ-20%, ва нисбатан кам дар навъи Тоҷикӣ13,4%-ро ташкил медиҳад, ки нисбати навъҳои назорати зиёд мебошад. Микдори танин дар навъҳои таҳти омӯзиш қарор дошта аз 0,25 г/ % навъи Ваҳдат то 0,60 дар навъи Шоҳона дида мешавад. Ин аз он гувоҳи медиҳад, ки ин навъҳо ҳамчун навъҳои ояндадор таъми ширин доранд. Дар ҳолати зиёд будани танин дар меваҳо, яъне 1,0-1,5 % ё ин, ки 10-15 мг/г истеъмоли онҳо ғайри имкон мебошад. Ташҳиси таркиби химиявии меваҳо дар 8 навъу намунаҳо дар озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии экспертиза ва озмоиши маҳсулоти фармасевтӣ ва тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пухтарасии истеъмолии меваҳо гузаронида шуд.

Инчунин дар оянда дар нақша ҳаст, ки бо пайдо шудани имконият ва шароит дигар модаҳо; макра ва микро элементҳо инчунин дигар витаминҳои таркиби меваи хурмои шарқӣ таҳҳис карда шавад.

#### **4.6. Устуворияти навъҳои хурмои шарқӣ ба касалиҳо ва зараррасонҳо.**

Яке аз бартариҳои хурмои шарқӣ устувории он ба касалиҳо ва зараррасонҳо мебошад. Дар қаламрави ҷумҳурӣ зараррасонҳои хурмо шарқӣ хеле кам мушоҳида шудаанд.

Ба дарахти хурмо асосан зиреҳаки бунафш (*Parlaria oleae*), зиреҳаки колифорниягӣ, тортанакканҳо, гулхурак ва кирмакҳои баргхӯрак осеб мерасонад, ҳашаротҳо дар шоҳу нажда, барг, мева ҷойгир шуда, шираи онҳоро мемакад. Дар он ҷойҳои мева, ки зиреҳак зарар расонидааст, доғҳои сурхча пайдо мешаванд. Сифати мева паст шуда, ҳосили дарахт хеле кам мегардад. Гулхурак бошад дар гул маскан гирифта, гулро хурда, нест мекунанд.

Дар иқлими намноки иттиҳоди Шӯрови 20-намуди касалиҳои гуногун и хурмо ба қайд гирифта шудааст. Аз ин намуди касалиҳо фомопсис *phomopsis diospyri* ва саратони хурмо яке аз касалиҳои паҳнғашта ва зараровар мебошанд, Н. Б. Дзимистаришвили, [39, с. 172-173].

Аз касалиҳо пусиши мева, нуқтаҳои сиёҳ, қутурак ва фомопсис ба назар мерасад, ки ангезандаи онҳо занбурӯғ аст. Занбурӯғ ба ғӯра осеб мерасонад. Ғӯраҳои зарардида пӯсида аз дарахт меафтанд. Ба дарахтони аз занбурӯғ сироятёфта пеш аз гулшукуфт ва баъди он маҳлули якфоизаи бордосӣ ва «Ридомил» пошидан лозим. Ҳамчунин гулу ғӯраҳои рехтаро аз замин бароварда нест кардан даркор. Инчунин қисми решаи хурмои кавказӣ дар баъзе ҳолатҳо аз саратони реша осеб мебинад.

Бар зидди ҳашаротҳои зараррасон коркарди зимистонаи заҳрдоруро «Днок», перепарат 30, дар давраи афзоиш бошад Би -58 нав, Нурель-Д, «Месенчер» ва ғайра истифода карда шуд, Аз дастрасии сарчашмаи маълумотҳои адабиётҳои хориҷӣ хулоса бароварда шуд, ки касалиҳо ва зараррасонҳои хурмои шарқӣ, ки зарари ҷиддиашон ба дарахтон ва худ мева мерасад дар шароити иқлими мо мушоҳида карда нашуд (ҷадвали 4.9.).

**Ҷадвали 4.9. Дараҷаи осеббинии дарахтони хурмои шарқӣ, аз касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон, миёнаи солҳои (2016-2018)**

| Солҳо                                   | 2016                  | 2017 | 2018 | миёна |
|-----------------------------------------|-----------------------|------|------|-------|
| Номгӯи касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасон  | Дараҷаи осеббинӣ, ҳол |      |      |       |
| Пӯсиши хокистарранг                     | 2,0                   | 0,5  | 0    | 0,8   |
| Фомопсис ( <i>Phomopsis diospyris</i> ) | 3,5                   | 2,0  | 1,0  | 2,1   |
| Зиреҳаки бунафш                         | 2,5                   | 0    | 0    | 0,8   |
| Гулхӯрак                                | 3,0                   | 2,5  | 2,0  | 2,5   |
| Тортанакканна                           | 2,2                   | 2,0  | 1,5  | 1,9   |
| Кирми баргхӯрак                         | 3,5                   | 3,0  | 2,5  | 3,0   |

Аз натиҷаҳои дар ҷадвали 4.9. дарҷ шуда, ба чунин ҳулоса омадан лозим аст, ки дар солҳои таҳқиқот ба ҳисоби миёна, аз касалиҳои занбӯруғӣ дар хурмои шарқӣ пӯсиши хокистарранг 0,8 -ҳол, Фомопсис-2,1 – ҳол, аз ҳашаротҳои зараррасон камтар Зиреҳаки бунафш-0,8, зиёдтар Гулхӯрак-2,5 ва Кирми баргхӯрак-3,0 ҳол осеб дидаанд. Осебинии дарахтони хурмои шарқӣ дар солҳои аввали тадқиқот зиёдтар аз касалиҳо Пӯсиши хокистарранг-2,0 ва Фомопсис-3,5 ҳол ва ҳашаротҳои зараррасон аз Тортанакканаҳо -2,2 ва Кирми баргхӯрак -3,5 ҳол дар солҳои минбаъда аз ҳисоби коркарди дарахтон бо фунгисидҳо ва заҳрдоруҳо бар зидди касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон, инчунин гузаронидани корҳои профилактикӣ дараҷаи осеббинӣ паст баҳогузорӣ шуд.

Зараррасонҳо ва касалиҳои хурмои шарқӣ дар муқоиса бо дигар дарахтони мевадиханда хело кам аст, чунки касалиҳои занбӯруғӣ дар дарахтони хурмои шарқӣ дар ду се сол як бор мушоҳида мегардад, ки ин ҳам дар ҳолати нагузаронидани корҳои профилактикӣ, каму беш дар дарахтоне, ки дар минтақаҳои, ки рутубатнокиашон зиёд парвариш меёбанд вомехурад. Ҳашароти зараррасон (гурхӯрак) ва касалии пусиши мева *diospyris* ва нуқтаҳои сиёҳ ки дар солҳои тадқиқот мушоҳида шуд, каму беш ба баргҳо, мева ва навдаҳои яқсола осеб расониданд ва ба сифати мева осеби ҷиддӣ нарасидааст. Сари вақт гузаронидани корҳои

профилактикӣ ва коркарди дарахтон бо захрдоруҳо имконияти аз байн бурдани зараррасонҳо ва касалиҳо гардид.

#### **4.7. Самаранокии иқтисодии навъҳои ояндадори хурмои шарқӣ дар шароити водиҳои Ҳисор ва Вахш**

Иқлим, релеф, хок ва дигар омилҳои табиат имкон медиҳанд, ки Тоҷикистон дар соҳаи боғдорӣ дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ мавқеи аввалро дошта бошад. Тоҷикистон ба сабаби иқлими гуногун доштани аз самти ҷануб то шимол ва аз ғарб то шарқ метавонад мардуми ҷумҳуриро аз авали баҳор то охири тирамоҳ бо меваҳои тару тоза таъмин намояд. Аз ин рӯ олимони соҳаи боғдорӣ дар натиҷаҳои таҳқиқоти худ Тоҷикистонро ҳамчун яке аз мамлакатҳои ояндадорӣ соҳаи боғдорӣ муаррифӣ кардаанд. Бояд таъakkур дод, ки мувофиқи афзоиши солони аҳолии ҷумҳурӣ 0,2 %. дар соли 2030 шумораи аҳолии ҷумҳурӣ ба 10,9 миллион расидани дар назар аст, ки барои таъмини амнияти ғизои аз рӯи меъёри физиологии муқарраргашта зарур аст, ки истеҳсоли меваю ангурро ба 1 млн. 353 ҳазор тонна расонем.

Иқлими гарми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои парвариши зироатҳои субтропикию ситрусӣ, алалхусус анор, анҷир хурмои шарқӣ, лиму, нораң, афлесун хело мусоид буда, ҳамасола аз онҳо дар ҳолати нигоҳубини саривақти тибқи талаботҳои дар боғдори қабул шуда ҳосили дилхоҳ ба даст овардан мумкин аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 27 намуд ҷинсҳои гуногуни дарахтони мевадиханда, тоқ ва буттамевагӣҳо парвариш меёбад, ки аз ҷиҳати хусусиятҳои биологӣю технологияи парвариш ҳоси ҳар як минтақаи алоҳида мебошанд. Бинобар ҳамин парвариши онҳо вобаста ба минтақа ва шароити маҳал мувофиқи мақсад мебошад.

Хурмои шарқӣ худ зироати гармидӯст буда, ба зами ин низ назар ба дигар зиротҳои субтропикӣ, ки дар Ҷумҳурии мо парвариш меёбанд ба хуноки устувор мебошад. Ҳастанд навъҳои хурмои шарқӣ, ки то сардиҳои кӯтоҳмудати -24 °C тоб мееоранд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон,

хурмои шарқӣ амалан аз сабаби дер гул карданаш ва ба касалиҳои занбурӯғӣ ва ҳашаротҳои зараррасон устувор будан, дар муқоиса бо дарахтони зардолу ва шафтолу аз сардиҳои баҳорӣ, ё ин ки баргарданда осеб намебинад.

Давраи нашти хурмо вобаста ба омади баҳор ва навъ охириҳои моҳи феврал оғоз ёфта, охириҳои октябр--аввали ноябр ба охир мерасад. Дарахти пайвандиаш баъди 3-4 соли шинондан бор меорад. Ҳар сол ҳосил медиҳад, дарахташ дарозумр аст. Дар қаламрави ҷумҳурий, хусусан водии Вахш, ки иқлимаш мансуби субтропикаи хушк аст, хурмо нисбат ба субтропикаи намнок меваи хурд мебандад; пӯсти мева низ ғафс ва дурушт аст. Вале қанднокии он нисбатан зиёд мебошад.

Хурмои шарқӣ растании дарозумр буда, давомнокии самараи ҳайёти он 100-150 сол мебошад. Дар Хитой ватани хурмо дар ҳудуди шимолу-ғарби Пекин дарахти хурмои 400-500 сола мавҷуд аст [Древесных или эбеновых, реферат <http://www.allbest.ru/>], [132, с. 26].

Хурмои шарқӣ амалан аз сабаби дер гул карданаш дар муқоиса бо дарахтони зардолу ва шафтолу аз сардиҳои баҳорӣ, ё ин ки баргарданда осеб намебинад. ва даромаднокиаш бо муқоиса аз меваҳои себ ва нок дар як зина меистад, Н.Г. Загиров, М.М. Мурсалов, [48, с. 31-33].

Хурмои шарқӣ аз ҷиҳати таъм ва моддаҳои маъдани фойданок, дорои хусусиятҳои хоси ғизоӣ, парҳезӣ дар байни зироатҳои субтропикӣ баъд аз ситрусҳо дар ҷои дуюм меистад Г.Н. Шейхмагомедова, [170, с. 24].

Дарахти хурмо дар шароити ҷануби Ўзбекистон дар 3-4 солаги ба ҳосил медарояд ва дар 6 –солагӣ бо нақшаи (5 х5 м) 400 дарахт дар як гектар ҳосили дилхоҳ (120-150 с/га.) аллакай дар 12 солаги ҳосилнокии баланди мувофиқ (460 -612 с/га.) ба даст овардан имконпазир аст, Б.Л. Массовер, [85, с. 28].

Хурмо ба монанди шаклҳои дарахтони себи қадпаст ва миёнақад дар муқоиса бо дигар дарахтони мевадиҳандаи тағпайвандашон аз тухми

парвариш ёбанда, дар соли дуюм ва сеюм баъд аз шинонидан дар боғ барвақт ба ҳосил медарояд, реферат Allbest.ru, [134, с. 26].

Самаранокии боғпарварӣ, хусусан дар шароити бозоргонӣ бо хусусиятҳои хоси истеҳсолии умумии муайян карда мешавад, аз он ҷумла сифати баланди мева, нигоҳдорӣ, коркард, ҷамъоварӣ бо усулҳои ҳозаразамон ва бо сифат, интиқол додан ва фурӯши маҳсулот бо таъмини даромади баланд. Баҳодиҳии муқоисавии даромаднокии иқтисодии меваҳо себ, олуҷа ва хурмои шарқӣ дар ҳудуди хоҷагиҳои тадқиқотӣ самарайи хело хуби истеҳсоли нишон доданд Н.Г.Загиров, [47, С. 28].

Таъсири омилҳои беруна ва речаи обёрӣ ба рушди навдаҳо ва ҳаҷми мева таъсири манфӣ мерасонад. Дар ҳолати норасоии об ва таъсири ҳарорати баланд аввал навда рушд наёфта ва баъд меваҳо хурд мешаванд. Ин раванд ба самаранокии меваҳо таъсири манфӣ мерасонад, О. А. Ильницкий, С. П Корсакова, Ю. В. Плугатарь, [58, с. 32-34].

Хурмои шарқӣ инчунин ҳосиятҳои хуби шифобахши дорад. Дар тибби халқии муосир меваи хурморо ҳамчун воситаи балғамбаранда, дар бемориҳои ғадуди сипаршакл, барои беҳтар кардани кори рӯдаю системаи ҳозима истифода мебаранд. Меваи пухтаи хурмо ҳамчунин барои шифои захмҳои, ки дар даҳону забон пайдо мешавад, хусусияти шифои дорад. Меваҳои нопухтаро, яъне тумч бар зидди дарунравӣ истифода мебаранд. Тадқиқоти илмӣ ҳосиятҳои антиоксидантӣ ва зиддипролиферативии хурморо муайян карданд. Нафтохинонҳои димерӣ, полифенолҳо, ситостерол ва люпеоли хурмо таъсири зиддимутагенӣ, зиддиварамӣ низ доранд, Г. С. Юсупова, И.Д. Кароматов, [174, С. 31-33].

Дар солҳои тадқиқот 2016-2018 коллексияҳои навъҳои таҳти омӯзиш қарор дошта, ҳама гуна чорабиниҳои агротехникӣ тибқӣ талаботҳои дар боғдорӣ қабулшуда гузаронида шудааст. Бо назардошти баландшавии ҳарорати солонаи ҳаво ва кам гаштани боришоти солҳои охир, хусусан

дар водии Вахш назар ба солҳои қаблӣ паст шудани сифати мева ва ҳосилнокӣ мушоҳида шуд. Аз ҳамин лиҳоз барои муқоисаи самаранокии иқтисодии хурмои шарқӣ дар ду минтақаи аз ҷиҳати табиӣ иқлимашон гуногун водии Ҳисор ва Вахш тадқиқотӣ- илмӣ гузаронида шуд. Маҳсулнокии навъу намунаҳои хурмои шарқиро дар давоми се сол ба ҳисоб гирифта, самаранокии иқтисодии онҳо муайян карда шуда, дар ҷадвал оварда шудааст.


Хароҷоти нисбатан кам назар ба дигар дарахтони мевадиханда, барои истеҳсоли меваи хурмои шарқӣ дар ду минтақаи аз ҷиҳати ҳоку иқлим гуногун, яъне аз 15,5 то 22,5 ҳазор сомонӣ ва сарфи маблағи арзиши аслии меваҳо барои як сентнер дар водии Вахш аз 168 сом. (навъи Вахш) то 208 сом. (навъи Ваҳдат). ва дар водии Ҳисор аз 105,5 сом. (навъи Вахш) то 133 сом. (навъи Зенджи-мару), даромади соф дар водии Вахш 7,0 ҳаз. сом. (навъи Ваҳдат) то 15,5 ҳаз. сом (навъи Вахш) дар водии Ҳисор 11,3 ҳаз. (Зенджи мару) то 50,1 ҳаз. (н. Шарқӣ) инчунин дараҷаи даромаднокии иқтисодӣ мутаносибан дар водии Вахш 7,5% (Зенджи мару) то 90,7% (навъи Шарқӣ) ва водии Ҳисор 27,1% (навъи Зенджи мару) то 222,6 % (навъи Шарқӣ)-ро ташкил дод, ки навъҳои омӯзиши нисбати навъҳои назоратӣ 88 то 142 % дар минтақаи водии Ҳисор ва аз 35,5 то 62,4 % дар минтақаи водии Вахш дараҷаи даромаднокиашон зиёд мебошанд.

**Ҷадвали 4.10. - Самаранокии иқтисодию истеҳсоли навъҳои хурмои шарқии дарахтони 6-8 сола дар шароити водии Ҳисору Вахш, миёнаи (2016-2018).**

126

| Навъҳо                             | Минтақа      | Ҳосилнокӣ<br>сент./га. | Нархи<br>фуруши<br>1/сент.<br>мева<br>сомонӣ | Арзиши аслии<br>мева аз<br>1/сентнер<br>сомонӣ | Даромади<br>умуми аз 1<br>га.<br>ҳаз. сомонӣ | Хароҷоти<br>умуми дар 1<br>га.<br>ҳаз. сомонӣ | Даромади соф<br>1/га.<br>ҳаз. сом. |
|------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Хиакуме<br/>(назоратӣ)</b>      | <b>Вахш</b>  | 88,8                   | 250                                          | 194,8                                          | 22,2                                         | 17,3                                          | 5,0                                |
|                                    | <b>Ҳисор</b> | 183,1                  | 250                                          | 106,4                                          | 45,7                                         | 19,5                                          | 26,2                               |
| <b>Зенджи- мару<br/>(назоратӣ)</b> | <b>Вахш</b>  | 78,3                   | 220                                          | 204,3                                          | 17,2                                         | 16,0                                          | 1,2                                |
|                                    | <b>Ҳисор</b> | 130                    | 220                                          | 133                                            | 28,6                                         | 17,3                                          | 11,3                               |
| <b>Шарқӣ</b>                       | <b>Вахш</b>  | 91,9                   | 360                                          | 188,2                                          | 33,0                                         | 17,3                                          | 15,7                               |
|                                    | <b>Ҳисор</b> | 201,9                  | 360                                          | 111,4                                          | 72,6                                         | 22,5                                          | 50,1                               |
| <b>Шоҳона</b>                      | <b>Вахш</b>  | 77,5                   | 320                                          | 223                                            | 24,8                                         | 17,3                                          | 7,5                                |
|                                    | <b>Ҳисор</b> | 156,0                  | 320                                          | 118,5                                          | 49,9                                         | 18,5                                          | 31,4                               |
| <b>Ваҳдат</b>                      | <b>Вахш</b>  | 76,9                   | 300                                          | 208,0                                          | 23,0                                         | 16,0                                          | 7,0                                |
|                                    | <b>Ҳисор</b> | 192,5                  | 300                                          | 109,0                                          | 57,7                                         | 21,0                                          | 36,7                               |
| <b>Вахш</b>                        | <b>Вахш</b>  | 102,8                  | 320                                          | 168,2                                          | 32,8                                         | 17,3                                          | 15,5                               |
|                                    | <b>Ҳисор</b> | 184,8                  | 320                                          | 105,5                                          | 59,1                                         | 19,5                                          | 39,6                               |
| <b>Тоҷикӣ</b>                      | <b>Вахш</b>  | 75,3                   | 250                                          | 225,7                                          | 18,8                                         | 17,0                                          | 1,8                                |
|                                    | <b>Ҳисор</b> | 98,5                   | 250                                          | 175,6                                          | 24,6                                         | 17,3                                          | 7,3                                |
| <b>Ҳисорӣ</b>                      | <b>Вахш</b>  | 74,5                   | 220                                          | 218,7                                          | 16,3                                         | 15,5                                          | 0,8                                |
|                                    | <b>Ҳисор</b> | 102,8                  | 220                                          | 168,2                                          | 22,6                                         | 17,3                                          | 5,3                                |

Бояд тазакур дод, ки самаранокии навъҳои гуногуни хурмои шарқӣ дар муқоиса бо самаранокии боғҳои интенсивии себ дар як зина меистад. Даромаднокии иқтисодии себ бо пайвнди мобайни дар тағпайвандҳои М-9 нақша 4x3 379%, ММ-106 нақша 5x4 262% ва дар тағпайванди аз тухми парваришёбанда нақша 6x4м 156%-ро ташкил медиҳад, Х.Ф. Сафаралиев, [149, с.27], (диаграммаи 5.1.).



**Диаграммаи 5.1. -Дараҷаи даромаднокии навъҳои хурмои шарқӣ дар водии Ҳисор ва Вахш, %**

Аз диаграммаи 5.1. аён аст, ки дараҷаи даромаднокии навъҳои омӯзиши дар минтақаи водии Ҳисор аз 169,7 (навъи Шоҳона), то 222,6 % (навъи Шарқӣ) нисбати навъҳои назоратӣ Зенджи мару 65,3 то 134,3 % навъи Хиакуме дар минтақаи водии Вахш бошад дар навъҳои номбурда мутаносибан аз 43 то 90,7% дар навъҳои назоратӣ аз 7,5 то 28,3% зиёд мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки самаранокии навъҳои омӯзиши Шарқӣ, Шоҳона, Вахш ва Вахдат дар ҳар ду минтақа ҳамчун навъҳои ояндадор аз навъ назоратӣ бартари дорад.

Хурмои шарқӣ худ зироати гармидӯст буда, дар минтақаҳои гарми намнок ҳосилнокиаш дучанд мегардад, дар минтақаҳои субтропикии, ки миқдори боришоти солона нисбатан камтар аст, меваҳои хурмо майда ва ҳосилнокиаш паст мешавад. Бо назардошти ҳамин вобаста бо тағирёбии

иқлим, ки ҳарорати миёнаи солона баланд шуда, истодааст хусусан дар минтақаи водии Вахш ҳарорати баланди ҳаво дар моҳҳои июн – август дар давраи ҳозира 40-48,5 °C мерасад, миқдори солонаи боришот 190-350 мм мебошад, ҳосилнокии навъу намунаҳои омӯзишии хурмои шарқӣ дар солҳои тадқиқот аз 76 то 102 сен. /га. расид. Дар минтақаи водии Ҳисор бошад, дар ҳудуди хоҷагии таҷрибавии «Сунбула» ҳарорати баланди ҳаво дар моҳҳои июн- август ба 40-43 °C баробар шуда, миқдори солонаи боришот ба 500-600 мм мерасад, ҳосилнокӣ навъу намунаҳои омӯзишӣ дар ин минтақа дар солҳои тадқиқот ба 156 то 201 сен. /га. расид. Аз ҳамин лиҳоз шароити хоку-иқлими табиӣ водии Ҳисор имконият медиҳад, ки самаранокии иқтисодии дар ин минтақа назар ба минтақаи водии Вахш зиёд ба даст оварда шавад.

Самаранокии баланди иқтисодии парвариши хурмои шарқӣ на фақат аз нархи фурӯши он вобастагӣ дорад, балки аз сифат тез ба ҳосил дароии он, баланд будани ҳосил, аз ҳама асос ин паст будани арзиши аслии мева бо назардошти дар навбати худ бо хароҷоти кам дар буриши шохаҳо, зараррасонҳо ва касалиҳо ин аз як тараф хароҷоти нисбатан кам ва аз тарафи дигар – меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, арзиши меваи хурмои шарқиро баланд мекунад.

## БОБИ 6. Баррасии натиҷаҳои тадқиқот

Дар даврони истиқлолият корҳои илмӣ тадқиқотӣ аз рӯи ҳамаи зироатҳои кишоварзӣ, аз он ҷумла дарахтони мевадиханда идома дорад. Аммо хурмои шарқӣ яке аз мевахое, ки дорои хусусиятҳои шифои ва витаминҳои зиёд, инчунин устуворияти баланд ба касалиҳои зараррасонҳо дошта, дар баробари боғҳои интенсивӣ ҳосилнокиаш баланд аст, аз солҳои 80-уми асри гузашта то соли 2016 корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар ин самт гузаронида нашудааст. Олимони дар ин самт корҳои илмӣ-тадқиқотӣ бурда Б.С. Розанов, [141, с. 32-34], Н.Г. Ширяева, [171, 12-13], С.М. Животинская, [46, с.88], О.П. Кульков, [70, 26], Ф. А. Кулиев, [68, 45-47], В. И. Запрягаева, [52, с.16-18], Б.Л. Массовер, [86, с 55] У.Э. Эшонкулов, [73, с. 106], И.А. Загребельный [49, с.18-21], мебошанд. Дар ин замина мо хусусиятҳои мусбии хоҷагию-биологӣ доштаи хурмои шарқиро ба инобат гирифта навъҳои нави ватаниро, ки олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ дар натиҷаи гардолудшавии озод ба вуҷуд овардаанд, омукта аз байни онҳо 4 навъи ояндадорро Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат ва Вахшро интихоб намуда, корҳои илмӣ-тадқиқотиро таҳрезӣ намудем.

Дарахти пайвандии хурмои шарқӣ баъди 3–4 соли шинондан дар боғ ба ҳосил медарояд, солбанд набуда, дарозумр аст дар коллексияҳои хурмо, ки аввали солҳои 70-уми асри гузашта дар Стансияи таҷрибавии зироатҳои субтропикӣ ва ситрусии ноҳия Ҷ. Балхӣ ва хоҷагии таҷрибавии «Сунбула»-и шаҳри Ҳисор бунёд шудааст, ҳосилнокиашон ба ҳисоби миёна 150-300 с/га-ро ташкил медиҳад.

Дар қаламрави ҷумҳурӣ, ки иқлимаш мансуби субтропикаи хушк аст, хурмои шарқӣ нисбат ба субтропикаи намнок мевааш хурд буда, пӯсти мева низ ғафс ва дурушт аст. Вале қанди он нисбатан зиёд ва навъхое, ки меваашон данд (тумч) аст, тез хурданбоб мегарданд. Таъсири мусбии иқлими водигии Ҷумҳуриамон имкон медиҳад, ки ҳама гуна

намуди зироатҳои субтропикӣ, аз он ҷумла хурмои шарқӣ то баландиҳои 1300 м аз сатҳи баҳр парвариш карда мешаванд ва ҳосили дилхоҳ медиҳанд.

Тафовути навъҳои ба вучуд овардаи хурмои шарқии олимони Институти боғу тоқпарварӣ сабзавоткории АИКТ солҳои 80-уми асри гузашта аз навъҳои интродуксионӣ дар он аст, ки онҳо навъҳои ба сармо нисбатан тобоваранд, чунки дар он солҳо мушкилоти асосӣ ин ба сармо тобоварии навъҳо буд. Навъҳои зерӣ омӯзиш қарор дошта дорои хусусиятҳои мусбӣи ҳоси хоҷагию-биолгӣ, аз он ҷумла таъми лазиз, сифати баланд, барои хушконидаи мувофиқ, ҳосили баланд ва муҳлати нигоҳдориашон дарозмуддат мебошанд.

Тадқиқотҳои илмӣ мо оид ба омӯзиши хусусиятҳои агробиологӣ ва селексионии хурмои шарқӣ дар хоҷагии таҷрибавӣи Сунбулаи шаҳри Ҳисор дар баландии 700 м -800 м аз сатҳи баҳр ва стансияи таҷрибавӣи зироатҳои субтропикӣ ва ситрусӣ дар баландии аз сатҳи баҳр 300-350м дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ-ии гузаронида шудааст. Ин минтақаҳо барои парвариши хурмои шарқӣ хело мувофиқ аст. Парвариши хурмои шарқӣ дар минтақаи водии Ҳисор то баландиҳои 1300м аз сатҳи баҳр дар ноҳияи Файзобод парвариш меёбад.

Ҳоки ин минтақаи тадқиқотии шаҳри Ҳисор асосан хокҳои хокистарӣ ва қаҳваранги карбонати (хокистаранги муқарарӣ) буда, дар баландиҳои аз сатҳи баҳр 600-900 м ба назар мерасад. Гумуснокиашон 2-3 % мебошад.

Ҳоки ноҳияи Ҷ. Балхӣ хокистаранги равшан-дар ҳамвориҳои доманакӯҳӣ ва нишебии адирҳои паст дар баландиҳои 300-500 аз сатҳи баҳр м дучор шуда, гумуснокии таркибаш аз 1-1,5% мебошад. Микдори карбонатҳо 20% -ро ташкил медиҳад. Хокҳои ин минтақа хокистаранги равшани обёришаванда, ҳамчун зертип ҷудо шудааст.

Давраҳои нашъунамои хурмои шарқӣ аз варамкунии муғча то хазонрезӣ дар водии Вахш ба ҳисоби миёна 265 рӯз ва дар водии Ҳисор 245 рӯзро ташкил медиҳад.

Давраи гармии ҳаво дар минтақаи тадқиқотии шаҳри Ҳисор бо ҳисоби миёна 235-240 рӯзро ташкил мекунад. Ҷаъми ҳарорати ҳаво аз 0°C боло баробар ба 4900°C ва аз 10°C боло ба 4200 °C баробар аст.

Боришоти зиёд дар водии Ҳисор дар моҳҳои апрел 70 мм, март 63,5 мм ва январ 63, 3 мм ва нисбатан кам дар моҳи август 0 мм, сентябр 0,4 ва июл 4,6, инчунин боришоти солоне дар соли 2016- 485,5 мм, соли 2017- 403,9 мм ва соли 2018- 428 мм ба қайд гирифта шудааст. Боришот ва ҳарорати ба қайд гирифта ба рушду нӯмуи хурмои шарқӣ таҳдидунада набуда, дар ин минтақа метавонем дар ҳолати пурра таъмини обёрии боғҳо ҳосили ниҳои ва меваҳои хушсифат ба даст оварда шуд. Ҷамасола ҳарорати баланди ҳаво ба 40°C ва ниҳоии он ба 43°C баробар мешавад.

Ҳарорати ҳаво дар минтақаи тадқиқотии ноҳияи Ҷ. Балхӣ аз +10 °C аз 245 то 255 рӯз давом карда ҷамъи ҳарорати ҷаъоли ҳаво 4500-5800 °C-ро ташкил медиҳад, ки шароити хело фароҳам барои парвариши навъҳои зироатҳои ситрусӣ субтропикӣ аз он ҷумла хурмои шарқӣ хос аст.

Дар моҳҳои июн ва август боришот 2,2 мм нишон дода шудааст ва ҳарорати миёнаи баланди ҳаво, ки 28,3 ва 30,8°C буда, назар ба минтақаи тадқиқотии води Ҳисор, ки боришот дар моҳҳои нишондода шуда, 10,5мм ва ҳарорат 26,5 ва 28,9 °C мебошад, ки дар ин давра ҳарорати баланд дар моҳҳои июл- август дар баъзе ҳолатҳо то 48,5°C мерасад, намнокии хок паст ва намнокии ҳаво низ дар баъзе солҳо ҳамагӣ 45.6-51.5%-ро ташкил медиҳад, ки ба ҳосилнокии дарахтон аз он ҷумла, хурмои шарқӣ таъсири манфӣ мерасонад.

Ба сифати объекти тадқиқот навъу намунаҳои хурмои шарқӣ, аз қабилҳои навъҳои Шарқӣ, Шоҳона, Ваҳдат, Вахш, Тоҷикӣ ва Ҳисорӣ ки маҳсули селекцияи Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ

мебошанд, истифода шудаанд. Ба сифати навъи назоратӣ навъҳои Хиакуме ва Зенджи- мару ва ду намуди тағпайванд хурмои кавказӣ ва хурмои виргиниро интихоб гардиданд.

Дар шароити дигаргуншавии иқлим интихоби тағпайванд, ки нақши асосиро дар рушду нумӯи дарахтони мевадиханда мебозад ба инобат гирифта дар навъҳои нави ояндадор тағпайванди мувофиқро интихоб намудем. Даҳсолҳои охир баландшавии ҳарорати солони ҳаво дар водиҳои Ҳисор ва Вахш ба ҳосилнокӣ ва сифати мева таъсири манфӣ расонид. Дар ин замина интихоби тағпайванди хурмои кавказӣ барои навъҳои ояндадори хурмои шарқӣ, ки сабзиши мучаҳои пайванди то 80-85%, тез ба ҳосилдароӣ дар 3-4 солагӣ, мунтазам ҳосил бе солбандӣ ва ҳосилнокии баландро доро мебошанд бо мақсад мувофиқ аст. Натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки дар тағпайванди хурмои кавказӣ назар ба тағпайванди хурмои виргинӣ ҳосилнокӣ аз ҳар дарахт ба ҳисоби миёна дар се соли таҷриба дар дарахтони 3-5 сола 3,8 кг. ё 48% зиёд ба қайд гирифта шуд.

Давраи аз оромӣ баромадани дарахтони хурмои шарқӣ дар водии Вахш навъҳои Зенджи- мару- 06.03, Шоҳона -07.03. ва дар навъҳои Шарқӣ- 14.03. ва Хиакуме. - 15.03. дар водии Ҳисор навъҳои номбурда Зенчи- мари -17.03., Шоҳона -18.03. ва Шарқӣ- 25.03., Хиакуме. - 25.03. ба қайд гирифта шуд. Пухтарасии меваҳо дар водии Вахш дар навъҳои барвақти Шоҳона.- 30.09 Зенджи- мару- 02.10.ва. дар навъҳои дерпаз Шарқӣ 15.10. ва Хиакуме., 20.10. ва дар водии Ҳисор навъи Шарқӣ 26.10., ва Хиакуме 05.11. ба қайд гирифта шуд. Давраҳои нашъу нумӯи хурмои шарқӣ дар водии Вахш ба ҳисоби миёна 265 рӯз ва дар водии Ҳисор 245-250 рӯзро ташкил медиҳад. Асосан гузаронидани мушоҳидаҳои фенологӣ, хусусан давраҳои гулкунӣ, давонокии он вобаста ба навъҳо ва минтақа, инчунин фарқ кардани гулҳои нарина ва модина барои гузаронидани корҳои селекционӣ лозим меояд.

Дар солҳои тадқиқот муайян карда шуд, ки таъмини муътадили намнокии хок дар давраи афзоиш, устуворияти дарахтонро ба сармо зиёд мекунамд, хусусан соли 2016 дар 27-уми моҳи ноябр ҳарорати пасти шабона то-13-15° С расида буд. Дар варианти 1-ум бо меъёри 500-600м<sup>3</sup> дар 1гектар 12 маротиба обмонӣ дараҷаи зарар аз сармо дар навъҳои омӯзиши Шарқӣ (0,25), Шоҳона(1,25), Вахш (0,4) ва Ваҳдат (0,5) баҳогузори карда шуд. Дар ҳолати 4 маротиба обмонӣ бо меъёри 500-600 м<sup>3</sup> дараҷаи зарар аз сармо дар навъҳои номбурда 2,0, 2,5, 2,15, ва 2,25 ҳол баҳогузори гардид. Дар умум дар ҳамаи навъҳо устуворияти баланд низ ба сармо навъҳои Шарқӣ-1,1, Вахш -1,2 ва Ваҳдат -1,3, дар навъҳои назоратӣ Хиакуме-2,5, Зенджи-мару -2,2 ҳол баҳогузори гардид, ки ин аз устуворияти ба сармо баланди навъҳои дар омӯзиш қарор дошта шаҳодат медиҳад.

Муайян карда шуд, ки дар қитъаҳои тадқиқотии мо, дар водии Ҳисор маҳсулноки назар ба минтақаҳои субтропикии хушк, яъне водии Вахш зиёд мебошад. Дар моҳҳои июн ва август боришот 2,2 мм нишон дода шудааст ва ҳарорати миёнаи баланди ҳаво, ки 28,3 ва 30,8С<sup>0</sup> буда, назар ба минтақаи тадқиқотии води Ҳисор, ки боришот дар моҳҳои нишондода шуда, 10,5мм ва ҳарорат 26,5 ва 28,9 С<sup>0</sup> мебошад. Аз ҳамин лиҳоз моҳҳои июн то август давраи ташакулёбии меваҳо мебошад, аз норасоии нами, ҳарорати баланд ва паст будани гумуснокии хок ҳосилнокӣ дар минтақаи водии Вахш назар ба минтақаи водии Ҳисор паст ба қайд гирифта шуд. Натиҷаҳои ба даст омадаи мо дар водии Вахш аз гектар ба ҳисоби миёна ҳосилнокии баланд дар навъҳои Вахш-10,28, Шарқӣ -9,19, ва Хиакуме -8,8т /га дар водии Ҳисор бошад навъҳои Шарқӣ- 20,1, Ваҳдат- 19,2 ва Вахш-18,4 т/га, нисбатан кам дар водии Вахш навъҳои Тоҷикӣ - 7,5 ва Ҳисорӣ -7,4 т/га ва дар водии Ҳисор навъҳои номбурда, 9,8 ва 10,2 тонна аз як гектар ҳосилнокиро ташкил доданд.

Сабабҳои рехтани меваи хурмои шарқӣ вобаста аст аз як қатор омилҳои табиӣ. Натиҷаи тадқиқотҳо нишон дод, ки дар варианти якум дар сурати 10 маротиба обёрии дарахтон рехтани мева 8-15 %-ро ташкил дод, дар варианти дуюм-аз кам шудани обёрӣ (4 маротиба) рехтани меваҳо то 50-70 фоиз афзуд, дар варианти сеюм аз зиёд шудани обмонӣ (15-маротиба), рехтани меваҳо 30-50 фоизро ташкил дод. Инчунин аз баландшавии ҳарорати ҳаво рехтани меваҳо дар ҳолати норасоии об мушоҳида шуд. Аз тадқиқотҳои гузаронидаи мо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки навъҳои зери омӯзиш қарор дошта, яке аз сабабҳои рехтани меваҳо ин гардолуд нашудан, норасоии ғизо ва аз ҳама асос ин норасоии об дар давраи ташакулёбии мева мебошад. Бояд қайд кард, ки обёрии аз меёр зиёд ҳам сабаби рехтани меваҳои хурмои шарқӣ мегардад.

Дар ҳамаи вариантҳо соли 2017 дар водии Ҳисор ҳарорати миёнаи ҳаво 1-3 °C нисбатан баланд аз 1-уми апрел то 1 -уми октябр ҳарорати миёнаи моҳона 22 °C-ро ташкил дод, ки рехтани меваҳо аз 5 то 10% нисбати солҳои дигар зиёд буд.

Аз натиҷаи гузаронидани чошнигирӣ (дегустация) баҳои нисбатан баланд аз рӯи ҳол (0-5) ба навъҳои Шарқӣ 4,8, Ваҳдат 4,6 Шоҳона 4,6 ҳол баҳои паст ба навъҳои Тоҷикӣ-3,7 Ҳисорӣ- 3,5 ҳол ва ба навъҳои назоратӣ Ҳиакуме -3,8 ва Зенджи мару 3,9 - ҳол гузошта шуд, ки ин бартарии навъҳои омӯхташудаи моро нишон медиҳад.

Ягона камбудии хурмои шарқӣ ин мӯҳлати нигоҳдории мева мебошад, аз ҳамин лиҳоз барои дуру дароз нигоҳ доштани ин мева ва гум накардани хусусиятҳои шифоии он усули хушккунӣ ва навъи мувофиқро дар натиҷаи гузаронидани корҳои тадқиқотӣ интихоб намудем. Аз рӯйи натиҷаҳои хушккунии мева дар навъҳои омӯхташуда чунин нишондод қайд карда шуд. Хушккунии меваҳо дар ду вариант гузаронида шуд; бо тарзи доирашакл бурида шуда ва бутун. Дар чошнигирӣ баҳои баланд дар ҳар ду вариант навъҳои Ваҳдат 4,0x5,0 ҳол, Шарқӣ 3,8-4,8 ҳол,

нисбатан баҳои паст дар навъҳои Тоҷикӣ-2,8-3,5 ҳол ва Ҳисорӣ- 2,8-3,6 ҳол гузошта шуд, ки нисбати навъҳои назоратӣ Ҳиакуме ва Зенджи – мару 1,0- 1,5 ҳол баланд мебошад. Аз навъҳои зери омӯзиш қарор дошта нави Ваҳдат барои истеҳсоли хушкмева интихоб шуд.

Ташҳиси наву намунаҳои хурмои шарқӣ нишон дод, ки моддаҳои хушк дар навъҳои Ваҳдат 27% Шоҳона -26 % Шарқӣ- 25%, Ваҳдат -24% ва нисбатан кам дар нави Тоҷикӣ-18,4, қанднокӣ дар навъҳои Ваҳдат-22%, Вахш-21% ва Шарқӣ-20%, ва нисбатан кам дар нави Тоҷикӣ 13,4%-ро ташкил медиҳад, ки нисбати навъҳои назорати зиёд мебошад. Миқдори танин дар навъҳои таҳти омӯзиш қарор дошта аз 0,25 г/ % нави Ваҳдат то 0,39 г/ % дар нави Шарқӣ ва аз ҳама зиёд 0,60 г/ % дар нави Тоҷикӣ дида мешавад. Нишондодҳои мазкур дар навъҳои назоратӣ Ҳиакуме қанд 14,5%, танин 0,48 г/ %, Зенджи мару қанд 18,5, танин 0,45 г/ % муайян карда шуд. Ин аз он гувоҳи медиҳад, ки навъҳои ояндадор таъми ширин ва миқдори танинашон кам мебошад. Дар ҳолати зиёд будани танин дар меваҳо, яъне 1,0-1,5 % ё ин, ки 10-15 мг/г истеъмоли онҳо ғайри имкон мебошад. Ташҳиси таркиби химиявии меваҳо дар 8 наву намунаҳо дар озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии экспертиза ва озмоиши маҳсулоти фармасевтӣ ва тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пухтарасии истеъмолии меваҳо гузаронида шуд.

Дар солҳои тадқиқот дараҷаи осеббинии хурмои шарқӣ аз касалиҳо ва зараррасонҳои ба ҳисоби миёна, аз касалиҳои занбурӯғӣ дар мева пӯсиши хокистарранг 0,8 -ҳол, Фонопсис- 2,1 – ҳол, аз ҳашаротҳои зараррасон камтар Зиреҳаки бунафш-0,8, зиёдтар Гулхӯрак-2,5 ва Кирми баргхӯрак-3,0 ҳол осеб дидаанд. Осебинии дарахтони хурмои шарқӣ дар солҳои аввали тадқиқот зиёдтар аз касалиҳо Пӯсиши хокистарранг-2,0 ва Фонопсис-3,5 ҳол ва ҳашаротҳои зараррасон аз Тортанакканаҳо -2,2 ва Кирми баргхӯрак -3,5 ҳол дар солҳои минбаъда аз ҳисоби коркарди дарахтон бо фунгисидҳо ва захрдоруҳо бар зидди касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон, инчунин гузаронидани корҳои профилактикӣ

дараҷаи осеббинӣ паст баҳогузорӣ шуд. Зараррасонҳо ва касалиҳои хурмои шарқӣ дар муқоиса бо дигар дарахтони мевадиханда хело кам аст, чунки каслиҳои занбӯруғӣ дар дарахтони хурмои шарқӣ дар ду се сол як бор мушоҳида мегардад, ки ин ҳам дар ҳолати нагузаронидани қорҳои профилактикӣ, каму беш дар дарахтоне, ки дар минтақаҳои, ки рутубатнокиашон зиёд парвариш меёбанд вомехурад. Ҳашароти зараррасон (гурҳӯрак) ва касалии пусиши мева *diospyrios* ва нуқтаҳои сиёҳ ки дар солҳои тадқиқот мушоҳида шуд, каму беш ба баргҳо, мева ва наваҳои яқсола осеб расониданд ва ба сифати мева осеби ҷиддӣ нарасидааст. Сари вақт гузаронидани қорҳои профилактикӣ ва қорқарди дарахтон бо заҳрдоруҳо имконияти аз байн бурдани зараррасонҳо ва касалиҳо гардид.

Хароҷоти нисбатан кам барои истеҳсоли меваи хурмои шарқӣ дар ду минтақаи аз ҷиҳати ҳоку иқлим гуногун, водиҳои Вахш ва Ҳисор аз 16 то 22,5 ҳазор сомони инчунин дараҷаи даромаднокии иқтисодӣ мутаносибан наваҳои омӯзиши дар минтақаи водии Ҳисор аз 169,7 (наваи Шоҳона), то 222,6 % (наваи Шарқӣ) нисбати наваҳои назоратӣ (Зенджи мару) 65,3 то 134,3 % наваи (Ҳиакуме) дар минтақаи водии Вахш бошад дар наваҳои номбурда мутаносибан аз 43 то 90,7% дар наваҳои назоратӣ аз 7,5 то 28,3% зиёд мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки самаранокии наваҳои омӯзиши Шарқӣ, Шоҳона, Вахш ва Ваҳдат дар ҳар ду минтақа ҳамчун наваҳои ояндадор аз наваҳои назоратӣ бартарӣ дорад.

## Хулоса

1. Муайян карда шуд, ки интихоби тагпайванди хурмои кавказӣ назар ба тагпайванди хурмои виргинӣ, барои навъҳои интихобгардидаи ояндадори хурмои шарқӣ бартари зерин дорад; ба ҷои доими кучонидан то 90-95 %, сабзиши ниҳолҳо, ҷаспиши мучаҳои пайванди то 80-85%, тез ба ҳосил дароӣ дар 3-4 солаги, ҳосили баланд то 48% зиёд нисбат ба тагпайванди хурмои виргинӣ мебошад, [1-М, 12-М,].

2. Аз натиҷаи гузаронидани мушоҳидаҳои омӯзиши хусусиятҳои биологӣ ва фенологӣ муайян карда шуд, ки давраи аз оромӣ баромадани дарахтони хурмои шарқӣ байни навъҳои тезпаз ва дерӣ 8- рӯз ва фарқи байни водиҳо 11 рӯз мебошад, яъне дар водии Вахш дарахтон барвақтар аз оромӣ мебароянд. Пухтарасии меваҳо фарқи байни навъҳои барвақтӣ ва дерӣ 16-17 рӯз ва фарқи байни водиҳо 11-12 рӯз барвақт дар водии Вахш назар ба водии Ҳисор мебошад. Давраҳои нашъу нумӯи хурмои шарқӣ дар водии Вахш ба ҳисоби миёна 265рӯз ва дар водии Ҳисор 245-250 рӯзро ташкил медиҳад. Асосан гузаронидани мушоҳидаҳои фенологӣ, хусусан давраҳои гулкунӣ, давонокии он ва фарқ кардани гулҳои ҷинсҳои нарина ва модина барои гузаронидани корҳои селекционӣ лозим меояд, [7-М, 10-М, 13-М,].

3. Муайян карда шуд, ки таъмини муътадили намнокии хок дар давраи афзоиш, устуворияти дарахтонро ба сармо зиёд меkunанд. Дар таҷрибаҳои гузаронида устуворияти баланд ба сармо навъҳои омӯзиши Шарқӣ-1,1, Вахш -1,2 ва Ваҳдат -1,3 ва навъҳои назоратӣ Ҳиакуме-2,5, Зенджи мару -2,2 ҳол баҳогузорӣ гардид, [2-М, 10-М,].

4. Муайян карда шуд, ки дар минтақаҳои тадқиқотии мо, дар водии Ҳисор маҳсулотнокӣ назар ба минтақаҳои субтропикии хушк, (водии Вахш) зиёд мебошад. Аз натиҷаҳои ба даст омадаи мо дар водии Вахш аз гектар ба ҳисоби миёна ҳосилнокии баланд дар навъҳои омӯзиши Вахш-10,28, Шарқӣ -9,19, ва навъи назоратӣ Ҳиакуме -8,8т /га дар водии Ҳисор бошад навъҳои Шарқӣ- 20,1, Ваҳдат- 19,2 ва Вахш-18,4 т/га,

нисбатан кам дар водии Вахш навъҳои Тоҷикӣ - 7,5 ва Ҳисорӣ -7,4 т/га ва дар водии Ҳисор навъҳои номбурда, 9,8 ва 10,2 тонна аз як гектар ҳосилнокиро таъкил доданд, ҳосилнокӣ навъҳои дар омӯзиш қарордошта назар ба навъҳои назоратӣ Ҳиакуме ва Зенджи мару 3,6 т/га зиёд мебошад [5-М, 8-М,].

5. Сифати мева аз натиҷаи гузаронидани ҷошнигирӣ (дегустация) баҳои нисбатан баланд аз рӯи ҳол (0-5) ба навъҳои Шарқӣ 4,8, Ваҳдат 4,6 Шохона 4,6 ва баҳои паст ба навъҳои Тоҷикӣ-3,7 Ҳисорӣ- 3,5 гузошта шуд, , [10-М, 12-М].

6. Аз натиҷаҳои хушккунии меваҳои хурмои шарқӣ муайян карда шуд, ки баҳои нисбатан баланд аз рӯи ҷошнигирӣ ва сифати меваи хушк дар навъҳои омӯзишӣ Ваҳдат 4,0х5,0 ҳол, Шарқӣ 3,8-4,8 ҳол, нисбатан баҳои паст дар навъҳои Тоҷикӣ-2,8-3,5 ҳол ва Ҳисорӣ- 2,8-3,6 ҳол гузошта шуд, ки нисбати навъҳои назоратӣ Ҳиакуме ва Зенджи – мару 1,0- 1,5 ҳол баланд мебошад, [6-М, ].

7. Аз натиҷаҳои тадқиқот аниқ карда шуд, ки барои истеҳсоли меваи хурмои шарқӣ дар ду минтақаи аз ҷиҳати ҳоку иқлим гуногун, ҳарҷот дар як гектар барои истеҳсоли мева аз 16 то 22,5 ҳазор сомонӣ инчунин дараҷаи даромаднокии иқтисодӣ навъҳои омӯзиши дар минтақаи водии Ҳисор аз 169,7 (навъи Шохона), то 222,6 % (навъи Шарқӣ) нисбати навъҳои назоратӣ (Зенджи мару) 65,3 то 134,3 % навъи (Ҳиакуме) дар минтақаи водии Вахш бошад дар навъҳои номбурда мутаносибан аз 43 то 90,7% дар навъҳои назоратӣ аз 7,5 то 28,3% зиёд мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки самаранокии навъҳои омӯзиши Шарқӣ, Шохона, Вахш ва Ваҳдат дар ҳар ду минтақа ҳамчун навъҳои ояндадор аз навъҳои назоратӣ бартари дорад. [5-М, 8-М,].

8. Самаранокии баланди иқтисодии парвариши хурмои шарқӣ на фақат аз нархи фурӯши он вобастагӣ дорад, балки аз тез ба ҳосил дароии он, баланд будани ҳосил, аз ҳама асос ин паст будани арзиши аслии мева бо назардошти дар навбати худ бо ҳарҷоти кам дар буриши шохаҳо,

ҳимояи дарахтон аз зараррасонҳо ва касалиҳо ин аз як тараф хароҷоти нисбатан кам, нисбат ба дигар дарахтони мевадиханда ва аз тарафи дигар - меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, асоси арзиши меваи хурмои шарқиро баланд мекунад, [5-М, 8-М,].

### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои тадқиқот**

1. Навъҳои интихобгардидаи Шаркӣ, Шоҳона, Ваҳдат ва Вахш аз ҷиҳати устуворияти баланд доштан ба сармо, касалиҳо, бартарии сифати мева, мувофиқ барои хушккунӣ ҳамчун навъҳои ояндадор барои водихои Ҳисор ва Вахш тавсия дода мешавад.

2. Навъҳои интихобшуда навъҳои миёнапазу дерпаз ва якхонагию духонагӣ буда, дар истеҳсолот навъҳои Ваҳдат ва Шоҳона ҳамчун гардолудкунанда дар боғҳо, инчунин навъи Ваҳдатро барои хушконидаи пешниҳод мекунем.

### Рӯйхати адабиёти истифодашуда

1. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. Ч.I.-Л., Гидрометиониздат, Ленинград, 1976, 216 с.
2. Абдуллаев М.Ш., Гаджимурадова Р.М., Магомедова А.А., Атаева Р.Д. Определение содержания карбоновых кислот в хурме -Повышение качества и безопасности пищевых продуктов -материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) Махачкала 2016, с.111-113.
3. Алиев Х. А., Мукайлов М.Д., Омаров М.Д. Преспективи возделывания унаби в условиях Республика Дагестан // Научно- прикладные аспекты дальнейшего развития и интенсификации виноградовинодельческой отрасли в связи со вступлением России в ВС и ВТО: Матер. Всероссийской научно – практической конф. 2006- с. 478-481.
4. Бабаева У. А. Исследование фенольных соединений соков из плодов хурмы - Пиво и напитки -2013, 5, с.52-54.
5. Бейкер Х. Плодовые культуры. (семечковые, косточковые, ягодные, орехоплодные, виноград некоторые редкие культуры) Опыление. Москва «Мир»-1986. с.95.
6. Балыков Н.Г. Методы и устройства автоматической регистрации роста древесных растений / Биофизические методы исследований в экофизиологии древесных растений // . – Л.: Наука, 1979. – с.18–34.
7. Бережной, И.М. Субтропические культуры / И.М. Бережной, М.А. Капцинель, Г.А. Нестеренко // Субтропические культуры. - М.: Сельхозгиз, 1951. -с.34-40.)
8. Блиновский, К.В. Опыт культуры японской хурмы в Туркмении / К.В. Блиновский // Бюлл. ВНИИСС по культурам сухих субтропиков. - 1940. -№2. - с.49-52.
9. Бобиев И.А. Биологические и физиологические особенности *Punica granatum* L. и *Diospyros lotus* L в условиях Таджикистана. Автореферат. Казан – 2014. с. 8-10.

10. Ботаническая характеристика видов хурмы, относящейся к семейству черно древесных или эбеновых. Съедобные сорта хурмы, ее потребительские свойства и противопоказания к применению. Морфологическая характеристика разных сортов хурмы, ее культурный ареал. Рубрика Биология и естествознание. (Размещено на Allbest.ru) Реферат.18.01. -2016, с-36.

11. Брудная А.Ф. Методика прогноза урожайности винограда в Таджикистане, -Душанбе: ТаджУГКС,1986, -с.18.

12. Бушин П.Н., Василев К.В. и др. «Сборник научных работ» Выпуск XVII- Москва -1963 Сочинская опытная станция субтропических и южных плодовых культур. с.114.

13. Вельмакин С.Е., Долаева О.М., Горохов С.В. Редкие виды обтурационной тонкокишечной непроходимости - Бюллетень медицинских интернет-конференций, 2016, с.6-7.

14. Витковский Б.Л. Морфогенез плодовых растений. Научни ис. / ВАСХНИЛ //, - Колос,1984,- с.207.

15. Витковский, В. Л. Изучение коллекции субтропических плодовых культур: Методические указания / В.Л. Витковский. - Ленинград, 1989. – с.42.

16. Витковский, В.Л. Плодовые растения мира / В.Л. Витковский. - СПб., 2003. – с.403.

17. Возделывание хурмы на территории СССР. Зооинженерный факультет РГАУ-МСХА -1964. с. 2-6 (Неофициальный сайт.)

18. Вознесенский В.Л., Горбачёв Г.И., Штанько Т.П., и Филипов Л.А. Определение сахаров по обеспечению жидкости, Фелинга Ж. «Физиология растения» том 9. В2. 1962 с. 180-182.

19. Воронцов, В. В. Возделывание субтропических культур / В.В. Воронцов, У.Г. Штейман. - М.: Колос, 1982. –с.270.

20. Воронцов, В.Е. Хурма, её сорта и переработка плодов / В.Е. Воронцов // бюлл. ВНИИЧиСК. - 1945. - №1 и №2 – с.24

21. Габибов, Теймур Габетулаевич к.с.н. Рост и плодоношение интродуцированных сортов хурмы восточной в Южном Дагестане. автореферат дис. кандидат с/х наук -. Махачкала -2012 г. –с.26
22. Гаркунова, В.И. Сорты хурмы Черноморского побережья / В.И. Гаркунова // бюлл. ВНИИЧтСК. - 1946,- №4. – с.26.
23. Гасанов З.М. Научные основы технологии возделывания восточной хурмы в Азербайджане: Автореферат. дис. с.-х. наук. Сухуми, -1991. с.431.
24. Герасимов Г.К. Сад и огород, плодовые деревья хурма. Хурма: сорт выращивание и уход (в избранное). Россия 28.05. -2014. стр.5-6.
25. Герасимов.Г.К. Хурма: сорта, выращивание и уход.7 дач (28 мая 2014) с.35.
26. Гогия В. Т. «биохимия субтропических растений» Москва 1984. с. 158-159
27. Госагропром Таджикский ССР. Районированные сорта хурмы и унаби в Таджикистане.Душанбе-1987. с. 3.
28. Грязев В.А., Тутберидзе Ц.В., Причко Т.Г., Троянова Т.Л. Киви-высокоурожайный и ценный диетический пищевой продукт // Субтропическое и декоративное садоводство, 2004. Т-39-№2 – с.464-467.
29. Гулов С.М. Богдории субтропикй. Душанбе- 1998 с.13-15.
30. Гулов С.М. Богпарварии чузъй. Душанбе-2021. с.200-213.
31. Гулов С.М. Физиологические особенности субтропических культур в условиях Таджикистана: Автореф. дисс. докт. биол. наук. -Душанбе, 1998. – с.27.
32. Гулов С.М., Пирзода Т., Урунов Ф.У., Силвандер В.Г. Богпарварй, Душанбе-2015/с.89-93.
33. Гусейнова Б.М., Даудова Т.И. Биохимический состав плодов хурмы, выращиваемой в Дагестане, и его изменение в процессе холодового хранения // Сельскохозяйственная биология. – 2011. – № 5. – с. 107–112.

34. Гутиев Г.Т. Субтропическая хурма. Сад и огород. -№1- 1950. С-вып. 2-с.39-40.
35. Гутиев Г.Т.Субтропические плодовые растения, Москва-1958. с.164.
36. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. -5-е изд. Перераб. И доп. –М: Агропромиздат, 1985. - с.351.
37. Давидов М.И., Владимирский Е.В., Никонова О.Е. Вопросы этиопатогенеза, клиники и диагностики безоаров желудочно-кишечного тракта - Дневник Казанской медицинской школы 2016, 4(14), с.21-25.
38. Дадыкин В. В самых северных субтропиках. Москва Агропромиздат 1985.с. 142-143.
39. Дзимистаришвили Н.Б. Субтропических культуры №5 Грузинская ССР. 1973. с.172-173.
40. Дзюндзя О. Перспективы использования хурмы в производстве продуктов питания функционального назначения - Товары и рынки 2009, 2, с. 65-70.
41. Драгавцев А.П. Корневая система фейхоа и японской мушмулы // Советские субтропики. 1937. №2. с. 52-54.
42. Драгевцева И.А., Савин И.Ю. Управление продуктивностью и продукционным процессом плодовых культур на основе закономерностей их генетических и фенотепических изменений при смене лимитов внешней среды. Журнал -Садоводство и виноградарство. 2020 №1 с.46.
43. Екимов В.П.Суптропическое пловодство. Селхозгиз-1955. Хурма стр. 273.с. 2-3
44. Ермаков В. А. Методи биохимический растений. 1987, с.127.
45. Животинская С.М. Культура хурмы в Узбекистане. Ташкент-1972. с.7-8.
46. Животинская С.М., Кульков О.П. «Субтропические культуры» №5 Грузинская ССР. «О морозоустойчивости восточной хурмы в Узбекистане» 1968, с.88.

47. Загиров Н.Г., Возделывание хурмы восточной в условиях юга Дагестана. Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата наук: 2012. Автореферат с.28.

48. Загиров Н.Г., Мурсалов М.М. О возможности выращивания хурмы восточной в южном Дагестане // Вестник РАСХН, 2010. -№4- с.31-33.)

49. Загребельный И.А. Эффективное использование агроклиматических ресурсов субтропиков Таджикистана. Душанбе -1985, 18-21

50. Зактрергер, Н.И. Новые сорта восточной хурмы и граната селекции Туркменской опытной станции / Н.И. Зактрергер // Тр. туркм. оп. ст. ВИР, 1962. -вып.3.- с.82-93.

51. Зактрергер, Н.И. Сорта японской хурмы на Черноморском побережье / Н.И. Зактрергер // Советские субтропики. - 1977. - №1. - с.22-32.)

52. Запрягаева В.И Ленинград Лесные ресурсы Памиро- алая.1976. с.16-18.

53. Запрягаева В.И.Дикорастущие плодовые Таджикистана –М.-Л.Наука, -1964. с.32-34.

54. Заремук Р.Ш., АлехинаЕ.М., Богатырева С.В., Доля Ю.А. Роль генетическихколлекций в создании новых сортов косточковых культур//Плодоводство и виноградарство Юга России, 2012. -№ 15. -с.32-42.

55. Зарецкий, А.Я. Восточная хурма / А.Я. Зарецкий // Субтропические культуры Таджикской ССР. - Душанбе, 1951. - с.93-106.)

56. Изучение коллекции субтропических плодовых культур: методические указания ВИР- Ленинград, 1989. с.142.

57. Ильницкий О.А., Бойко Н.Ф., Федорчук М.И. и др. Основы фитомониторинга (мониторинг физиологических процессов в растениях). – Херсон, 2005. –с. 345.

58. Ильницкий О.А., Корсакова С.П., Плугатарь Ю.В. «Взаимосвязь между некоторыми экофизиологическими характеристиками хурмы

восточной (*diospyros kaki* l.) и условиями внешней среды» Никитский ботанический сад Сборник научных трудов ГНБС 2016.Том. 142.) –с 32-34

59. Ильницкий О.А., Ушкаренко В.А., Федорчук М.И., Радченко С.С., Бондарчук С.В. Методология и приборная база фитомониторинга. Учебное пособие. Херсонский государственный аграрный университет. – Херсон, 2012. – с.124.

60. Кутеминский В.Я., Леонтьева Р.С.//Почвы Таджикистана. Условия почвообразования и география почв. // В.Я. Кутеминский, Р.С. Леонтьева //Вып.1. –Душанбе: Ирфон,1966. –с.60-65.

61. Карманов В.Г., Рябова Е.П. Прибор для регистрации относительных изменений скоростей водного потока по растению // Сб. Тр. По агрономической физике. – Л., 1968. – Вып. 16. – с.81–87.

62. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара-2012. с.62-64.

63. Кобель Ф. Плодоводство на физиологической основе / Ф. Кобель // М., «Сельхозгиз», - 1967. – с.374.

64. Колесников В.А. «Частное плодоводство» Москва-1973. с.233. абз.3.

65. Колесников В.А. Методы изучения корневой системы древесных растений/ Колесников В.А.// - М., «Лесная промышленность», 1972. – с.190.

66. Колесников В.А. Методы изучения корневой системы древесных растений. М.: Лесная пром-сть, 1979. с.152.

67. Кормилицин А.М. Пути переделки природы субтропических растений в Средней Азии. «Управление водным режимом сеянцев» Сталинабад-1940 с. 76 абз. 2-3.

68. Кулиев Ф. А., Гасанов З.М., Рамазанов С.М. и другие Субтропические культуры 5. Сухуми -1973. с. 45-47.

69. Кульков О.П. Субтропические плодовые Узбекистана Ташкент-1966 с.26-27.

70. Кульков О.П., Животинская С.М. Температурные условия прохождения фенофаз восточной хурмы на юге Узбекистана, Труды НИИСВ и В им. Р.Р. Шредера, вып. 32, Ташкент, Изд-во «Фан» АН УзССР, 1970.с 26.
71. Коровин В.А. Совместимость привой и подвой яблони. Колос, 1979, с.127.
72. Кулян Р.В. Цитрусовые культуры как объект для селекции / Субтропические и декоративные садоводство. 2012.-Вып. 46. - №1. - с.71-74.
73. Кулян Р.В., Иваненко Ф.К., Ксенофонтова Д.В. Новые сорта *Asimina Triloba* (L) Dinal (Азимины трехлопастная) для субтропиков Россия // Плодоводство и ягодоводство Россия, 2015. - Т.41- с.223-227.
74. Кулян Р. В., Киселева Н.С. Характеристика пыльцевых зерен коллекционных форм цитрусовых // Новые технологии. 2016. Вып. 3. с. 110-118.
75. Кутузова А.С. Садоводство и виноградарство. Ташкент-1978. «Влияние площади питания на рост и плодоношение хурмы восточной в условиях юга Узбекистана. с 88.
76. Кушнеренко М.Д., Курманова А.Б., Исакова М.Д. О засухоустойчивости абрикоса Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии, 1985. -№1,-с. 17-19.
77. Кьосев П.А. Полный справочник лекарственных растений М., Экмо-пресс, 2000. с.56-57
78. Лалетин В.Г., Аржанов С.Я. Фитобезоары желудка -Сибирский Медицинский Журнал (Иркутск) 1995, с. 32-33.
79. Ласареишвили Л.Н. Субтропические культуры №3. 1968.Грузинская ССР. с. 63.
80. Мануйло Ф. Ф. Журнал «Субтропических культуры» Грузинская ССР. «Определение сортов хурмы в питомнике», №5. 1973. с. 129.

81. Мануйло, Ф.Ф. Определение в питомнике сортов хурмы, выведенных Туркменской опытной станцией ВИР / Ф.Ф. Мануйло // Субтропические культуры. - 1975. - №2. -с.26-28.)
82. Массовер Б.Л., Бурякова В.П. Селекция и агротехника субтропических культур Душанбе -1980. с .21-22.
83. Маслихатхо ба богпарварон Душанбе, «ирфон» 1992 с.34-35.
84. Массовер Б.Л. «Рекомендации по размножению хурмы восточной в Таджикистане». ТНИ Институт садоводства, виноградарства и овощеводства. Душанбе-1985. с.7-8.
85. Массовер Б.Л. Биология роста и плодоношение восточной хурмы в условиях юга Узбекистана и вопрос ее обрезки. Реферат, Душанбе-1965. с. 28.
86. Массовер Б.Л. Культура хурмы в Таджикистане. Душанбе-1980 с. 55.
87. Массовер Б.Л. Морозоустойчивость хурмы в Таджикистане. «Селекция и агротехника субтропических культур» Душанбе - 1985.с.3-20
88. Массовер Б.Л. Реферативный журнал-«Плодовые и субтропические культуры, виноград» «Селекция морозоустойчивых сортов- хурмы восточной в Таджикистане. – Москва, 1978 №1. с 31-32
89. Массовер Б.Л., Леванов Ж.А. «Рекомендации по возделыванию субтропических плодовых культур в Таджикской ССР» Душанбе 1985г.с.26
90. Методические указания ВИР. Изучение коллекции субтропических плодовых культур. – Ленинград, 1989. – с.142.
91. Микаладзе А.Д. Субтропические плодовые и технические культуры. //М.: Агропромиздат, 1988. – с.288.
92. Миников А.Г. Селекция и агротехника субтропических и цитрусовых культур, том 7. «Сроки происхождения фенологических фаз хурмы в центральном Таджикистане». Душанбе -1989. с. 80.

93. Можар Р.В. Результаты сортоизучения груши в условиях импортозамещения /// Субтропические и декоративные садоводство. 2016.-Вып.58. - с.55-61.

94. Мокаин М. Д. Садоводство промышленного типа /Мокаин М.Д.// - Кишинев, «Карта Молдовеняска», 1977. – с.140.

95. Мосияш А.С. Фенология субтропических культур в зависимости от погодных условий в Сочи. Сборник научных работ Сочинской опытной станции субтропических и южных плодовых культур Москва -1963 с.98-100.

96. Мурри Н. М. Хурма — Сухуми: АБГИЗ, 1941. - с.63.

97. Мурри, Н.М. Хурма / Н.М. Мурри // тр. питомника субтропических культур. - 1941,- вып 11. - с.68.

98. Мурри, Н.М. Хурма / Н.М. Мурри. - Сухуми, 1971. - с. 62.)

99. Мухамедов А. Х., Дадоджанов Г. Пути повышения урожайности садов, виноградников и овощных культур. Материали научно-практической конференции- г. Душанбе 21.12.2012. «Перспективы возделывания культуры хурмы восточной в предгорных зонах северного Таджикистана». Институт садоводство и овощоводство. с. 276.

100. Мухамедов А.Х., Дадоджанов Г. Вклад биохимия и химии в обеспечении продовольственной безопасности и развитие инновационных технологий в Таджикистане. Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 80-летию ХГУ им. Академик Б.Гафуров и 80-летию факультета биология и химии –Худжанд, 2012 г.

101. Набиева З. Ю. Субтропическая хурма в Азербайджане: автореф. дис. канд. с-х наук. М., 1958. с.24

102. Назиров Х., Камолов Н., Мамадалиева М. Анорпарварӣ Душанбе -2017 с.14-18.

103. Омаров М. Д., Кулян Р. В., Омарова З. М. Характеристика сортов и гибридов хурмы восточной (*Diospyros kaki* L.) по признакам продуктивности // Аграрный научный журнал. 2020. № 9. с. 25–29.
104. Омаров М.Д. Биохимический состав плодов хурмы восточной (*Diospyros kaki* L.) и его значение // Садоводство и виноградарство. 2012. №1. с. 37-39.
105. Омаров М.Д. Влияние крутизны склона и схемы посадки на продуктивность хурмы восточной // Садоводство и виноградарство. 2001. №6. с.20.
106. Омаров М.Д. Научные основы возделывания хурмы восточной в субтропической зоне РСФСР: автореф. дис. д.с.х. наук. Сухуми, 1991. с.46
107. Омаров М.Д. Омарова З.М - Архитектоника корневой системы хурмы восточной в зависимости от подвоя и рельефа. Текст научной статьи по специальности «сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство» новые технологии -2019. с. 43-50.
108. Омаров М.Д. Перспективные гибриды хурмы восточной // Садоводство и виноградарство. – 2014. – № 4. – с.26–27.
109. Омаров М.Д. Результаты селекционной работы по улучшению сортимента хурмы восточной (*Diospyros kaki* L.) во влажных субтропиках России // Проблемы развития АПК региона. 2016. Т. 27, №3(27). с. 68-72)
110. Омаров М.Д. Тезисы докладов научной конференции (в рамках СНГ) «Интенсификация садоводство на склонах» Влияние схемы посадки на рост, развитие и продуктивность деревьев хурмы восточной на склонах» Нальчик- 1994г. с. 132.
111. Омаров М.Д. Хурма восточная в субтропиках России: монография. Сочи: КЗ, 2000. с.100.
112. Омаров М.Д., Авидзба М.А. Влияние сорта-привоя на развитие корневой системы саженцев хурмы восточной //

Субтропическое и декоративное садоводство: сборник научных трудов. Вып. 48. Сочи: ВНИИЦиСК, -2013г. с. 157-163.)

113. Омаров М.Д., Авидзба М.А. Развитие корневой системы хурмы восточной в зависимости от помологического сорта привоя Садоводство и виноградарство. 2012. №5. с. 29-31

114. Омаров М.Д., Беседина Т.Д. Возделывание хурмы восточной в субтропиках России. - Сочи ГНУ ВНИИЦ и С К Россельхозакадемии, 2012. – с.162.

115. Омаров М.Д., Кулян Р.В. Основные направления селекции хурмы восточной в субтропической зоне Краснодарского край // Проблемы развития АПК региона, 2017,- Т; 1-№2-30. -с.42-46.

116. Омаров М.Д., Кулян Р.В. Создание новых форм хурмы восточной на Черноморском побережье Краснодарского края // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2015. №2. с. 23-26.

117. Омаров М.Д., Кулян Р.В., Омарова З.М. Хурма восточная в коллекции ВНИИЦиСК-Основа для выделения источников хозяйственно- ценных признаков // Плодоводство и ягодоводство России. Том 55. Москва-2018, 18-20.

118. Омаров М.Д., Омарова З.М. Биохимический состав плодов хурмы восточной и фейхоа // Проблемы развития АПК региона. 2012. Т. 12, №4(12). с. 49-53.

119. Омаров М.Д., Омарова З.М. Сорта хурмы восточной (*Diospyros kaki* L.) и их биологические особенности // Субтропическое и декоративное садоводство: сборник научных трудов. Т. 57. Сочи: ВНИИЦиСК, 2016. с. 69-72.

120. Омаров М.Д., Рындин А.В. Сортимент хурмы восточной в субтропиках России // Субтропическое и декоративное садоводство: сборник научных трудов. Вып. 42. Т. II. Сочи: ВНИИЦиСК, 2009. с. 332-342,

121. Омаров М.Д., Кулян Р.В.Омарова З.М. Оценка коллекции хурмы восточной (*Diospyros kaki* L.) по основным хозяйственно ценным признакам. Аграрный научный журнал. 2022. № 2. с. 30–33
122. Омаров, М.Д. Возделывание хурмы восточной в субтропиках России / М.Д.Омаров, Т.Д.Беседина // - Сочи, 2012. – с.162.
123. Омарова З.М.Оценка новых форм фейохоа по признакам продуктивности и качества / Проблемы развития АТП, 2016. -№1(25). - Ч.1. –с.56-59.
124. Омаров М. Д., Кулян Р. В. ЖУРНАЛ, Новые технологии, Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство Селекция хурмы восточной во влажных субтропиках Краснодарского края, г. Сочи -2017 .с.120-124.
125. Пасенков А.К. Итоги сортоизучения восточной хурмы в Никитском ботаническом саду // Труды Никит. ботан. сада – Ялта. – 1970. – Т.47. – с.5–9.
126. Паушева, З.П. Практикум по цитологии М: «Колос», 1980. – с.304.
127. Петенг де Вогренан де Кюньяк Д.Т., Курбанов М.К., Саидов А.А., Джураев Х.Ш., Азонов Д.А., Бердыев Н.Б. Густой экстракт плодов (винограда, шелковицы и восточной хурмы) как источник жизненно важных микроэлементов и витаминов - Здравоеохранение Таджикистана 2012, 1, С. 54-57.
128. Полевой В.В. Физиология растений: учебник / В.В. М. Высш. Школа. 1989. с.464.
129. Програма и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур Орёл 1999. – с.310.
130. Программа Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда на период до 2030 года. Краснодар, 2013. с.202.

131. Программы Северо – Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных цветочно- декоративных культур и винограда на период до 2030 года. Краснодар, 2013. – с.202.
132. Раджабов К.Р. Вахшская зональная опытная станции субтропических культур. Тематический сборник научных трудов. Том 1. Селекция и агротехника цитрусовых культур. част 1. - Душанбе -1985. с.9.
133. Раджабов А.К., Рындин А.В., Келина А.В. Субтропическое садоводство. Москва, 2016. с 216-218.
134. Реферат Описание хурмы [176,4К], Allbest.ru добавлен, 2013. С.26.
135. Розанов Б.С., Эшонкулов У.Э. Меваҳои гармидусти Тоҷикистон Душанбе 1973. с.28-29.
136. Розанов Б.С., Эшонкулов У.Э., Б.Л. Массовер Субтропические плодовые культуры Таджикистана, Душанбе, 1974, с 28-30.
137. Розанов Б.С, Данилов В.Л, Скороход С.Т. «Плодоводство Таджикистана» Душанбе 1970 с. 155.
138. Розанов Б.С. Биозкологические основы субтропического плодоводства в Средней Азии. «Субтропические культуры», ВНИИЧИСК №6 (104), Махарадзе – Анасеули,1969, с.41-43.
139. Розанов Б.С., Ширяева П.Г. Труды Таджикского научно-исследовательского Института садоводства, виноградарства и субтропических культур им. И.В. Мичурина. «Краткие итоги работы по сортоизучению и селекции граната, инжира и восточной хурмы республиках Седней Азии. –Сталинабад -1958. с. 87.
140. Розанов Б.С., Эшонкулов У.Э. «Субтропические культуры» 1972. №2 Грузинская ССР. с.109.
141. Розанов, Б.С. Ширяева Н.Г. Восточная хурма и перспективы её культуры в Таджикской ССР Сельское хозяйство Таджикистана. – 1949. - №4. -26 Вестник Мичуринского государственного аграрного университета №2, 2015. с.32-34.

142. Рындин А. В., Загиров Н. Г., Ибрагимов Н. А. Биологическая оценка интродуцированных сортов хурмы восточной в сухих субтропиках Южного Дагестана // Овощи России. 2019. № 3(47). с. 116–120
143. Рындин А.В., Кулян Р.В. Коллекция цитрусовых культур во влажных субтропических России. / Садоводство и виноградарство, 2016. -№5. – с. 24-30.
144. Рындин А.В., Мохно В.С. Генетические ресурсы садовых растений в субтропических России и возможности их использования // Субтропическое и декоративное садоводство. –Сочи: ВНИИЦ и СК. 2012.-Т. 47. -№ 2. –с. 13-22.
145. Рындин А.В., Мохно В.С. Основные направления в селекции садовых культур на Черноморском побережье Краснодарского края // Субтропическое и декоративное садоводство: сборник научных трудов. Т. 45. Сочи: ВНИИЦиСК, 2011. с. 140-149.
146. Рябова А. С. диссертация, Совершенствование технологии хранения и переработки плодов хурмы, выращенной в условиях Абхазии. Краснодар -2013, с.50-52.
147. Раҳматов С.Ҳ. / Сабзиш ва қадкашии ниҳоли хурмои шарқӣ вобаста аз тағпайванд // Гузоришҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. №1- Душанбе -2017, с. 28-31.
148. Раҳматов С.Ҳ. / Нашъу нумӯ ва маҳсулотнокии хурмои шарқӣ вобаста аз тағпайванд дар шароити водии Ҳисор // Маводҳои конференсияи илмию назарияи байналмилалӣ дар мавзӯи «Истифодабарии усулҳои инноватсионии дар баланд бардоштани ҳосилнокии дарахтони мевадиханда, ангур ва зироатҳои сабзавотию картошка» Душанбе – 2022. с. 21-24.
149. Сафаралиев Х.Ф. Даромаднокии иқтисодии дарахтони себ вобаста аз намудҳои тағпайванд. Автореферат диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои биологӣ Душанбе – 2009. – с.27.

150. Сборник научных работ выпуск XVII Сочинский оп.ст. -1963 с. 113.
151. Селянинов, Г.Т. Климатическая характеристика субтропических многолетников и перспективы субтропического хозяйства в СССР в связи с природными условиями / Г.Т. Селянинов. - Л.: Гидрометеиздат, 1961. – с.142.)
152. Семаш М. Д. Орошение плодового сада / Семаш М. Д. // - Киев, «Урожай», 1975. – с.163.
153. Семин В.С., Ильницкий О.А. Исследование суточных колебаний изменений диаметра корней, побегов и плодов алычи в связи с внешними условиями // Физиология и биохимия культурных растений. – 1978. – Т.10. – №3. – с.308–311.
154. Смыков В.К. Исследование биологических особенностей яблони и абрикоса и принципы формирования сортиментов для промышленных насаждений /В.К. Смыков// Автореферат диссерт. на соиск. уч. ст. докт. биол. наук, Кишинев, - 1974. – с.26
155. Степанов С.Н., Плодовых питомник, подвой плодовых культур, Москва- Колос-1981, с. 24-35.
156. Силвандер В.Г., Менликиев М.Я., Хасанова М.Р. ва дигарон Субтропические культуры Таджикистана, 1989-с 37-39.
157. Соколов Ю.Ю., Давидов М.И. Безоары желудочно-кишечного тракта у детей - Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского 2010, 89, 2, с.60-64.
158. Соловьева М.А. Влияние азотного питания на функциональные изменения и морозоустойчивость абрикоса /М.А.Соловьева//Садоводство. 1992, № 1. - с. 8-11.
159. Товкач С. Садоводство и виноградарство. Ташкент -1978. «Некоторые вопросы водного режима хурмы восточной» с.151.
160. Тутберидзе Ц.В. Биологические свойства и хозяйственная оценка интродуцированных сортов киви в субтропиках России:

Автореферат дисс. к.с.х. наук – Сочи Кубанский государственный аграрный университет, 2005. -с.27.

161. Тутельян, В.А. Ваше здоровье - в ваших руках / В.А. Тутельян. -Пищевая промышленность. - 2005. - №4. - с. 6-8.

162. Урунов Ф. Гулов С.М. Богдории Тоҷикистон. Душ. -2018. с.36- 37.

163. Франчук Е.П. Труды IV всесоюзного семинара по-биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. Мичуринск-1972. с 197.

164. Хмара М.Б., Козлов В.В., Гнилосыр П.А., Горфинкель И.В., Горохов С.В., Князевская Е. Э. Неопухолевая обтурационная тонкокишечная непроходимость - Бюллетень медицинских интернет-конференций 2013, с. 419.

165. Хохлов С. Ю. Оценка сортов хурмы в коллекции Никитского Сада // Сборник научных трудов ГНБС.— Т. 140. 2015. с. 206-220. ISSN0201-7997

166. Хурма и унаби в Средней Азии, Государственный агропромышленный комитет СССР,1986. с. 108-109.

167. Хурма королек и другие популярные сорта. Orchardo.ru.

168. Чимпоеш Г.П. Размножение тропическихи субтропических плодовых культур. Кишинев-1988 с. 4-6.

169. Шамурин В.Ф. О суточном ритме и экологии цветения некоторых арктических растений «Ботанический журнал», т.43. вып.8-1958. с.26.

170. Шейхмагомедова Г.Н. Сортовые и технологические особенности хранения и переработки плодов хурмы восточной в условиях южного Дагестана. Автореферат. Махачкала-2012. с. 24.

171. Ширяева Н.Г., ва Розанов Б.С. Возделывание хурмы восточной в Таджикистан. Сталинабад -1961. с.12-13.

172. Шлыкова Г. Советские Субтропики и их освоение. Ленинградское областное издательство -1935 с.-67.

173. Эшанкулов У.Э, Цулая В.И. Субтропические культуры, Грузинская ССР. «Субтропические Таджикистана» 1982 -№ 6 с 106.
174. Юсупова Г. С. Кароматов И.Д., Текст научной работы на тему «Лечебные свойства хурмы восточной» Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 - январь (18) Бухара-2018, с 31-33.
175. Ядров А.А. О температурных пределах активности пыльцы плодовых. Труды Южно – Узбекской селекции плодово-виноград. станции. Выпуск 2. Душанбе -1964. с. 26-28.
176. Ядров А.А., Синько Л.Т., Казас А.Н., Шолохова В.А. Орехоплодные и субтропические плодовые культуры. – Симферополь: Таврия. – 1980. - с 16-19.
177. Akca Y., Ozkan Y., Asma B. M. A study on determinati of yield and fruit characteristics of certain Turkish dried apricot cultivars and types \ International symposium on apricot culture.25-30 May 1997. –Greece, Veria-Makedonia,1997.-Vol. 1.- P. 129-133.
178. Akagi T., Kajita K., Kibe T., Morimura H., Tsujimoto T., Nishiyama S., Kawai T., Yamane H., Tao R. Development of molecular markers associated with sexuality in *Diospyros lotus* L. and their application in *D. kaki* thunb // Japanese society for Horticultural science. 2014. T. 83. № 3. с. 214–221.
179. Badal E., Abd El-Mageed T.A., Buesa I., Guerra D., Bonet L., Intrigliolo D.S. Moderate plant water stress reduces fruit drop of “Rojo Brillante” persimmon (*Diospyros kaki*) in a Mediterranean climate // Agricultural Water Management. – 2013. – № 119. – P.154–160.
180. Badal E., I. Buesa I., Guerra D., Bonet L., Ferrer P., Intrigliolo D.S. Maximum diurnal trunk shrinkage is a sensitive indicator of plant water, stress in *Diospyros kaki* (Persimmon) trees // Agricultural Water Management. – 2010. – № 98. – P.143–147

181. Butt M.S., Sultan M.T., Aziz M., Naz A., Ahmed W., Kumar N., Imran M. *Persimmon (Diospyros Kaki) fruit: hidden phytochemical and health claims* // EXCLI Journal. - 2015. – № 14. – P.542–561.
182. BerkeleyWellness.com. UC Berkeley, 2015, c.3-4.
183. Closs R.L. The heat pulse method for measuring rate of sap flow in a plaut stem // New Zeland J. Shi. – 1958. – V.1. – P.281–288
184. Debra Morris. *Persimmon. Martinez Tribune* Nov 16, 2015, P. 34-35.
185. Daum C.R. A method for determining water transport in trees // Ecology. –1967. – V.48. – P. 425–431.
186. Edward F. Gilman and Dennis G. Watson. Diospyros kaki: Japanese Persimmon // ENH38.— Environmental Horticulture Department, University of Florida, IFAS, Florida A & M University, USA, 1993. P.14-19.
187. Intrigliolo D.S., Castel, J.R. Performance of various water stress indicators for prediction of fruit size response to deficit irrigation // Agricultural Water Manage. – 2006a. – № 83. – P. 173–180
188. Huber B., Schmidt E. Aine Kompensationsmethode zur thermoelektrischen Messung landsamer Saftsrome // Ber. Deut. B.t. Ges. – 1937. – Bd.55. – S.514–529.
189. Klepper B., Browning V.D., Tauior H.M. Stem diameter in relation to plant water stress // Plant. Physiol. – 1971. – V. 48. – №6. – P. 683–685
190. Mowat A.D., George A.P, Collins R.J. Cultivation of persimmon (*Diospyros kaki* L.) under tropical conditions // Acta Hort. – 1995. – № 409. – P.141–149.
191. Morton, J. Japanese Persimmon// Fruits of warm climates.— Julia F. Morton, Miami, FL; Web-publications by Purdue University, 1987.— C. 411–416. 505 c. — ISBN 0-9610184-1-0.
192. Neuwald, D. A., Saquet, A. A., Sestari, I. and Sautter, C. K. Persimmon production and commercialization in Brazil: An Overview// IV International Symposium on Persimmon / E. Bellini, E. Giordani. - Acta

Horticulturae. — International Society for Horticultural Science, -T. 833, 2009, c. 51-56.

193. *Persimmon (Diospyros Kaki)* fruit: hidden phytochemical and health claims // EXCLI Journal. - 2015. – № 14. – P.542–561.

194. Types of Persimmon. BerkeleyWellness.com. School of Public Health at UC Berkeley 12 November, 2015.

195. <http://www.7dach.ru/gergenkor/hurma-sorta-vyraschivanie-i-uhod-5467.html>

## **Интишоорот аз рӯи мавзуи диссертатсия**

### **Мақолаҳо дар маҷалаҳои тақризшаванда:**

[1-М]. **Раҳматов С.Ҳ** Сабзиш ва қадкашии ниҳоли навъу намунаҳои хурмои шарқӣ вобаста аз тағпайванд / С.Ҳ. Раҳматов // Гузоришҳои АИКТ, -№1, (51), 2017, с. 28-31.

[2-М]. **Раҳматов С.Ҳ**. Степень морозоустойчивости саженцев хурмы восточной в зависимости от водного режима почвы / С.Ҳ. Раҳматов// Доклады ТАСХН, - № 1, (59). 2019, с.32-34.

[3-М]. **Раҳматов С.Ҳ**. Рушду нумуи ниҳоли хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисор / С.Ҳ. Раҳматов, Н. Камолов // Гузоришҳои АИКТ, -№1, (67), 2021, с. 39-42.

[4-М]. **Раҳматов С.Ҳ**. Причины осыпания плодов хурмы восточной и меры его предотвращения в условиях Гиссарской долины / С.Ҳ. Раҳматов // Ахбори АМИТ- №4. 2021, с.54-59.

[5-М]. **Раҳматов С. Ҳ**. Маҳсулнокии навъҳои хурмои шарқӣ дар шароити водии Вахш ва Ҳисор / С.Ҳ. Раҳматов// Кишоварз ДАТ- №1(98), 2023, с.78-80.

[6-М]. **Раҳматов С. Х**. Пример применения водного раствора серебра при хранении овощей и фруктов / С.Ҳ. Раҳматов, Г.М. Бобизода, Р.У. Эшанқулова //Наука и инноватсия ТНУ -№1, 2023, с. 91-100.

[7-М]. **Раҳматов С.Ҳ**. Сравнительное изучение роста и развития хурмы восточной в регионах с различными климатическими условиями / С.Ҳ. Раҳматов // Гузоришҳои АИКТ- № 4, 2024, с. 71-75.

[8-М]. **Раҳматов С.Ҳ**. Касалӣ ва ҳашаротҳои хурмои шарқӣ дар шароити водии Ҳисору Вахш ва ҷораҳои пешгирии онҳо /С.Ҳ. Раҳматов // Гузоришҳои АИКТ - № 4, 2024, с. 85-89.

### **Мақола ва тезисҳо дар маҷмӯаҳои маводи конференсияҳо**

[9-М]. **Раҳматов С.Ҳ**. Хусусиятҳои биологӣ ва нашъу намои навъу хурмои шарқӣ. / С.Ҳ. Раҳматов, М.Табарова // Маводи конф. илмию амалии ҷумҳуриявӣ “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ”, Бахшида ба 30- солагии Истиқлолияти

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” - 2021, с. 50-53.

**[10-М]. Раҳматов С.Ҳ.** Таъсири зичии тағпайвандҳои хурмои шарқӣ ба ҳасили муғчаҳо ва истеҳсоли ниҳоли пайванди / С.Ҳ. Раҳматов, С. Абдулоев// Маводи конференсияи илмӣ ҷумҳуриявӣ «Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ» Бахшида ба даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор 2018-2028» -2022, с.41-42.

**[11-М]. Раҳматов С.Ҳ.** Нашъу нуму ва маҳсулнокии хурмои шарқи вобаста аз тағпайванд дар шароити водии Ҳисор / С.Ҳ. Раҳматов// Маводҳои конференсияи илмӣ назарияи байналмиллалӣ дар мавзӯи «Истифодабарии усулҳои инноватсионӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии дарахтони мевадиханда, ангур ва зироатҳои сабзавотию картошка» - 2022, С.21-25.

**[12-М]. Раҳматов С.Ҳ.** Фенологияи навҳои хурмои шарқӣ вобаста ба миндақҳо/ С.Ҳ. Раҳматов, З. Сафарова, Б.С. Холова // Маводи конференсияи илмӣ ҷумҳуриявӣ ”Нақши олимони ҷавон дар рушди илм инноватсия ва технологияи кишоварзӣ” Бахшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ва даҳсолаи байналмиллалӣ амал “об барои рушди устувор 2018-2028” -2023, с. 101-109.

**[13-М]. Раҳматов С.Ҳ.** Производственно - Хозяйственная Эффективность Плодов Восточной Хурмы В Зависимости От Различных Почвенно-Климатических Регионов республике Таджикистан / С.Ҳ. Раҳматов // Международный научный журнал «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science” 15 июля Almaty, Kazakhstan -2025, с.12-18.

## САНАДИ ТАТБИҚӢ

Оид ба чори намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ - таҳқиқотии унвонҷӯ

**Раҳматов Сулаймон Ҳасанович**

Санади мазкур дар он хусус тартиб дода шудааст, ки унвонҷӯ, мудири шуъбаи мевапарварӣ ва буттамевагиҳои Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Раҳматов Сулаймон Ҳасанович дар давоми солҳои 2016-2018 дар шароити шаҳри Ҳисор минтақаи водии Ҳисор коҳои илмӣ-таҳқиқотии худро оид ба омӯзиши навъҳои хурмои шарқӣ, ки аз тарафи олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ офарида шуда буд, анҷом дод.

Мақсади асосии таҳқиқотҳои унвонҷӯ омӯзиш ва мутобиқгардонии навъҳои хурмои шарқӣ, инчунин маҳсулноки ва ҳосилнокии навъҳо вобаста ба шароити агробиологӣ водии Ҳисор равона гардидааст. Унвонҷӯ таҷрибаҳои илмӣ худро дар шароитҳои гуногуни минтақаи водии Ҳисор дар баландии 650-1300 метр аз сатҳи баҳр гузаронид. Натиҷаҳои илмӣ ба даст овардашудаи ӯ имконияти ба сармо тобоварӣ, мувофиқат ба тағпайванди интиҳобшуда ва гирифтани ҳосили баланди хурмои шарқиро вобаста ба хусусиятҳои навъ ва технологияи парвариши онҳо нишон доданд.

Натиҷаҳои корҳои илмӣ- таҳқиқотии Раҳматов С.Ҳ., дар истехсолот васеъ истифода гардида, навъҳои омӯхташуда ва пешниҳоднамудаи унвонҷӯ аз ҷумла навъҳои Шарқӣ, Шоҳона, Вахш, Ваҳдат ва дигар навъҳои нав дар хоҷагиҳои деҳқонӣ дар майдони 10 га дар хоҷагии ҶДММ «Боғи -15 солаги» Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамоати деҳоти Сомон ва 21га дар хоҷагии таҷрибавии «Сунбул»-и шаҳри Ҳисор парвариш карда шуда, хоҷагидорону деҳқонон аз ин навъҳо аз 18 то 28 т/га ҳосил руёнида истодаанд.

Унвонҷӯ корҳои илмӣ - таҳқиқотии худро асосан дар хоҷагии таҷрибавии «Сунбула»-и шаҳри Ҳисор гузаронида, тадбиқи натиҷаҳои

корҳои илмӣ худро дар боғҳои хоҷагӣҳои хурмои шарқӣ аз ҷумла, хоҷагии ҶДММ «Боғи -15 солаги» Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамоати деҳоти Сомон шаҳри Ҳисор анҷом дода, ҷиҳати зиёд намудани истеҳсоли меваи тару тоза ва хушкмеваи хурмои шарқиро дар хоҷагӣҳои номбурда нақши назаррас гузоштааст.

Гуфтан ба маврид аст, ки дар шароити водии Ҳисор дар майдони зиёда аз 350 гектар аз ҳисоби боғҳои навҳои гуногуни хурмои шарқӣ мавҷуд буда, бо тавсияву пешниҳодҳои Раҳматов С.Ҳ., ҷиҳати ба роҳ мондани гузаронидани саривақтии ҷорабиниҳои агротехникӣ, тибқи талаботҳои дар боғпарварӣ қабулшуда, аз руи тавсияҳои ӯ деҳқонон ва хоҷагидорон аз ҳар гектар то 25-30 ҳазор сомонӣ фоида ба даст меоранд.

Шӯбаи кишоварзии шаҳри Ҳисор бо олимони Институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамкорӣ намуда, махсусан тавсияҳои илмӣ Раҳматов С.Ҳ. - ро, ки ба масъалаҳои бунёди боғҳои хурмои шарқӣ вобаста ба шароити минтақа ва роҳҳои ба даст овардани ҳосили баланд дар шароити ҳоку иқлими шаҳри Ҳисор бахшида шудааст, васеъ истифода мебаранд. Ин таҷрибаҳои илмӣ ва маводҳои селексионӣ пешниҳод намудаи онҳо барои тақвият бахшидан ба соҳаи боғпарварӣ бахусус хурмои шарқӣ дар минтақаи мо дар оянда нақши муҳим мебозанд.

*Раёсат*  
Сардори шӯбаи кишоварзии

Шаҳри Ҳисор

Муовини сардор

Раиси хоҷагии:

ҶДММ «Боғи -15 солаги» Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ҷамоати деҳоти Сомон»-и ш.Ҳисор, Норов М.М.

Раиси хоҷагии таҷрибавӣ «Сунбула»- и шаҳри Ҳисор,  
Нуров Ф. Н.

### Санад

оид ба таҳлили таркиби химиявии навъу намунаҳои меваҳои хурмои шарқӣ (*Diospyros kaki L.*) дар солҳои 2016- 2018

### Асоси таҳлилоти:

Дар асоси мактуби Институти боғпарварӣ ва сабзавоткорӣ АИКТ таҳлили таркиби кимиёвии навъу намунаҳои меваҳои хурмои шарқӣ, ки дар солҳои 2016 -2018 дар шароити водии Ҳисор парвариш ёфтаанд, анҷом дода шуд.

### Макони гузаронидани таҳлил:

Озмоишҳои марказии санҷиши сифати дору, молҳои тиббӣ ва воситаҳои парафармасевтии Корхонаи воҳиди давлатии “Экспертиза ва озмоиши маҳсулоти фармасевтӣ ва тиббӣ”

### Мақсади таҳлил:

Муайян намудани миқдори моддаҳои хушк, қанд, моддаҳои даббоғӣ, ҷавҳар ва витамини С дар навъу намунаҳои гуногуни хурмои шарқӣ барои баҳодихии сифат ва арзиши ғизоии онҳо.

### Натиҷаҳои таҳлил

### Таркиби химиявии навъу намунаҳои меваҳои хурмо дар солҳои 2016- 2018

| № | Навъҳо       | Моддаи хушк, % | Қанд, % | Моддаҳои даббоғӣ, г % | Ҷавҳар, г/% | Витамини С, мг % |
|---|--------------|----------------|---------|-----------------------|-------------|------------------|
| 1 | Хиакуме      | 18,5           | 14,3    | 0,48                  | 0,14        | 42,2             |
| 2 | Зенджи- мару | 23,5           | 18,5    | 0,45                  | 0,13        | 25,3             |
| 3 | Шарқӣ        | 25,0           | 20,0    | 0,39                  | 0,12        | 23,0             |
| 4 | Шохона       | 26,3           | 21,6    | 0,33                  | 0,14        | 22,2             |
| 5 | Ваҳдат       | 27,5           | 22,0    | 0,25                  | 0,13        | 19,8             |
| 6 | Ваҳш         | 25,3           | 21,5    | 0,31                  | 0,14        | 20,3             |
| 7 | Тоҷикӣ       | 18,4           | 13,4    | 0,60                  | 0,14        | 41,6             |
| 8 | Ҳисорӣ       | 21,0           | 16,0    | 0,58                  | 0,13        | 24,4             |

### Хулоса:

Навъҳои Вахдат, Шоҳона Вахш ва Шарқӣ бо миқдори баланди моддаҳои хушк (27,5; 26,3; 25,3; ва 25,0 %) ва қанд (22,0; 21,6; 21,5 ва 20,0 %), ва моддаҳои даббоғӣ фарқ мекунанд, ки нишонаи арзиши баланди биологӣ ва нигохдории хуби онҳо мебошад. Инчунин барои истеҳсоли маҳсулоти хушк (масалан, хушкмеваи хурмо) тавсия дода мешаванд.

Дар маҷмӯъ, ҳамаи навъҳои мавриди таҳлил воқеан дорои нишондиҳандаҳои баланди гизой ва витаминӣ мебошанд.

### Имзои масъулин:

вазифа

имзо

ном, насаб

сана

Роҳбари таҳлил:

Бобизода Ғ.М. 20. 11. 2018

Муҳаққиқ (эксперт)

Имомзода А.З. 20. 11. 2018

Намояндаи муассиса :

Раҳматов С.Ҳ. 20. 11. 2018



## Аксҳо аз рафти гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ

